

SYNOPSIS

UNIVERSÆ

MEDICINÆ PRACTICÆ:

SIVE,

DOCTISSIMORUM VIRORUM

DE MORBIS

Eorumque Causis ac Remediis Judicia.

ACCESSERUNT NUNC DEMUM

Casus nonnulli oppidè rari.

PARS PRIMA.

A U T H O R E

J. ALLEN, M. D.

EDITIO NOVA VENETA,

ad tertiam LONDINENSEM prioribus, triente plus,
auctiorem, exacta, additis præterea FORMULIS re-
mediorum ex quinta AMSTELODAMENSI desumptis.

Τῆς αὐτῆς διαβολῆς ἐστὶ γυναικὶ καὶ ἰσχυρῶς ἐπιμέλει.

Ἰπποκράτ. περὶ διαβῆς.



VENETIIS, MDCCXLII.

Apud LAURENTIUM BASILIUM.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.



12 22 D 2

21

VIRIS PERILLUSTRIBUS;
Eruditissimisque, D.D.

ORNATISSIMO SPECTATISSIMQUE

P R Æ S I D I;
CENSORIBUS MERITISSIMIS,
ET RELIQUIS
INCLYTI MEDICORUM
LONDINENSIIUM COLLEGII
Sociis Doctissimis:

Exiguum hoc OPUS,
Obsequii & Honoris ergo,
Quàm humillimè D. D. C. Q:
Σοφολαγῆς Indignissimus:

LECTOREM.



Edicina, omnium artium nobilissima, si ad ejusdem præcognita, institutiones, & theoriam spectemus, nuperis annis progressus & incrementa admiranda accepit; agnoscendum est tamen & vehementer dolendum, quod praxis, pars ejus longè utilissima, haud pari passu processerit. Ars medendi non nisi tardo pede progreditur. In seculorum revolutione, ingenio singulari valens pervarò assurgit, qui in hac etiam parte artem cudit; sed homines istiusmodi indolis, teste medicorum ab Hippocrate catalogo, in ingenti temporis tractu apparent rari nantes in gurgite vasto. Interim loco sanioris praxeos & melioris medendi methodi hypothesis novæ & theoriæ novæ quotannis ad nauseam usque nobis obtruduntur, quæ ostentationis multum, utilitatis parum habent. Tritum utcumque sit illud, Qui speculantur non medentur, non tamen a veritate prorsus alicum esse ex observatione satis frequenti constat.

Præsentis instituti propositum est praxin legitimam & laudabilem UNDECUNQUE DESUMPTAM VEL MUTUATAM omni opera maximè compendiariò exhibere, & optimorum scriptorum auctoritate firmiter stabilire. Hoc est, quod impræsentiarum subitvi, munus, quo officio (sperare fas est) fortassis aliquando manus magis idonea cum majori laude &

utilitate defungetur ; ut uno intuitu videamus ; quò usque pentum est in vera ac solida medendi cognitione .

Ut plurimum tantum monitoris officium præsto : Morbi omnes ex præstantissimis scriptoribus hic ad vivum depinguntur ; præcipuæ morborum causæ , & de eorumdem eventu iudicia ; traduntur ; indicationes curativæ exponuntur ; & remedia nonnulla ; præstantior saltem , breviter attinguntur , & concisæ aliquot formulæ subduntur , ut citò , tutò , & jucundè ; & qua fieri potest certitudine ; medeamur :

Citationes authorum non ex numero ; sed ex pondere & momentis sunt aestimandæ : Aphorismos præclarissimi Boerhaavi haud satis pro merito laudavi ; quoniam uniuscuiusque manibus præsto esse & charissimos haberi nullus dubitò : est enim opus omnibus numeris absolutum , & tantum non divino afflatu exaratum , auro contra aestimandum , decies & amplius perlegi dignissimum , immò in sinu perpetuò gestari .

De morborum Aetiologiis (ingenuè fateor) non nisi paucissima in medio protuli : origines & causæ proximæ morborum plerumque longè abstrusiores sunt , quàm ut nostræ mentis acies eò usque penetrare possit ; & reverà , si dissimulare nolimus , agnoscendum est , quòd hæc ut plurimum usque adeo nos lateant , ut in iisdem pervidendis hætenus Talpæ simus : In alto navigamus **LONGITUDINIS IGNARI.**

Meipsum quod attinet , ne sim planè doctus , de proprio penu ex adversariis meis depromptum , ubique ferè , nunc demum in hac tertia

Edi-

*Editique, nonnihil interspersi, quæ usui publicolih
benter mancipavi, & utinam ne illa sint sola om-
nium manca & jejuna.*

E

*Qualescunque tamen sunt hæ lucubrationes, sa-
tis novi non esse aliquid, quod hoc loco proferre pos-
sum, quod limatiores vel utiliores illas reddat;
neque ornatiores in futurum polliceor, ut sint hu-
jusce opusculi abiquid præsidii.*

*Unicum tantum præfandum restare censui, nem-
pe; ut te certiorer faciam me hæ collectanea in
lucem edidisse non ex suasu amicorum, vel quæ-
stus, aut gloriolæ captandæ gratiæ; sed inductu
consilii, ut mihi visum est, recti honestique, &
publicum, tam ægrotantium quàm medentium (ma-
ximè juniorum) emolumentum respicientis.*

*Valeas itaque, Candide Lector, & hæc ver-
suras sine fastidio accipias, atque hoc levidense
φιδανδρωπίας nostræ pignus, animique erga te bene-
voli documentum, fas aequi bonique consulas.*

*Medicus est Minister, Natura Medica-
trix: Deis interim hisce clementer bene-
dicat.*

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

C Oncedemo Licenza a *Lorenzo Baseggio* Stampatore di Venezia di poter ristampare il Libro intitolato: *Synopsis Universae Medicinae Practicae, sive Doctissimorum Virorum de Morbis &c. Auctore J. Allen M. D. Pars I. & II. in 8. in due Tometti, già stampato in Venezia per Lorenzo Baseggio nell'anno 1737. con Licenza de' Superiori,*

Data li 12. Dicembre 1741.

(

(*Z. Alvise Mocenigo 2°. Rif.*

(*Zuanne Querini Proc. Rif.*

Registrato in Libro a carte 21.

Agostino Bianchi Segr.

Registrato nel Magistrato Illustriss. ed Eccellentiss. della Bestemmia,

Lvise Legrenzi Segr.

SYNO.



SYNOPSIS

UNIVERSÆ

MEDICINÆ PRACTICÆ, &c.



CAPUT PRIMUM,

Sive Fasciculus Morborum primus.

FEBRES IN GENERE.

Ex observatione & inter legendum.

Art. 1.



EBRES (ut rectè an-
notavit clarissimus Sy-
denhamus) cum Appen-
dicibus suis duas ferè ter-
tias partes omnium, quæ
sunt morborum, com-
pleant; ideoque his exponendis, utpote quæ et-
iam totis corporibus inhaerescunt, meritiò exordi-
ri statuimus.

Proop-
mum.

Art. 2. Febris autem (inquit idem) nihil aliud
est, quam naturæ conamen materiæ morbificæ, cor-
pori

Febris
quid.

pori valde inimica, exterminationem in agri salutem omni ope molientis.

Februm
divisio.

Art. 3. Februm divisio maximè generalis & genuina est in *Essentialem & Symptomaticam*.

Essentia-
lis.

Art. 4. Febris essentialis est cujus causa primaria in ipso sanguine delitescit, a nullo alio morbo solidarum partium originem ducens, aut quocunque modo pendens, atque hæc est *Febris absoluta & propriè dicta*.

Sympto-
matica.

Art. 5. Febris symptomatica est febris secundaria, quæ non propriam subsistentiam habet, sed a graviore alicujus partis affectu originem trahit, & frequentissimè ab insigni aliqua inflammatione pendet, unde *Febres variæ inflammatoriæ dictæ*.

Essentia-
lis divisio.

Art. 6. Febris essentialis dividitur in *Ephemeram*; *Intermittentem*, *Continentem* & *Continuam*.

Epheme-
ra.

Art. 7. Febris omnium mitissima est Febris ephemera, sive diaria, i. e. Febris unius diei; ab insolatu, exercitio nimio, vel aliquo alio accidente externo oritur, & spatio 24. horarum ultro terminari solet. Sola quiete, & in lecto decubitu curatur.

Intermit-
tens.

Art. 8. Huic proximæ sunt Febres intermittentes, scilicet, quotidianæ, tertianæ, quartanæ simplices, tertianæ, quartanæ duplices &c. Hæ more Febris diariæ spatio 24. horarum plus minus pro isthac vice finiuntur; verum pro peculiari illarum genio, singulis, vel alternis diebus, vel quarto quoque die, recrudescere solent.

Continens

Art. 9. His congener est Febris *συνεχής*, seu continens, quæ quidem est Febris continua, sed non uno tenore pergens; ad plures dies sine *ἀνυπόσει* protenditur, habet tamen sua *remissionis & exacerbationis* tempora, statis, vel incertis periodis se invicem excipientia; *intermissionem* vero nullam habet.

Continua

Art. 10. Februm gradus proximus & ultimus est

CAP. I.

Febres in genere.

est *quinox*, sive Febris continua propriè dicta ; quæ ab initio ad finem ubique est æquabilis, sine *symptomatum exacerbatione & remissione periodica*: hujus generis sunt Febres malignæ, Febres pestilenciales, ipsa pestis, &c.

Sydenhami sententia.

Art. 11. Ille dubio tramite errat, atque incerto ducitur filo, qui in Februm curatione non continenter ob oculos habet *anni constitutionem*, quatenus huic aut alteri morbo epidemicè producendo favet, cæterisque morbis omnibus una concurrentibus in ejus similitudinem ac formam detorquendis; hæ autem variæ constitutiones aut habitudines ab occulta & inexplicabili quadam aeris alteratione pendent, quæ proprias ac sibi peculiâtes Febres producant, quæ *stationariæ* nobis audiunt.

Ratio habenda est anni constitutionis.

Art. 12. In novis Febris cunctandum est paulisper; & ad magna remedia non nisi pede tardo procedendum; interim morbi genium ac morem diligenter pensitando indicationes præsertim a *laudentibus & juvantibus* sumendæ sunt; neque pudet fateri me non semel in curandis Febris, ubi nondum constaret, quid mihi agendum esset, nihil prorsus agendo & mihi & ægro consuluisse optimè; dum enim morbo invigilarem; quo eum opportuniùs confodere valeam, Febris vel sponte sua sensim evanuit, vel in eum se typum redegit, ut jam mihi innotesceret, quibus armis esset debellanda. “ Non enim levis est consolatio viro, probo in rebus dubiis, facilèque errori obnoxius se saltem inculpatum tueri, si se minus utilem præbere nequeat. “

Et in novæ Febris ingressu paulisper cunctandum est.

Art. 13. “ Calidum solum non est Febris causa, sa, (*inquit Hippocrates de vet. medic.*) sed ea est calidum & amarum simul, calidum & aci-

Febris causa.

„dum, calidum & salsum, aliaque innumera.“

Evenire
potest in
corpori-
bus sanis.

Ex frequenti etiam observatione compertum est Febrem in *corporibus sanis* evenire posse, in quibus nullus apparatus morbosus, vel quoad plethoram, vel cacochymiam, &c. occasionem subministraret; nihilominus hujusmodi homines præcedentes insigni aliqua aeris, victus, &c. rerum non naturalium, mutatione, Febre corripiuntur, propterea quod eorum sanguis novum statum & conditionem adipisci gestit, qualem ejusmodi aer aut victus postulaverit.

Indicatio
generalis.

Art. 14. Indicatio generalis in curatione Februm est, ut sanguinis commotio intra modum naturæ proposito congruentem contineatur, ea nimirum ratione, ut nec hinc plus æquo glisecat, undè periculosa symptomata, nec illinc nimium torpeat, ne naturæ conamen frustretur; atque hinc exurgit norma sanguinem mittendi plus minus, vel prorsus omittendi.

Vomitus
pallidus.

Art. 15. Si adsit vomendi proclivitas, vomitorium propinare necessum esse omnino videtur; aliàs etenim accidere solet diarrhœa in Febris progressu, ægro interdum admodum periculosa. In initio Febris emeticum propinari debet, sed, si omissum fuerit, quovis morbis tempore adhiberi potest, modò vires ægri ferre valeant; post hoc autem paregoricum hora somni propinandum est; diebus insequentibus, si repetitio venæsectionis minus indicetur, & non aderit diarrhœa, enema ta alternis diebus in usum venire possunt, usque ad decimum vel duodecimum diem, quo tempore negotio ad secretionem vergente medicamentis calidioribus liberalius indulgendum censeo ad concoctionem accelerandam. Si fermentatio recte progrediatur, nullis omnino remediis opus est; despumatio etenim est opus naturæ.

Catharticum
exhibendum
sub signis.

Art. 16. Usitato circa diem decimumquintum, si adsit in urina laudabilis separatio, & sympte-

matum

CAP. I. Febres in genere.

matum remissio, catharticum adhiberi debet, ne sedimentum a fermentatione hic illic depositum in sanguinem remigrans recidivam conciliet, quandoque tamen ad diem decimum septimum differendam est.

Art. 17. Pro comperto affirmo, nihil ita certo atque ita potenter agrum refrigerare, atque catharsin post venesectionem celebratam: testatur enim experientia catharsin post venesectionem quibuslibet aliis remediis feliciter certiusque Febrem perdomare, tum quatenus intestinis illuviem dimovet, tum quatenus anodyno viam sternit. (Schedul. Monit.)

Art. 18. Ad genuinam sanguinis deputationem duplex secretio requiritur; una per facies fit, altera per flores, hæc sensim & paulo pleniori dixi, potius quam sudore manifesto ut plurimum peragitur; separatione hac per flores jam facta, minus periculosa est diarrhoea.

Boerhaavii sententia:

Art. 19. Febris est frequentissimus morbus, inflammationi individuus comes, qui ingenti symptomatum numero plerumque stipatur.

Art. 20. In omni Febre, a causis internis orta, horripilatio; pulsus velox; & calor; vario tempore; & vario gradu; adsunt; hæc autem ubi velociter decurrunt, Febris acuta, ubi tardè, lenta audit. Febris ferè semper cum sensu frigoris incipit, & progrediente morbo maxime a velocitate pulsus primario cognoscitur; adeoque velocior cordis contractio cum aucta resistentia ad capillaria Febris omnis acutæ ideam absolvit, quæ a causis infinitis produci potest. Sanitas ægroti videtur esse cynosura primaria, in quam natura in Febris collinat; frequenter verò Febris in mortem delinit, quandoque in alium transit morbum.

Spatio
generale.

Art. 21. Curatio Februm generalis summatim comprehenditur in vitæ ejusque viribus consulendo, acre irritans corrigendo & deturbando, lentorem dissolvendo, expellendoque, & symptomata mitigando. Si in Febre exorbitare naturâ deprehendatur, moderamen sit abstinencia, victu tenui; potu aquæ, venæsectione, elysmate refrigerante, &c. Si segnior appareat, excitabitur ope cardiacorum, aromaticorum, volatiliū, &c. Sublata Febris causa symptomata reliqua cessabunt, quatenus ab ea primariò pendent, adeoque, si terri queunt sine vitæ periculo, singularem curationem vix requirunt; nec temerè turbari debent: Si vero intempestiva & nimis sæva fuerint, singula sunt lenienda suis remediis propriis, habita semper ratione causæ & status morbi ipsius.

De sym-
ptomatis

Estmüllers sententia.

Quid vult
natura
per Febrē

Art. 22. Febris est *motus naturæ*, seu quædam lucta, quæ spirituum plus minus alteratorum ope id, quod est hostile œconomix animali, eliminare satagit.

De diæta.

Art. 23. Quò magis acuta est Febris, eò tenuior convenit diæta; licet ægri ad plures dies jejuni jaceant, perinde erit, *nec unquam vidi febricitantem fame pereuntem*, sed potius, si quid ingeritur, Febris exasperatur, &c. nam in alimentis appetitus præscribit rationem, *quantum & quale, & tempus.*

Vomitores
via & sudorifera.

Art. 24. Vomitoria in Febris omnibus in principio sunt proficua. Sudoriferorum usum ipsa natura nobis monstrat, signis coctionis apparentibus sunt optima; & etiam in toto morbi decursu sunt utilia; immo horum usu promiscuo Febres non rarè curantur. Spiritus salis armoniaci, vel sal volatile ejusdem, est febrifugum universale, & usu repetito rarè fallax. Saccharata
quæ

quæcunque in Febribus insigniter nocent. *Hippocrates* in omni Febre vinum porrigit. Semper observavi quamdiu urinæ sunt crudæ, tamdiu res ægri in statu existunt ambiguo; quando verò adsunt signa coctionis fausta possumus ominari: opus hoc coctionis est solius naturæ. Inter signa lethalia nullum est certius, quam frequens manuum ad nares admotio sine ulla materiæ effusione.

Baglivii sententia.

Art. 25. In morbis acutis, atque inflammatoriis paucis opus est remediis, satis enim fuerit vias observare diligenter, qua natura exitum tentat, curamque eò perducere, naturæ obsecundando, alioqui ægrotus pessum dabitur.

Naturæ ductus sequendi sunt.

Art. 26. In Febribus universalibus, id est, quæ ipso de sanguine suscitantur, non admodum laborandum est circa partem affectam, ut inde curativæ deducantur indicationes; Febrium siquidem primordia, partesque affectæ in iisdem, nos plerumque latent, & si unquam paterent, oportet indicationem dirigere ad constitutionem massæ sanguineæ febricitantis, potius quam ad sophisticam speculationem causarum proximarum, aut quæ in Febribus primoprime sunt, quæ nostræ aciei minime subjiciuntur.

Inanes speculationes massæ faciendæ.

Art. 27. Ideo si primæ viæ sint obductæ, exque egerendæ atque expurgandæ fuerint, danda opera, ut Febrium fomes tollatur; Si verò sanguis febricitans sit exaltatus, & vehemens, ejus reprimendus est impetus; si nimis crassis humoribus irretitus, atque coagulatus, exaltetur, ac dissolvatur. In hisce enim tribus præceptis omnium propè illarum Febrium cura versatur, quæ ortum non ducunt ab organi læsione, verum ab humorum congerie, aut in ipso sanguine, aut in primis viis,

Triaprecepta danda curandis Febribus.

mis viis. Et cum ad crisin natura vergit, aut eas jam exiverit, tum a remediorum copia tanquam a peste cavendum.

Oder
cadavero
sus mor-
tis prae-
gium.

Art. 28. Ex odore, quem ægri spirant, soleo sæpe; utrum morbus facilis vel difficilis, brevis vel diuturnus, vel alterius generis futurus sit, judicare. In ægris qui morituri sunt, nonnullis ante mortem diebus solet, dum pulsus tangimus, ab eorum exhalare corpore foetidus quidam ac veluti *cadavericus odor*, qualem spirant in templis cadavera, ut sæpe observavi, & velim, ut serid animadvertant medici. *Animadu. in pract. nov.*

Farrago sententiarum.

Regula
de diæta.

Art. 29. Hippocratis Aphorismus de diæta in morbis acutis sic se habet: ubi peracutus est morbus, statim extremos habet labores, & extremè tenuissimo victu uti necesse est; ubi verò non, sed plenius cibare licet, tantùm a tenui recedendum, quantum morbus remissior extremis fuerit. *Secl.*
1. *Aph. 7.*

Incom-
modum
nimia re-
mediorũ
cop.æ.

Art. 30. Graviter errant illi, qui acutos & inflammatorios morbos remediorum copia tamdiu afficiunt, donec natura, quo se vertat nescia, & hinc inde, tum a morbi vehementia, tum a remediorum pondere, variè distracta, tandem cogatur succumbere: perturbato enim, distractoq; morbo illo ordinato naturæ a repetitis toties, vel absque methodo exhibitis medicamentis, nec Febris minuitur, nec crisis statò tempore succedit, sed patiens dubio Marte colluctatus; vel in perniciem, vel in chronicos morbos delabitur. *Baglivius.*

Incom-
modum
V S ni-
mis cre-
bri.

Art. 31. Observatione constat, quod crebra sanguinis missio homines Febri aptiores reddat præ cæteris: quare vulgo dicitur, quibus sanguis semel detrahitur, eos, nisi quotannis idem faciant, in Febrem proclives esse, & pinguescere. *Vuillius.*

Art. 32.

CAP. I. *Febres intermittentes.*

Art. 32. In Febribus continuis, si pulsus sit fortis uno tenore pergens, ut ut deliria, tremores, tendinum subsultus, cæteraque dira in genere nervoso symptomata subitam ruinam minari videantur, semper benè prælagit: & contra verò pulsus celer; debilis ac vacillans mortem præ foribus adstantem indubitanter prædicat; ut ut reliqua symptomata adblandiantur. *Morton.*

*Prognosis
sicon gen
nerale.*

Art. 33. In curatione Februm summum ac æccerrimum medici ingenium requiritur. Judicio præpollenti, *facultati innata & incommunicabili*, plurimum debetur. Morbi genius, anni constitutio, ægroti temperamentum, & vivendi modus, symptomata singula & universa; & innumera alia incidentia, & accidentia, omnia conjunctim & divisim *animo præsentis & sereno* diligenter perpendenda sunt; e quibus inter se ritè collatis sagaci medico, *lente festinanti*, exurgit *clara ac distincta medendi methodus*; & plerumque insequitur felix morbi exitus. Veritatem hujusce mei effati longa jam annorum serie non sine gratissimo animi delectamento feliciter expertus sum.

*Acumen
ingenii el-
pus est.*

FEBRES INTERMITTENTES.

Mortoni sententia.

Art. 34. Febris intermittens est calor præternaturalis in sanguine accensus ab insolita spirituum expansione statim periodicis redeunte; in hac autem Febre albor, rigor, calor, & sudores se invicem excipiunt; adfunt etiam in paroxysmo ægritudo universalis, nausea & vomitus, dolor capitis, lumbago, &c. Paroxysmus quidem acutus est, morbus verò ipse ut plurimum plus minus chronicus. Febris intermittens simplex facillimè cognoscitur; ultro enim sese in conspectum dat: quorundamque

*Definitio
Febris in-
termic-
tencia.*

autem

autem sint earum varietates (sint quotidianæ, tertianæ, quartanæ, &c.) *fermentum morbificum* omnium idem est, & viribus *corticis Peruviani* cedit ac cito cedit.

Species
Feb. inter-
mitte

Historia
sana.

Art. 35. "Species Febrium intermittentium communes sunt *quotidiana, tertiana, & quartana simplex; quotidiana, tertiana, & quartana duplex; semitertiana, &c.* Sunt etiam Febres intermittentes quinto sexto vel septimo die recurrentes. Contigit mihi in praxi videre sceminam per integram septimanam Febre laborantem, deinde proxima septimana omnino liberam; atque ita alternis septimanis febricitantem, & alternis apyrexiam habentem, idque per longum tempus. *Cortice Peruviano* curata fuit."

Curatio.

Art. 36. Neque venæsectio, neque vomitoria, cathartica, aut diaphoretica, neque aliud quodcunque remedium in paroxysmo exhibitum aliquid ad curationem hujus morbi promovendam conducere observantur; a justa dosi vini benedicti trihorio ante tertium paroxysmum expectatum exhibita sæpius Febrem tertianam curatam novit. *Antimonium diaphoreticum* paulò ante adventum paroxysmi datum interdum morbum tollit; *Sal absynthii* febrifugum audit, & sequentem haustum usu comprobavi, ℞. *Aq. card. ben. theriacal. stillat. ana* ℥ij. *sal. absynth.* ℥ss. *syrup. limon.* ℥iiss. *misce*; sumat æger dimidiam partem trihorio ante paroxysmum, & reliquam in primo insultu. "In Febribus intermittibus (inquit Dolæus) pro singulari secreto mihi est *lapis Lazuli* a ℥ss. ad ℥j. cum spiritu vini ante paroxysmum traditus. "Efficacia plurimorum amarorum (antequam vires *corticis Peruv.* satis exploratæ fuissent) experta fuit, uti *absynthii, cardui benedicti, rad. gentian. flor. chamem.* (serè specifici) & privatim decocti amari febrisug. seq. ℞. *Fol. matricar. card. ben.* ab.

CAP. I. Febres intermittentes.

II.

*absynth. summit. centaur. min. flor. cham. ana m℥. sem. iard. ben. citr. ana ℥j. sal. absynth. ℥ss. coq. in aq. font. q. s. ad ℥ss. dosis ℥iij. vel iv. quarta quaque hora extra paroxysmum. Item pulvis febrifugus sequens; ℥. flor. cham. subtilissimè pulverisat. ℥i. antimon. diaphoret. sal. absynth. ana ℥β. m. f. pulvis pro una dosi quarta quaque hora extra paroxysmum utilissimus est quidem iis, quibus vires corticis defecerunt, vel quando ob *idiocruxia* non possumus exhibere. In confesso est his & hujusmodi remediis Febres intermittentes ætivo tempore quandoque curantur: Cortex vero *Peruvianus* consensu medicorum (hodie omnium) est *catholicum febrifugum*, quod omnes Febres intermittentes, in quavis anni tempestate, in omni ætate, & temperamento, penitus, citò, tutò, & feliciter sanat: neque opus est, ut medici ingenia sua amplius torqueant in aliis febrifugis explorandis. "Cortex Peruvianus sudorem omnino nullum excitat; tantum omnigenas coctiones & vestigio emendat sine ulla sensibili evacuatione nisi aliquibus alvum aliquoties, idque leniter admodum movet. Modus exhibendi nunc dierum omnibus innotescit. *Hactenus* de Febribus intermittentibus simplicibus.*

Cortex Peruvianus remedium polychrestum.

Art. 37. Symptomata vero Februm intermittentium *spuriarum* nonnunquam sunt perquam vehementia, & typus Febris ipsius in variis suis stadiis sub larva vomitionis, diarrhoeæ, doloris aliqujus gravissimi, &c. absconditur. A periodica symptomatum vehementium exacerbatione & remissione, nec non ab urina lateritii coloris verus morbus potissimum dignoscitur: alios etenim morbos frequentissimè simulat, undè arrepta occasione creantur nunc hæc nunc illa gravissima symptomata, vomitiones, diarrhoeæ tormentosæ, cholera morbus, colica, dolores lateris punctorii, tanquam pleuritici, ophthalmia, apoplexia, hæmicra.

Febris intermittens spuria.

micrania, spasmi universales, vel particulares, dolores nephritici, &c.“ Item *dolores parturientium amuli*; in fœmina quadam hujusmodi dolores, alternis diebus recurrentes, duobus vel tribus a partu septimanis accedentes semel ipse observavi, idemque ab alio observatum fuisse audiui. Et (quod rarius adhuc videatur) *dolorem unius cruris* periodicè revertentem in hominè quadragenario semel in praxi adnotavi: dolor fuit vehementissimus per 24. interdum per 30. horas durans, unde ingens intumescencia totius membri superveniebat; tumor cruris erat quasi partim *flatulentus* & partim *œdematofus*, qui non nisi longo post tempore fasciatione ad pristinam dimensionem redactus erat. Ambo hi ægroti cortice Peruviano sanati fuerunt.“

Curatio. *Art. 38.* Versatilis quidem est horum affectuum Proteiformium genius, sed ab uno eodemque fermento pendent omnes, & unica antidoto, nempe *cortice Peruviano*, cum prudentia adhibito, facillè profligantur.

Prognosis. *Art. 39.* Nemo unquam a Febre intermittente interimitur, nisi in primo paroxysmi stadio; durante, scilicet, algore ex spirituum oppressione orto. Febres intermittentes, ubi valde chronicæ evadunt, viam sternunt ad alios morbos maxime funestos.

Historia. *Art. 40.* “Sequens historia inter casus oppidè raros meritiò recenseri potest. Paucis abhinc annis Vvincauntioniz in agro Somersetensi mortuus est senex, Theologus, nomine *Bulgin*; hic annuè agens trigessimū quartum in Febrem intermittentem quotidianam incidit; quæ per totum vitæ eursum (dictu mirabile, verissimum tamen) per sexaginta scilicet annos, usque ad vitæ in extrema senectute terminum, duravit. Febris cum frigore præcente, calore
„ & sur-

CAP. I. *Febr̃es intermittentes;* 13

„ & sudore succedentibus per diuturnum istud spav-
 „ tium, uterunque non semper cum eodem sævis-
 „ simo impetu, constanter tamen, quotidie illum
 „ invalit. Postremò *senio* potius quàm morbo
 „ confectus nonagesimum quintum agens annum
 „ obiit. Hæc narratio a filio & filia prædicti *se-*
 „ nis adhuc *viventibus*, fidei indubitatae ambo-
 „ bus, renunciata est.

Farrago sententiarum,

Art. 41. Post accuratum examen totius historię Causa
proxima
Feb. inter-
mittan-
tium.
 Febr̃ium intermittentium causa proxima consti-
 tuitur *viscositas* liquidi arteriosi, superveniente de-
 in causa quacunque velocioris & fortioris contra-
 ctionis cordis, atque resolutionis ejus, quod sta-
 gnaverat. *Boerhaave.*

Art. 42. Galenus hæc methodo curavit quarta- Galenus
methodus
in quarta-
nis.
 nas; primò propinavit vomitorium, die sequen-
 ti dedit *succum absynthii* bibendum, & denique
 bihorio ante paroxysmum dedit *theriacam*. “ Sed
 „ his admipiculis tutò inniti pequimus. Febris ter-
 „ tiana veteribus, quibus vires antidoti Peruvia-
 „ næ ignotæ fuerunt, curatu erat valde difficilis,
 „ & quartana opprobrium medicorum audiebat;
 „ at hodie secus esse nemo non povit: quo enim
 „ longiùs recedunt intermittentiũ paroxysmi a
 „ natura Febr̃ium continuarum, aut quo majus
 „ fuerit intervallum inter accessiones, eò minus
 „ periculi ab illis impendet, quoniam amplior est
 „ locus commodiorque curationi.

Art. 43. Epithemata & epicarpia quandoque Epithemata.
 profunt Febr̃ibus intermittentibus abigendis; ejus-
 modi est *Emplast. febrile pro carpis D. Michaelis*
℥i. Fulig. furni splendent. ℥i. terebinth. ʒvj. tel.
arancar. ʒß. camphor. ʒij. ol. scorpion. q. s. m. f.
emplast. pro carpis. Mortonus duo sequentia ex
 propria experientia commendat, *℥i. Pulv. aliban,*
terea

terebinth. venet. ana p. æ. f. pericarpia. ʒj. Fol. chelidon. m. ʒj. ruta ana m. j. fuliginis e lignis combustis, sapon. venet. salis marin. ana p. æ. cum aceto acerrimo f. massa, &c. " Empl. rubrum febris, fugum sequens scrobiculo cordis applicatum in tenellis infantibus frequenter prodesse deprehendi. " ʒj. Thur. subtilissimè pulv. ʒv. minii ʒj. ol. oli. var. q. f. f. empl.

Enema febrifugum.

Art. 44. Qui corticem Peruvianum ore assumpte pertinaciter respuunt, curari possunt cum enematis ex ejusdem decocto; istiusmodi est enema febrisfug. Fulleri, sed pueris certius solet opem ferre quàm adultis.

Ad algorem.

Art. 45. Dum febrilis horror, aut frigus universam cutim convellit, tum oleum destillatum caryophyllorum epigastricæ regioni illitum remissionem horroris undiquaque procurat. Baglivius.

Vires succi limonũ.

Art. 46. Ansam mihi suppeditari autumabam aliquid ad artis nostræ incrementum ediscendi, id. que aliquoties tentans, non infeliciter processit, in Febribus scilicet intermittentibus; circa initium paroxysmi, haustu calido succi limonum cum saccharo & aq. fontan. tantil. semel atque iterum exhibito; exacerbationes vel in totum cessasse, vel saltem in dies præter expectationem simul cum siti deferbuisset, & intra paucos dies planè siluisse, deprehendi, subsequente utique manifesto effectu, urinæ scilicet, & imprimis sudorum larga promotione. Piso p. 315.

Specifica alia.

Art. 47. Sunt & alia nonnulla remedia a quibusdam plurimum decantata, tanquam Feb. intermitt. specificè curantia. Nempe pulvis corticis interioris fraxini a ʒʒ. ad ʒj. cum paucosale absynthii in vehiculo idoneo exhibitus, more corticis Peruv. vires ejusdem adæquare, immo superare; dicitur; foelici cum successu sæpè exhibuit doctissimus & insignis medicus D. Hen. Vaghan. Idem perhibetur de cortice ulmi prope radicem; Flores salis

salis armoniaci optimum febrifugum censetur, præcipuè in Febribus intermittentibus. De quo remedio audiatur clarissimus Boerhaave, non novum (inquit ille) melius febrifugum quam gr. xx. *salis armoniaci* in calido haustu, una vel duabus horis ante paroxysmum. *Succus rad. gentian. inspissatus*, & in vehiculo appropriato cum myrrha assumptus propter ejus vim febrifugam non immeritò usurpari potest ad instar cort. Peruvian. cujus succedaneum ferè est (inquit Ettmullerus.) Sed forsan *cortex radice prunæ sylvestris*, i. e. *spinæ nigrae* vulgò appellatæ, est adhuc præstantius medicamentum, quod olim honorandus D. Sloan in literis mihi datis communicavit. *Camphora* est remedium diaphoreticum nobilissimum, & omnium adhuc notorum certissimum. Insignis est ejusdem usus in curandis Febribus intermittentibus, & viribus corticis Peruviani magnopere opitulatur.

Art. 48. Unicum hîc, quod multa experientia didici, in bonum commune evulgari volo de *Recidivatione* præcavenda; nimirum, Febre cortice Peruviano priùs fugata, cui penso istius remedii uncia vel ad summum sesquiuncia semper sufficit, intra triduum vel quatrimum propinare soleo medicamentum aliquod chalybeatum, & huic operi levissimas præparationes eligo, & in hunc ferè modum præscribo. *℞. Vin. chalybeat. pharm. Londinens. ℥ij. tinctur. stomach. amar. Quincii ℥iij. vel iv. misce dosis coch. iv. vel v. bis in die; vel loco hujus infusum chalybeatum amarum sequens.* *℞. Limatur. ferri ℥iv. succ. limon. No. iv. aurant. acid. No. vj. infund. per hor. 24. deinde add. rad. gentian. ℥ß. aristoloch. rotund. ℥j. cort. uviv. teran. rad. calam. arom. ana ℥ij. summit. absynth. centaur. min. ana p. j. vin. alb. ℥iv. aq. gert. comp. ℥ij. infund. frigidè per septimanam, & decantetur pro usu.* Vel *℞. Fior. sal. ammoniac. martiac. ℥ij. myrrh. elect. ℥j. rubig. ferri ℥ij. extract.*
rad.

Recidiva-
tionis præ-
cautio.

Infusum
chalybeat.
amar.

Infusum
Stomach.
grac.

rad. gent. ʒ. f. m. f. pil. med. dos. iv. bis in die,
superbibendo infus. stomach. amar. sequent. ʒl.
Rad. zedoar. cassumuniar. ana ʒʒ. cort. flav.
aurant. Hispalens. ʒij. sem. cardamom. min. ʒʒ.
summis. absynth Rom. p. ʒ. infund. in aq. bul-
lient. ʒij. coletur frigidè. Atque ita ventriculo op-
timè consultum est, & res in vado fit; Febris
nullatenus recrudescit, nisi ex gravi aliquo sex
rerum non naturalium errore. Interdum in casu
incipiti & in corporibus valde debilitatis *chalybs*
& *cortex Peruvianus* junctim maritati melius ce-
dunt, quam alteruter eorum seorsim exhibitus;
in hunc finem decoctum nigrum sequens est reme-
dium appropriatum; ʒl. Cort. Peruv. pulverisat,
ʒij. *chalyb. cum tart. præp.* ʒi. coq. in aq. font.
ʒiiij. lento igne ad ʒʒ. addendo sub finem coctio-
nis cinnam. acutissim. ʒij. colatur. add. aq. absynth.
magis comp. ʒʒ. m. vel in magis delicatulis vinum
chalybeatum prædict. & tinctura sequens usus tem-
pore commissa; dosis a coch. iij. ʒl. Cort. peruv.
pulverisat. ʒx. calam. arom. cinnam. ana ʒi. cort.
aurant. ʒj. cochinel. ʒss. macera per biduum in vin.
alb. Ulissiponens. ʒiijss. filtretur, &c. hanc ob venu-
sum colorem tincturam *Burgundicam* vocant.

Degrocto
pignum.

Tinctura
burgundi-
ca.

FEBRES REMITTENTES.

Mortoni sententia,

Typus
Febris re-
mittentis
simplicis.

Art. 49. Febris *Συνήκης*, continens sive remit-
tens ex manifesta exarcebatōne & remissione, sin-
gulis ut plurimum, vel alternis, diebus, stata &
certa hora, periodicè recurrentibus, facillimè di-
gnosci potest; atque equidem ab intermittente in-
de duntaxat discriminatur, quod calor febrilis in
intervallis hujus Febris nunquam penitus extin-
guatur, & singuli exacerbationis paroxysmi cum
algere & horrore minùs incipiant. Sub finem cu-
juscun-

jussunque paroxysmi æger sudoribus plerumque perfunditur; & urina, quæ durante paroxysmo rubedine multa perpetuè tingitur, in remissionibus hypostasim laudabilem ut plurimum deponit. Atque sic se habet typus Febris remittentis simplicis.

Spuria;

Art. 50. In Febre verò remittente *spuria* gravia symptomata in genere nervoso suboriuntur, nempe, dolores in musculis, tendinibus, & membranis, rheumatismum, pleuritidem, colicam, ceterosque id genus morbos inflammatorios, & spasmodicos simulantia, & a partibus glandulosis enormes subsequuntur humorum excretiones; vomitio scilicet immodica, cholera morbus, diarrhœa, dysenteria, &c. unde typus *Συμμετὰ spuriae* multum obscuratur; paroxysmi periodici inde incerto, & nonnunquam sæpius eodem die recurrere solent: scilicet evacuatione, vel dolore aucto, calor & pulsus minuantur; his autem diminutis illi augmentur.

Art. 51. Febris remittens simplex, qua talis, *Prognosis;* & quàm diu talis, raro admodum, si unquam, est funesta; priusquam exitialis evadat, typum ac genus suum mutat, & transit in *Συμμετὰ malignam*. Spuria verò sive mixta, ut ut in se non sit funesta, ratione symptomatum adjunctorum ægrotantes haud raro e vivis tollit. Quod exacerbationes & remissiones diei hora magis certa redeunt, & quod remissiones magis sunt protensæ, ed melius, & vice versa. Evacuationes in *Συμμετὰ* a natura institutæ ferè semper sunt *infide*, atque ut plurimum *symptomata*: Evacuatio critica & salutifera fit solummodo *per sudores*, vel *salivationem*; prior est magis cita; altera verò aquè certa, licet tarda & molesta. Durante morbi augmento pessimum signum est, si urina sensim in tenuem & pallidam mutetur, & pulsus magis celer debilis ac vacillans evadat, &c. e contra pulsus fortis

B

& con-

& constans, urina rubedine multum tincta, & contentis saturata, multo magis quæ hypostasim laudabilem deponit, ubi morbus ad statum pervenerit, optimum prælagium exhibet, ut ut reliqua symptomata contrarium prognosticon denunciare videantur.

Curatio. *Art. 52.* Febris remittens simplex viribus *corticis Peruviani* æquè certè cedit, ac ipsa intermitteus; quippe fermentum febrile in utraque ferè idem est. Efficacia ejusdem Antidoti in *Συνχοι* spuria debellanda est propèmodum æquè certa, ac in simplici [modò ritè ministretur; respectu ad symptomata vehementia habito] non autem adeo cita est; quoniam morbus est intensior, ideoque majorem remedii quantitatem postulat: in justa autem ac regulari hujusce antidoti exhibitione, atque repetitione, harum Februm cura radicalis consistit.

Curatio
debet esse
alia si Fe-
bris ty-
pum mu-
taverit.

Art. 53. "Curationem symptomatum maximè urgentium quod attinet, vel potius mitigati-
nem, in his sicut in aliis febribus, alibi (*Art.*
102. 103. &c.) dicendum erit. Interim sat erit
impræsentiarum adnotare, quod si quando Fe-
bris remittens, vel ex peculiari morbi genio &
indole, vel ex errore aliquo typum mutaverit,
& in continuam vel malignam migraverit, cu-
rationem tunc prorsus aliam expolcit, ut infra
videbitur."

FEBRES CONTINUÆ.

Febris
continua
quid.

Fomes Fe-
brium ha-
rum om-
nium ferè
idem.

Art. 54. "Febris *Συνχος*, continua, sive Febris putrida dicta, est, quæ per plures dies sine exacer-
bationibus & remissionibus usque ad ultimam
& integram sui cessationem perdurat, aut sal-
tem ita perhibetur. *Fermenta febrilia*, seu fomes
morbosus in febribus omnibus ante dictis, & in hac
quoque gradu tantummodo differre videntur.

Art. 55.

Art. 55. " Febres continuæ putridæ plerumque ^{Venæsectio.}
 „ venæsectionem requirunt; intermittentes & ma-
 „ lignæ rarissimè aut nunquam eandem admit-
 „ tunt. In Febrium progressu ad statum appro-
 „ pinquantium sanguinem detrahare nefas est jux-
 „ ta antiquorum præcepta; *Cælius Aurelianus*,
 „ *Celsus*, & reliqui sanguinem mitti solummo-
 „ do *prima diatritho* requirunt, ultrà verò nun-
 „ quam.

Art. 56. " De venæsectione in genere dicendum ^{Non sine}
 „ est; in sanguine est *radix vitæ*, & sanguis est ^{necessaria-}
 „ ipse *vitæ thesaurus*; unde si aliis modis ægro vel ^{te.}
 „ sine periculo, vel æquè commode succurrere po-
 „ terimus, sanguini parcat. Rariores sunt san-
 „ guinis emittendi occasiones, quàm vulgò credi-
 „ tur. *Itali*, *Galli*, & *Hispani* sanguinem mittunt,
 „ non unciatim, sed libratim. In *Germania* non
 „ ultrà quinque vel sex uncias emittunt. Inter
 „ hos nos *Angli* mediam viam amplectimur.

Art. 57. " In brachio subter venam basilicam ja- ^{In quâ}
 „ cet arteria, subter medianam nervus, subter u- ^{vena.}
 „ tramque tendo; juxta cephalicam nulla est ar-
 „ teria, neque nervus, neque tendo; Atque hanc
 „ ob causam hæc ultima minimo cum periculo
 „ aperiri potest.

Vvillisi sententia.

Art. 58. In Febribus putridis continuis quatuor ^{Quatuor}
 numerantur stadia, viz. initium, augmentum, sta- ^{stadia Fe-}
 tus, & declinatio; in initio plerumque adfunt ^{brum pu-}
 symptomata sequentia, rigor aut horror; lassitu- ^{tridarum.}
 do & perturbatio cum siti & vigiliis, dolor in ca-
 pite aut lumbis, nausea aut vomitus. In incremen-
 to sequentia, sitis intolerabilis, dolor capitis & vi-
 gilæ pertinaces, deliria, phrenitis, motus con-
 vulsivi, oris amaror, & sapor ingratus, linguæ sca-
 bries, pulsus vehemens & citatus urinæ summe

Ergo.

rubicunda, plerumque turbida, contentis saturata, sine hypostasi aut sedimento laudabili. *Status* morbi *crisin* continet, quæ in Febre continua ferè idem est ac paroxysmus intermittentium, qui non nisi stato tempore, & post totidem horas, evenire solet, sic etiam motus critici in Febribus continuis a die quarto in quartum aut forsan a septimo ad septimum contingunt: Hæ *Crises* sunt plerumque per sudorem, vel hæmorrhagiam; sunt etiam aliquando *crises imperfectæ*, quæ morbum non solvunt, quales sunt per urinas, vomitum, secessum, exanthemata, bubones, &c. *Criseos* tempore sunt valde incerta. Si Febris in principio sit vehemens, plerumque intra dies quatuor expectanda est *crisis*; quodd si tardior sit Febris in initio, circa diem septimum ad *auxilium* perveniet; si verò adhuc remissius incipiat, ad diem undecimum, aut decimumquartum, vel ultrà protrahi solet.

Notabep.

Art. 59. Interea notandum est, quod sicut paroxysmi intermittentium statis redeunt temporibus, ita *motus critici in continuis*; [diem autem quartum ut plurimum observant,] nam licet crisis perfecta ad 14^{um} 17^{um} aut 20^{um} diem prorogetur, tamen intermedio tempore motus leviores contingunt, quibus materia Febrilis velut per partes amputatur, donec pleniorẽ ejus discussionem natura aggredi valeat; *natura etenim ut plurimum, nisi aliàs perturbata, quarto quovis die partem oculis sui excutere tentat*; quare ut plurimum 4^{to}, 7^{mo}, 11^o, 14^o, motus critici, non planetarum directione, sed ob naturæ necessitatem eveniunt.

Declina-
tip.

Art. 60. Per declinationis stadium intelligo conditionem ægri & morbi, quæ statum sequitur, sive in salutem sive in mortem tendat, vel aiterationem quam sanguis subit post crisin bonam vel malam, cum res adhuc in dubio versetur, quandoque etenim, crisi imperfecta existente, ægri diuturna imbecil-

CAP. I. *Febres ardentes.* 71

becillitate labefactantur, & non nisi longo tempore, si omnino convalescunt.

Art. 61. Aliquando in declinatione Februm *in-* Prychit.
mus.
crustatio in partibus oris successit (quasi species *aphtharum*) & etiam adest *salivatio* copiosa, velut ab assumpto Mercurio, cum foetore anhelitus, item linguæ & gingivarum intumescencia.

„ Ut instituatur harum Februm therapia ratio- Divisio Fe-
bris arden-
tem &
lentam.
nalis utilissima est earum divisio in *Febres ar-*
dentes & *lentas*, utpote quoad medendi me-
thodum toto [quod aiunt] cœlo a se invicem
discrepantes. “

FEBRES ARDENTES.

Art. 62. Causus seu Febris ardens ea est, quæ Causus
quid.
eum majori æstu, siti serè intolerabili, aliisque
symptomatibus insigniorem sanguinis *phlogosin* ar-
guentibus, cursum suum peragit; symptomatis
magis horrendis stipatur; crisin habet difficilem
& eventum periculosum. (Calor ad tactum serè
urens est hujus Febris *signum pathognomonicum*; &
ut plurimum, habet conjunctam insignem alieu-
jus visceris *inflammationem*.)

Art. 63. “ Huic Februm classi aliquo modo re- Lipyræ.
Affodes.
Elodes.
&c.
ferri potest 1°. Febris *lipyræ* dicta (Art. 104.)
in qua interiora uruntur, exteriora verò tri-
gent. 2°. *Affodes*, in qua ægri decubitus eun-
dem non ferentes jacendi situm perpetuo va-
riant in lecto indefinenter jactitantes. 3°. *Elo-*
des, in qua ægri profusissime sudant, sudore
nihil proficiente, &c. Sed reverà hæc sunt po-
tius Februm symptomata, quàm novæ species.
Ejusdem quoque commatis est Febris *Calentu-*
ra dicta; quæ nihil aliud est quam peculiaris
delirii species. “

Art. 64. “ Calentura est Febris nauticis pecu- Calentu-
ra.
liaris. Hoc morbo correpti singulari delirii spe-

B 3

“ cte



„ cie afficiuntur ; nimirum ajunt se in vireto ,
 „ quod semper in conspectu habent , & præsto es-
 „ se arbitrantur , ambulare velle ; & , nisi vi de-
 „ tineantur , in mare profiliunt ; atque hoc sym-
 „ ptoma est *signum hujus morbi pathognomonicum* .
 „ In mari mediterraneo frequenter occurrit ; juve-
 „ nes robustiores & temperamento sanguineo præ-
 „ diti huic Febri sunt magis obnoxii . Larga san-
 „ guinis missione ut plurimum sublevantur . “

Boerhaavii sententia .

Symptoma
 præta fre-
 quentio .
 14 .

Art. 65. In Causo adest calor ardentissimus ,
 siccitas in cute tota , naribus , ore , lingua ; respi-
 ratio densa , anhelosa ; cita ; lingua sicca , flava ,
 nigra , exusta , aspera ; sitis inexplabilis ; nausea ,
 vomitus ; anxietas , inquietudo , lassitudo summa :
 tussicula , vox clangosa ; delirium , phrenitis , per-
 vigilium , coma , convulsio ; diebus imparibus ex-
 acerbationes .

Prognosis

Art. 66. Tertio & quarto die sæpe lethalis eva-
 dit , septimum raro transit , si perfecta ; solvitur
 sæpe hæmorrhagia (quæ , si tertio vel quarto die
 parca , lethalis ;) hæc prænunciatur cervicis do-
 lore , temporum graviter , tenebrosa caligine ,
 præcordiorum contensione sine doloris sensu , in-
 vitis lacrymis sine lethali signo alio , rubore faciei ,
 pruritu narium , optima fit die decretorio ; solvi-
 tur & die decretorio vomitu , alvo , sudore , uri-
 na , sputo crasso ; accessio die pari pessima , si id
 ante diem sextum , urina nigra , pauca , tenuis huic
 lethalis ; lethale sanguinis sputum ; lethalis sangui-
 nis mictus ; deglutitio læsa mala ; extremorum
 refrigeratio pessima ; facies rubra & sudans mala ;
 parotis non suppurans exitialis , alvus nimis fluxa
 lethalis ; cum tremore abit in delirium , inde in
 mortem , transit in peripneumoniam sæpe cum de-
 lirio . “ In Febre ardente [inquit Hippocrates]
 „ si tin-

„ si tinnitus aurium cum visus hebetudine fiant ,
 „ & ad nares accedat gravitatis sensus , delirium
 „ portenditur . “

Art. 67. In hoc casu integumenta debent esse mi- Intentio-
nes cura-
tive.
 nimè aggravantia corpus ; situs corporis paulò ere-
 ctior ; potus copiosus , blandus , demulcens , sub-
 acidus , aqueus , calidus ; cibi leves , farinacei ,
 hordeati , avenacei , ex fructibus subacidis confe-
 cti ; requiritur venæsectio , si morbi initium , ple-
 thoræ indicia , inflammationis singularis signa , ca-
 lor intolerabilis , rarefactio nimia , revulsio neces-
 saria , symptomata urgentia , neque alio remedio
 facilè superanda , hanc exigant . Indicantur etiam
 quandoque *clysmata* blandè *laxantia* & *refrige-*
rantia , prout vis ardoris , siccitas alvi , imperant ;
 medicamenta *diluentia* , *nitrosa* , alvum lenissimè
laxantia , &c. Interim in animo probè tenenda
 „ est Vvaldschmidii admonitio ; Febris maligna
 „ [inquit ille] in principio sæpe speciem Causi
 „ præfert ; cautus itaque sit medicus , ne in erro-
 „ rem incidat ; animadvertendum ergo est , an
 „ Febricitans de cordis anxietate , virium jactura ,
 „ aliisque gravioribus accidentibus conqueratur ,
 „ & qualis sit urina , &c. nam longè diversa est
 „ harum Februm curatio . “
 „ Remedia particularia his intentionibus satis-
 „ facientia a sectione de Februm symptomatis
 „ [*Art. 102. 103. &c.*] petenda sunt .

FEBRES LENTÆ.

Ettmulleri sententia .

Art. 68. Febris *lenta* , etiam si sint minus acu- Febris
lenta .
 tæ , sunt tamen continuæ , in quantum continuè
 affligunt aegros , sed tardiore motu sua absolvunt
 tempora ; hinc diuturniores sunt , & symptomata
 habent minus urgentia . De febribus his apud

præcticos pauca prostant. A vitiis lymphæ (vel pituitæ) potissimum oriuntur ; & a Sylvio Febres lymphaticæ appellantur, forsân rectius pituitosæ.)

Febres
catarrha-
les.

Art. 69. Inter hæc eminent Febres *catarrhales* dictæ, quæ in principio & incremento conjunctum habent *catarrhum*, *coryzam*, *tussim*, *raucedinem*, &c. Hæ Febres sunt plerumque lentæ, interdum mitès, vesperi verò aliquantùm exacerbari solent : adest lassitudo artuum, durant symptomata sub coryza & tussi gravioribus usque ad statum morbi, donec materia catarrhalis (ut vocant) coacta fuerit, & spissior mucus emungitur, & deinde cessat Febris. Sedes morbi est in glandulis conglobatis.

Curatio.

Art. 70. In Febre catarrhali conducit *decoctum ligni sassafr.* [cum *rad. liquiritiæ* & *passulis* ad humorum acrimoniam] item *succus raparum expressus* cum paucò saccharo ; item *volatilia* & *sudorifera* ; solutio *gum. ammoniac.* &c. vid. catarrhum, tussim, raucedinem, &c. alibi.

Febres pi-
tuitosæ.

Art. 71. Præter dictas observantur quoque Febres *lymphaticæ* [potiùs *pituitosæ*] vitio lymphæ (pituitæ) glandularum conglomeratarum, quæ in certam cavitatem suam effundunt succum ; inter quas eminent parotides & pancreas, quæ in os & intestina, & consequenter in massam sanguineam secretos liquores evomunt. Peccant hi humores, quando sunt nimis viscosi salii & æres, unde excitantur hæ Febres, (quæ quoque non improprie interdum Febres *scorbuticæ* audiunt.) Acutæ continuæ, nonnunquam etiam intermittentes, in hujusmodi lentas degenerant, & quandoque in *hecticas* transeunt. Origo harum Februm est plerumque in stomacho ex indigestione & cruditatibus.

Cursus.

Art. 72. Ideoque tam in principio quam in incremento mitius *vomitivum* ad curam optimè viam sternit, & postea visciditas vel acrimonia pro-

re nata corrigenda est, & symptomata mitiganda;
& ventriculus roborandus, &c. Pro his scopis con-
sequendis aliquo modo valent remedia sequentia,
Tartarus vitriolatus, pulvères testacei, antimonii
diaphoreticum, antihecticum Poterii, tinctura
corallii, salia volatilia, &c.

Art. 73. “*Febres colligativæ sunt; in quibus* *Febres*
colligati-
tivæ.
„ corpus brevi tempore insigniter consumitur,
„ & emaciatur; partes solidiores & ipsa pingue-
„ do colliquescit, nunc per diarrhœam, nunc per
„ sudorem, nunc per urinam, nunc solo ardo-
„ re febrili sine ulla sensibili excretionem; Febris
„ aliquando *colligativa* ex cancro mammarum
„ cum diarrhœa observata est. Hactenus de Fe-
„ bribus benignis.

FEBRES MALIGNÆ.

Ettmulleri sententia.

Art. 74. Febris malignæ primum signum est su-
bitanea virum prostratio citra causam manifestam
cum pulsu debili; calor externus non adeo inten-
sus ac in quibusdam aliis Febribus; potius interiora
uruntur; adsunt vigilæ pertinaces mox a principio
morbi; inquietudo anxiosa; conqueruntur ægri, &
monstrant regionem stomachi seu præcordiorum;
urina est sanorum similis; facies interdum solet es-
se tetra, & a statu naturali multum mutata, livida
interdum, aut plumbea. In his Febribus, quod æstus
& Febrilis ebullitio ut plurimum remissior sit, mali-
gnitati, quæ sanguinem occupat, prorsus debetur,
& spirituum magis *affectorum & quasi fideratorum*,
quàm turbatorum humorum indicium est: aut sal-
tem in humoribus, præsertim sanguine, à fermenta-
tativis malignis miasmatis confusionem, & in textu-
ra & motu intestino eorum inordinationem indicat,
& ita incalescentia quidem, sed internè tantum gli-
scens, non verò ad exteriora pergens, accidit, unde

Febris
malignæ
Diagnosist.

natura quasi oppressa non potens est symptomata illa magis regularia exercere, quæ morbo competunt .

Magna
varietas.

Art. 75. Ratione symptomatum adjunctorum magna est varietas Februm *malignarum* ; dum quædam cum certis & insignibus cutis *efflorescentiis*, quædam sine iis, vel paucis admodum, quædam alijs symptomatibus stipatæ sunt .

Vermi-
cula.

Art. 76. Nonnulli asserunt (ex observationibus microscopis) in omnibus Febris malignis & ulceribus gangrænosis talem adesse putridinem sanguinis, at exinde copiosissimi generentur *vermiculi*, qui, ubique scaturientes, & corpus lancinantes, tam varia inducant symptomata, necesse est: Sed hi vermes non nisi putredine præcedente generari possunt. In Febris malignis sanguis est nimis fluidus, vix aut planè non omnino congruemiscit (152.) sed hoc quoque est morbi *productum*. Malignitas aliquando est tanta, ut partes nunc internas nunc externas *sphacelo* ac *gangræna* correptas observare liceat .

Prognosis.

Art. 77. Audita Febre *maligna* homines contremiscunt; siquidem omnes Febres malignæ sunt admodum periculosæ, & quoad exitum valde incertæ, unde *Galenus* malignas Febres statuta ad judicandum non habere tempora asserit. Surditas in principio periculosissima, in statu verò morbi salutem portendit. Narium stillicidium, ut & alvi fluxus, quocunque morbi tempore, sunt pessima signa. Mulcarum venatio, aut floccorum collectio est ferè semper lethalis. Interdum bubones circa genitalia apparent, quibus die undecimo erumpentibus morbus evanescit. “ Medicus (re ètè „ admonente Vvaldschmidio) nunquam ab ægro „ recedat, nisi prius inspexerit *oculos*, quorum „ insolita mutatio infaustum predicit eventum; „ & dum pulsum explorat, semper attendere debet an manus ægrotantis sit tremula .

Art. 78.

Art. 78. Venæsectio in Febris malignis locum non habet : quod malignior est Febris , ed magis nocet ; & quod tardius instituitur , ed deterius .

— *Vomitiva* in primo principio morbi præ cæteris omnibus maximè conducunt , antequam natura moliatur aliquam excretionem per cutim ; elapso verò primo principio elapsa est occasio ; Et postea cura aggredienda est medicamentis sudorem moventibus ; sudores etenim (ipsa natura monstrante viam) causam & morbi fomitem frequenter expellunt , hæc medicamenta *bezoardica* aut *alexipharmaca* appellantur ; quod autem major est malignitas ed copiosius provocandus est sudor , respectu semper habito ad morbi genium , diversitatem , agroti vires , &c. *ter ad minimum in 24. horis sudorifera sunt propinanda* ; interponenda sunt *analeptica* & *blandè acida* , inter quæ eminet *spiritus nitri dulcis* , (item *tinctura croci cum spiritu nitri dulci extracta*) *succus citri* , *cydoniorum* , &c. *Campora* est nobile alexipharmacum , sed omnes ejus usum ferre non possunt , præsertim mulieres & literati , quorum spiritus animales sunt mobiles & dissipabiles ; est mirabile concretum , & , si cum cautela usurpetur , vix datur par remedium . *Rob. sambuci* est egregium sudoriferum pro pauperibus . *Cantharidum* & *vesicantium* usus in statu morbi insigniter prodest . *Sal volatile C.* & *sal viperarum* sunt sudorifera , & malignitati resistunt ; & hic locum habet *mistura simplex Paracelsi* , viz. *℥. sp. theriacal. camphorat. ℥x. sp. vitriol. ℥ij. sp. tart. rectificat. ℥vj.* digere in phiala hermetice obsignata ad tres septimanas , ut uniantur exactissimè ; dos. *℥j.* plus minus in vehiculo appropriato , ciet sudorem . “ *Item deco-* , *ctum sacrum Fulleri* , & *haust. diaphoret. ejus-* , *dem* , *bezoard. mineral. tinctura bezoardica* , o- , *leum Heinsij* (Art. 192.) &c.

FEBRIS PETECHIALIS.

Estmulleri sententia :

Febris
petechia-
lis symp-
tomata.

Art. 79. Febris petechialis est Febris maligna , in qua ; præter symptomata reliquis Febribus malignis communia ; adest insignis lassitudo totius corporis ; dolor universalis contundens & lancinans ; maculae raro die quarto ; sæpius circa septimum erumpunt , præsertim circa pectus & scapulas ; hinc abdomen , crura , brachia (collum) ordinariò facies solet esse libera : interdum non maculae solum sed vibices apparent ; in declinatione aliquando quasi *pyralismus* exoritur cum euphoria ægri .

Prognosis.

Art. 80. Maculae hæ in morbo salubri efflorescentia intense rubent instar pulicum morsuum , (petechiae differunt a puncturis pulicum , quod in puncturis in medio punctum appareat , quod semper manet etiamsi reliquum ruborem comprehensione vel frictione pellas .) hinc pedetentim pallescunt flavescent ; sicque evanescent , & quo magis rubicundae sunt , eò melioris notæ ; e contra ; quæ ex rubore livefcunt , vel nigrescunt , pessimæ sunt ; si retrocedant , ingens periculum imminet .

Costa.
Giosæ.

Contagiosæ sunt hæ Febres , & interdum *epidemicæ* grassantur ; admodum periculosæ sunt ; plures moriuntur quàm evadunt .

Curatio.

Art. 81. Quoad curam Febrium petechialium , eadem indicationes , atque suprà circa Febres malignas in genere , hic obtinent ; si præmaturè & nimis citò maculae retrocesserint ; applicanda sunt *vesicatoria* , quæ etiamsi raro aut nunquam denuò apparere solent , earum tamen absentia vesicatoriis quodammodo suppletur ; & symptomata nervosi generis ex earum retrocessione interdum felicissimè præventur . Apparentibus *petechiis* nihil amplius

CAP. I. *Febris petechialis.* 29
plius in primis viis moveri debet ; ipsa enemata
sunt suspecta.

Donckersii sententia.

*Art. 82. Febris petechialis, sive continua malie
gna epidemica in civitate agroque Colonienfi cir-* *Symptoma.*
ea annum 1673. ad hunc modum se habuit ; ex *Invadendū*
improviso plurimos occupavit anxietas præcor- *modus.*
diorum , gravitas circa regionem ventriculi , ap-
petitus dejectio , spontanea artuum lassitudo , nec
non vertiginosus capitis dolor , præsertim circa o-
riginem nervorum opticorum ; quibus omnibus
postmodum cum virium subita prostratione acces-
sit Febris putridæ plurimum referens ideam syno-
chi utpote quæ præmisso brevi horrore vel rigore,
universum corpus magno , & quem dicunt ,
præternaturali perfundebat calore , sequentiaque
secum adducebat symptomata.

Art. 83. Pulsus in omnibus erat celer , & ple-
rumque parvus ac debilis ; sitis invalescente mor- *Symptoma.*
bo , cum linguæ siccitate inextinguibilis ; urina in
morbi principio ordinariè quidem apparebat sana,
aliquando tamen rubra & obscura , in fine vero
augmenti , vel initio status turbata , in declinatio-
ne semper cum sedimento , saltem aliquali ; alvus
in aliis adstricta , in aliis laxa erat ; infestabat ut
plurimum ægros hypochondriorum præcipuè sini-
stri dolor. (quod notandum) per lumbos secun-
dum spinam dorsī ascendens lancinans ad scapu-
las extendebatur , & cui non rarè se præbebat
comitem pleuritis vel angina ; multos in princi-
pio augmenti defatigabat alvi fluxus , cum quo
non rarè lumbrici excernebantur ; multi quoque
alii in medio augmenti in aurium tinnitum , gra-
vedinem auditus , & aliquando oculorum suffusio-
nem , quin nonnunquam in omnimodam eor-
undem sensuum ablationem incidebant ; omnes
deci-

denique affligebantur perpetuis vigiliis & delirio ; quod in aliis levius , in aliis gravius fuit , concomitantibus semper rubris vel lividis aut subnigris maculis .

Solutio : *Art. 84.* Horum similiumque symptomatum *syndromen* in omnibus , quorum cura mihi commissa fuit , vel (quatenus ex aliorum relatione potui colligere) quorum natura inversa curandi methodo non fuit planè consternata , septimum circa diem subsecuta fuit *crisis* , vel manifesta vel obscura .

Contagium. *Art. 85.* Hic morbus in primo sui ortu aliquandiu apud paucos veluti latebat ; peditentim verò symptomatum malignitate fenerumque frequentia longè latque sæviebat , & ad tertium usque annum plus minus invaluit , & nonnullis in locis tertiam incolarum partem e medio sustulit .

Prognosis. *Art. 86.* Si delirium circa diem criticum vel primum accidebat , vel majus evadebat , concomitantibus diarrhœa , obscura voce , & difficillima (citra faucium tumorem) deglutitione , necnon digitorum manuum labiorumque tremoribus convulsivis , indubia instantis mortis erant indicia ; in hac Febre quando alius aliquis morbus se illi conjunxerit , multò periculosior fuit : lethalis fuit frequentius in cacochymicis , plethoricis , & valde obesis ; pulsus parvus celer in morbis principio malè ominatur ; Maculæ parvæ & nigræ aut lividæ malè portendebant : quibus verò floridæ tempestivè prodierunt , nempe die quarto seu indicatorio , sub *legitima medicatione* , ut plurimum servatos vidi , alii autem , in quibus tales maculæ serids vel instante die critica sub cuticula obscure proreperent , septimoque die vel immediate post magis debilitarentur , ac pejus haberent & non evalescere ; exitialis quoque ægro ut plurimum fuit , si præter pulsum a principio insigniter parvum , debilem & celerem , urina quoque sem-

Signa ut plurimum febralia .

semper maneat sani coloris & consistentiæ ; si ægrotus mente consternatus se non ægrotare aut bene habere & continuè esurire putet ; si cum magna faucium linguæque ariditate parum bibat ; continuaque adsit oculorum lacrymosa distillatio : hæc enim & similia symptomata ; si non certum interitum , saltem extremum vitæ discrimen denotant . Certus denique pronunciatur interitus , si circa criticum seu septimum diem , urina in eadem perseverante bonitate & claritate , delirium majus fiat ; si sitis acuta sit cum tanta linguæ fauciumque ariditate , ut æger non nisi inarticulatè loqui , neque nisi cum difficultate deglutire queat ; si adint convulsiones ; insuper si , exiguis & fuscis sub cuticula obscure emergentibus maculis , alvi fluxus superveniat ; mors in propinquo est .

E contrà verò si pulsus non sit nimis debilis , & si sit mediocriter magnus , & non præter modum celer ; si delirium leve & insomnio quam delirio similis ; si lingua non admodum sicca , sitisque tollerabilis sit ; si maculæ sint rubra , majusculæ , rotundæ , clare , & distinctæ , si post tertium diem erumpant ; & urina circa idem tempus rubra & obscura , vel cum nubecula spectetur , bonum hinc lætumque præfagire oportet eventum , qui si ne dubio septimo die insequitur , quando scilicet erupto sudore quietoque oborto somno symptomata quæque graviora remittunt , & æger perfectè judicabitur .

Signa fatalitatis.

Art. 87. Cura ab alvi purgatione semper inchoanda est ; si nempe nullum aliquid urgens symptoma aliter suadeat ; si vero morbus fuerit valde inflammatorius , pleuriticus , vel anginosus ; &c. ante omnia præmisso clystere *venæsectio* instituenda est , & remedia *antipleuritica* propinanda ; & aliquando phlebotomia est iteranda (sed parcè & non nisi cum cautela aperienda est vena in Febribus mali-

Curatio.

malignis.) Cathartica calida sunt vitanda, lenitiva, & quæ sanguinem minùs exagitant, sunt eligenda. Factis his juxta indicationes particulares evacuationibus, sanguinis naturalis effervescenzia confortanda est convenientibus *Alexipharmacis*, sed non violentis, ac si hostis una vice expellendus esset. Ex innumeris remediis, quæ in hunc scopum apud authores inveniuntur, elegimus vulgatissima, atque ab omni ævo probatissima, & idcirco tutissima; *mithridatium* nempe, *theriacam*, *diascordium*, &c. Cavendum est imprimis ne sudorem expellere conemur sola vi medicamenti, autequam ipsa natura eum sponte excitare molitur. Potus debet esse neque nimis calefaciens, neque valdè refrigerans; inchoante crisi cum sudore nihil convenientius expertus sum, quàm ut ægri *aquam hordei calidissimam* copiosè bibant cum vino mixtam, & quandoque cum *flor. papav. errat.* & *rasur.* C. C. incoct. cibus debet esse tenuissimus vel potiùs nullus.

Potus :

&

Cibus.

Art. 88. Purgationis in morbis principio necessitatem & bonos effectus non tantùm inculcat ratio manifesta. (de qua, si quis velit, videatur author) sed & experientia mihi confirmavit, adeo frequens, adeo certa, adeo clara, ut si hæc falsa sit, aut esse possit, nulla certa aut sit, aut fuerit, aut futura sit unquam.

Cathartica.

Art. 89. Remedia cathartica mihi usitata fuerunt vel hujusmodi apozema vel electuarium subsequens: ℥. Fol. sen. mundat. ℥iij. sem. scænic. ℥iij. crem. tartari ℥j. coq. in q. s. aq. font. ad ℥vj. in colatura dissol. pulp. tamarind. ℥ij. syr. ros. solutiv. m. ℥j. sumatur partitis vicibus. Electuarium sic se habet; ℥. Pulv. tamarind. ℥ij. confect. alkerm. pulv. jalap. ana ℥ss. resin. ejusdem gran. vj. diagrid. gr. v. cum q. s. syr. de cicbor. cum rheo s. electuarium. Misturam alexiteriam ferè semper hujusmodi cochleatim bibendam propinare solebam; ℥. Theriac. andromich. diascord. fracastr. ana ℥i. sal. absynth.

℥. i. xxi.
℥. i. xxi.
ed.

absinth. ℥℥. *ocul. cancrorum.* ℥ij. *aq. card. ben.*
meliss. ana ℥ij. *theriacal. syr. papav. errat. ana*
℥j. *sp. sulph. q. s. ad gratum acorem, f. mixtu-*
ra. Ex magno agrotorum numero, quos sub mea
 habui cura, licet aliquando quinque, sex, vel se- Successus
admiran-
 ptem simul in eadem domo Febre ista laborave-
 rint, nullus, quodd. meminerim, sit desideratus
 præter unum virum & unam foeminam. " Fides
 " sit penes authorem.

Art. 90. " In calce libelli historias LII. hac sed in
dubium
vocandus;
 " Febre decumbentium in medium profert, quo-
 " rum duo tantum mortui sunt. Illius methodus
 " est planè singularis; &, si dictis fides adhiben-
 " da sit, proculdubio curationes hæc *laudano* po-
 " tissimum acceptas referre (ut mihi visum est)
 " debemus: in omnibus enim ferè præscriptis *lau-*
 " *dano* larga manu propinavit: exemplo sit bo-
 " lus sequens, *℥.* *Diascord.* ℥ij. *laudan. opiat.*
 " *gr. ij. m. f. bolus* pro una vice, concesso eodem
 " tempore in potu ordinario *syrupo papaveris er-*
 " *rat. p. 467.* His expendendis haud mihi suppe-
 " rit tantum otii, sed ad propositum reverten-
 " dum est, "

DE FEBRIBUS IN GENERE.

Farrago sententiarum.

Art. 91. Hippocratis aphorism. 36. §. 4. Sudo- De dis-
buscrip-
tis;
 res febricitantibus boni, qui manare cœperint die
 tertio, quinto, septimo, nono, undecimo, decimo
 quarto, decimo septimo, vigesimo primo, vice-
 simo septimo, tricesimo primo, tricesimo quarto; &
 ii enim sudores morbos judicant: qui secus eve-
 nerint, laborem, & morbi longitudinem, & re-
 cidivas significant. Aphorism. 24. §. 2. Index se- Indicibus
 primi quartus; sequentis septimanæ octavus ini-
 tium; spectandus quoque est undecimus, siquidem
 C is se-

Doctrina
eorum
valde ob-
scura.

is secundæ septimanæ quartus est ; rursusque decimus septimus spectandus : is enim a quarto decimo quartus est , & ab undecimo septimus . *Dicrum* (inquit *Lifter*) indicum & contemplabilem ad *crises*, explicandas tota doctrina valde obscura est . Est quidem trium concoctionum quedam mensura , ut ex anatomia & statica medicina planè constat : ita Februm intermittentium periodi statæ sunt ; in aliis verò morbis acutis , quales sunt Febres symptomaticæ , ut pleuritis , angina , variolæ , & Febres continuæ , *crises* , earumque indicia fortè non ita promptè animadvertimus , quod parum naturæ , sed nobismet ipsis (quod tamen veteres non fecerunt) totam ferè sanationem vindicamus .

Utilitas
vomitorii
in Febrim
um princi-
pio.

Art. 92. Nullum remedium (inquit D. D. *Frenind*) sub initiis Februm est aequè salutare ac vomitorium , sæpenumero & necessarium est , si quando , quod plerumque fit , vel nausea , vel ventriculi gravitas , vel etiam capitis dolor invaserit : hoc medicinæ genus apud vetustissimos *Græcos* haud infrequens fuit , & *Celsi* temporibus *Romæ* perquam familiare . Medicamenti , quo vomitus cietur , interior est quædam actio ; quæ nusquam aliàs se manifestius prædit , quàm in celebri illa radice *Ipecacoanha* . Hujus sanè vis in attenuandis humoribus eximia est ; cui & fidem facit summa herbæ amaritudo , & vividus ille , qui apparatus *Chymico* elicitur , *sal* . Equidem hanc radicem non parca manu adhibitam esse comperi , cum nulla ferè vel per os , vel per alvum sequeretur purgatio : Elapsa autem una aut altera hora incallescere capit ægrotus , ita ut , pulsu excitato , tandem in uberrimum sudorem colliquesceret .

Virtus
singularis
rad. Ipeca-
coanhe .

Febres
vix sine
vacuatione
citantur .

Art. 93. Hoc unum spondeo . (idem laudatus author) quemquam experiundo comprobaturum , quod scilicet ex Febris multæ evacuantibus solis , etiamsi haud alio fuerit remedio usus , cedere

con-

consuescant; vix ulla autem, quæ paulo vehementius invaluerint, medicina qualicunque si ab hac evacuandi instituto decesseris, restingui possunt.

Methodus Ludovici in curandis Febris.

Art. 94. "Hæc est accuratissima Danielis Ludovici methodus curandi Febres continuas, nempe, in principio præmissio vel omisso vomitu, mox volatile aliquod v. gr. *tincturam bezoardicam*, *mixturam simplicem*, *spirit. C. C.* & pro circumstantiarum ratione cum *opiat* exhibendo; in statu *fixiora*, *terrea*, *alcalina*, in declinatione *cancrina*, *corallina*, &c. hac nempe methodo nec crisin negligit medicus, nec otiosè eam expectat.

Art. 95. "Quod mitiora pathemata sunt circa primas vias & regionem stomachalem, eò mitior & salubrior est Febris.

Art. 96. "Facies turgida & subtumida morbi longitudinem pronunciat.

Signa prognostica.

Art. 97. "Quod magis sudant febricitantes, eò minor est sedimenti copia in urinis; Glutinosus sudor est pessimus.

Art. 98. "Quantò urina rubicundior est in initio, tantò citius terminatur Febris, cum signis bonis ad bonum, cum malis ad malum: Urina alba aut pallida & admodum cruda in Febris ardentibus periculosa est, & plerumque mortem portendit, præsertim si adsit delirium; convulsiones enim sunt in propinquo.

Art. 99. "Surditas in Febris, urina existente cruda, delirium grave portendit; sed si cum signis coctionis jungatur, benè ominatur.

Art. 100. "In Febris, si ægri non possunt discernere colores, imminet convulsiones.

Art. 101. "In omni Febre pulsu existente languido, inæquali, aut formicante, cane pejus & angue *opiata* vitentur.

Cautela de usu opii.

DE FEBRIUM SYMPTOMATIS gravioribus.

Inter legendum & ex observatione .

Frigus.

Art. 102. Frigus in Februm initiis oritur ex imminuta cordis contractione liquidis ad extrema ferè stagnantibus; unde oriuntur, si diu maneat, *polyposa* in vasis majoribus *concreciones*, & interdum mors subitanea insequitur; ideoque quo magis in initio frigus ed periculosior est Febris; in peste incipiente frigus est summum. — Optimè curatur potu aquæ calidæ *nitrosæ* cum paucò vino, *decoct. cocin. frictione blanda*, &c. (45.)

Calor:

Art. 103. Calor intensissimus in Febris & velut incendium cum magno & forti pulsu ferè semper *venæsectionem* postulat; quandoque etiam *elysma leniens* calorem mitigat. Nimius sanguinis fervor & ebullitio *julapiis*, *emulsionibus* & *decoctis appropriatis* attemperandus est; sed apprime cavendum est, ne ex nimia attemperacione spiritus elasticitate sua plus justo orbentur, & inde Febris ardens inopinatè in *malignam* mutetur. (*Art. 67.*)

Lipytia.

Art. 104. Febris *lipytia* dicitur, quando interiora uruntur, exteriora verò frigent; oritur ex *inflammatione visceris interioris valdè sensibilis*; algor autem non est tactu medici judicandus, sed ægri judicio, qui se algere dicit, & tegi jubet; tepent enim membra; hæc Febris brevi terminum absolvit, plerumque intra triduum vel quatrimum, & vix unus evadit, nisi statim ab initio occurratur.

Sitio:

Art. 105. Ad sitim in Febris extinguendam meliùs est frequentius & parcius bibere, quam una vice multum ingurgitare; sequens est potus gratissimus febricitantibus; *℥. Aq. font. cum pane tost.*

CAP. I. *Februm symptomata*. 39
ne tost. decoct. ℥ij. vin. rhenan. ℥ss. gelatin. C.C.
℥ij. syr. cydon. vel è succ. citr. parum misce .
 Convenit etiam *decoct. ad sitim Fuller. vel decoct.*
coccin. ejusdem. Gargarismata quoque usui esse
 possunt, ut *gargarisma commune Fulleri, deco-*
ctum rosarum pro gargarismate, &c. Frequens a-
 blutio oris cum simplici aqua multum confert ad
 sitim fallendam. Sitis (ut rectè monet *Helmon-*
tius) non oritur a calore sed a defectu salivæ,
 hinc guttæ aliquot *spir. sulphur.* plus levant sitim,
 quàm integra mensura aquæ frigidæ; in eundem
 finem etiam conducunt *succi è vegetabilibus &*
fructibus, ut acetosæ, aurantiorum, limonum, ci-
tronum, ribium, berberum, cydoniorum, &c. Præ-
 cæteris commendabiles sunt hi succi per sponta-
 neam residentiam post *sulphurationem* secundum
Helmontium depurati, & in loco frigido asservati;
tamarindi quoque optimè conveniunt sitim leni-
 endo, & alvum blandè laxando: hæc verò *acida*
 & *refrigerantia* non sunt omnibus Febricitantibus
 indiscriminatim porrigenda; sed opus est maturo
 consilio: si enim præter sitim importunam adsit
 etiam summa debilitas, tum vinosa & spirituosas
 tutius propinanda sunt.

Art. 106. Psisana ex hordeo omnibus aliis for-
 bitionibus præfertur ab Hippocrate in lib. de vi-
 ctus ratione in acutis; & crebrior est ejusdem
 mentio apud veteres medicos; sed recentiores hor-
 deo vitio vertunt ejusdem cruditatem ac flatulen-
 tiam, & *jusculum avenaceum* substituunt.

Art. 107. Siccitas & asperitas linguæ corrigun-
 tur *humectantibus & lenientibus.* Febris cum *pru-*
nella dicitur; quando lingua, crusta nunc albi-
 cante nunc nigricante obducta, colore nigricante
 puniceo apparet tincta; ipsa saliva infecta vide-
 tur esse maxima causa. In *prunella* præter *muci-*
lag. cydon. &c. conducit sequens gargarisma, *℥i.*
Liquor. è rapis coct. express. ℥ss. succ. sedi ma-
ior.

jusculum
avenae
cicum.

Siccitas
linguæ &
prunellæ.

jor. depurat. ℥iij. mellis dispumat. ℥j. sp. sal armoniac. q. s. m. Sequens quoque mixtura commodissima est, *℥. Alb. ovi unius, fortiter agitetur cum aq. spermat. ranar. ℥iv. mel. ros. ℥j. m.* Ad linguæ etiam ardorem & dicitatem quandoque in usu sunt sequentia, viz. Mucilago sequens *℥. Mucilag. cydon. ℥ij. pulp. tamarind. amygd. dulc. excort. ana ℥j. ol. sulph. per campan. gut. xx. syr. de rub. Ida q. s. misce. decoct. ulmi bat gargarisma commun. Fuller. loboc rub. vel loboch. vitellin. ejusdem.*

Nausea
& vomitus
tuss

Art. 108. Nausea & vomitus in Febris, cum a crapula ortum ducant, leni vomitorio (v. g. liquore posset, cum foliis cardui benedict. decoct. copiose ingesto, addendo inter vomendum bis terve *sal. vitriol. ℥ß. vel coch. oxymel. scillit.*) tutissime curantur; ubi verò fermentum febrile ventriculum petit, & enormes vomitiones biliosas excitat, ut agri vix quicquam vel medicamento vel alimenti retinere valeant, imprimis convenit jusculum tenuissimum pulli affatim ingerere, & postea remediis appropriatis tonum ventriculi laxatum firmare; sequens Julapium est valde efficax, *℥. Sal. absynth. Div. succ. limon. recens express. ℥ij. misceantur & finita ebullitione add. aq. cinnamom. bord. ℥iij. menth. Stephan. ana ℥j. sp. croc. ℥ß. ol. garioph. g. iv. syr. Cydon. ℥i. m.* Interdum ad laudanum confugiendum est, Plura de vomitione sistenda videantur alibi (594.)

Diarrhœa.

Art. 109. In Febris aliquando accidit *Diarrhœa colliquativa* magno agrotantium damno, quæ evacuatio non naturæ vi, sed morbi potius impetu & acrimonia turgentis humoris naturam stimulantem fit, adeoque *symptomata* est, & sisti debet; convenit *decoctum album* pro potu ordinario; re-
tæ exhibentur *pulveres testacei absorbentes diaphoreticis admisti*; & postremò ad *diascordium, theriacam*, &c. deveniendum est, enema sequens quan-
doque

CAP. I. *Februm symptomata.* 39
doque ſingularem præſtat opem, *℥. Fol. roſ. rub.*
m. ʒj. coq. in lact. chalyb. ꝑꝑ. in colatura diſſolv.
diaſcord. ʒij. m. f. enema diutiſſimè retinendum.
Hic etiam plurimum facit, mihiq; in frequenti u-
ſu fuit, *enema de malicorio Fulleri*. In genere ob-
ſervamus in Februm initiis alvum laxiorem quam
adſtrictiorem meliorem eſſe, in progreſſu verò mor-
bi pejorem. Unicum hic notatu dignum obſervare
liceat, nempe in diarrhœis colliquativis in declina-
tione Februm accidentibus, & diu, non obſtanti-
bus remediis quibuſcunque adhibitis, perſeveranti-
bus, ſolam ſorbitiorem *jusculi pullini* prohibitis
omni alio victu & potu quocunque diarrhœam bre-
vi penitus tollere & ægrum reſtituere, ut experien-
tia me docuit.

Art. 110. Interdum *Dyſuria* eſt ſymptoma mo- *Dyſuria,*
leſtiſſimum. *Emulſiones communes* efferveſcenti-
am humorum in Febris ardentibus plurimum
compelſcunt, & hoc vexatiſſimum ſymptoma ple-
rumque ſublevare ſolent, ut etiam *ol. amygd.*
dulc. cum ſyr. de alth. *Dyſuria* ex applicatione
veſicatorium in Febris *gum. arab.* commodè me-
detur, *ſolutum ſcilicet ad ʒij. in decoct. bard. ꝑꝑ.*
pro potu communi. Emplait. epifpaſtic. Fulleri eſt
omnium longe optimum & certiſſimum. Operæ
pretium eſſet fortasſe experiri vires *Camphoræ* in-
termiſcendo ipſam in compoſitione epifpaſticorum,
num ſtranguriam vel ardorem urinæ inſecutorum
præcavere potis eſſet.

Art. 111. *Sudor* in Febris, qui vel morbi ini- *Sudor,*
tio vel quovis alio tempore ante diem criticum,
nec adhuc viſis coctionis ſignis profluat, eſt *ſym-*
ptomaticus, & frequenter *colliquativus*, qui ægro-
tum gravat, & morbum exaſperat, idecque ſi
modum excedat, arte, ſi fieri poſſit, cohibendus
eſt: prohibetur ſurgendo ex lecto; corpus a ni-
miis integumentis liberando; aerem frigidiuſcu-
lum admittendo; a calefacientibus abſtinendo; *le-*

niter astringentia & blanda acida capiendo, &c. egregiam vim in sudoribus sistendis habet *saccharum Saturni*.

Dolor capitis, &c.

Art. 112. Immanis capitis lumborum vel artuum dolor in Febris maxime in initio ut plurimum *Venessectionem* postulat; manente nihilominus cum vehementia dolore injiciendum est *enema laxans*; fortassis levamen aliquale dolenti capiti conferre potest sequens epithema *℥. Sem. papav. alb. parum contus. ʒʒ. placent. rosac. ʒj. vitel. ovi unius, acet. sambucin. q. s. misceantur super ignem, & t. epithema fronti admovendum, & sæpius renovandum.*

Vigilia.

Art. 113. Vigiliæ pertinaces in Febris succurrendæ sunt, ne dissipatis spiritibus vires frangantur. Investiganda est causa vigiliarum; si a fervore & siccitate proveniant, conveniunt refrigerantia & humectantia; si a dolore, propriis remediis leniendus est dolor; non nisi necessitate coacti ad *opiata* confugimus. Obiter monendus est medicus, *ne criticis vigiliis seu ab inquietudine critica suscitatis auxilium hypnoticis præbere sataget.*

Coma.

Art. 114. Prædicto malo contrarius est *sopor nimius* in Febris, seu *coma*, sive *assidua somnolentia*; quando sopor morbosus evadit, excutiendus est omni arte, ne calor natus opprimatur; injiciendi sunt *clysteres acres*; *epispastica* variis partibus admovenda sunt, & *cataplasma de hellebibus* sive *de raphan. Fulleri* plantis pedum applicandum; interne conveniunt *salia volatilia, cephalica, &c.* (*Art. 298.*)

Delirium.

Art. 115. Pervigilium frequentissime est causa delirii, non ideo delirium *hypnoticis* curari tentandum est; nam id esset temerarium, sed indaganda est causa, & remediis appropriatis auxilium ferre conandum est. *Camphora* (inquit *Quincy*) in delirio Februm somnum conciliat opio nequiram

CAP. I. *De Febris eruptivis, &c.* 41
tquam proficiente. Delirii in Febris imminen-
tis signum est, urinarum, quæ antea valde tin-
ctæ erant & flammæ, in tenues & aquosas mu-
tatio.

Art. 116. Convulsiones quoque interdum super-
veniant, tremores item & affectiones spasmodi-
cæ; in tali rerum statu diligenter expiscanda est
causa horum symptomatum, unde medicus intel-
ligat, quibus remediis internis opem ferre valeat,
interim plantis pedum applicari possunt *duo colum-
bi* pullive recens mactati & per medios secti, vel
toti pedes involvi possunt *calidis pulmonibus agni-
nis, vitulinis, vel vervecinis*; renovari debent
hæ applicationes saltem ter in die.

Spasmi.

DE FEBRIBUS ERUPTIVIS in genere.

Inter legendum.

Art. 117. Febres *Eruptivæ*, quarum *crises* per
eruptiones cutaneas expectandæ sunt, (quales sunt
variolæ, morbilli, Febris scarlatina, Febris cum
rubeolis, crystallis, Febris miliaris, &c.) præter
symptomata aliis Febris communia hoc habent
peculiare & sibi proprium, nempe, *ingentem pec-
toris oppressionem*, quæ harum Febris est signum
ferè *pathognomonicum*; nimirum est quidam vali-
dus naturæ conatus materiam morbificam a cen-
tro ad circumferentiam propellendi; unde certa-
mina gravissima; anxietas præcordiorum, pectoris
angustia & oppressiones maximæ: facta autem eru-
ptione, statim hæc dira symptomata evanescent.
Ejusmodi *pectoris oppressio* in aliis quoque Febris
est *crisum præcursor* (unde dictum illud, nox an-
te crisin est molestissima) in his tamen seriùs ac-
cidit, scilicet sub morbi finem; in eruptivis verbò
non procul ab initio, imò frequenter propemo-
dum

Febris
eruptiva-
rum sym-
ptoma pe-
culiare.

dum in primo insultu; quoniam *efflorescentia* in propinquo est.

Sympt.
præterquam
dam insi-
gniora &
fere pro-
pria.

Art. 118. " Præter symptomata aliis Febribus communia (inquit Mortonus) in Febribus eruptivis adsunt signa quædam quasi *pathognomonica*, talia sunt pulsus debilis, & celer, respiratio cita & anhelosa, hypocondriorum oppressio, & angustia, urina pallida, ac tenuis, coma, seu vigilæ pertinaces, subsultus tendinum, nonnunquam spasmi manifesti, & deliria prorsus effrata, gravativa palpebrarum debilitas, oculorum rubedo, punctura dolorifica, & lacrymæ involuntariæ, in gutture dolor ulcerosus, rauco, clangosa, tussis perpetua molesta. De Febre miliarî & petechiali alibi.

Art. 119. In erysipelate, variolis, morbillis, Febre scarlatina, &c. (inquit D. Freind. Hist. Med. p. 75.) si symptomata vehementiora fuerint, si caput aut pulmones vehementius urgeant, aliæve partes ingenti dolore supra modum afficiantur; ratio postulat, ut vena incidatur, ac tutè fieri licet. Et teste experientia [nihil enim frequentius expertus sum] audacter affirmo me nunquam observare potuisse eruptiones istiusmodi ex venæsectione retroire.

FEBRIS SCARLATINA.

Sydenhami sententia.

Febris
scarlati-
na.

Art. 120. Febris *scarlatina* quovis anni tempore, sed ut plurimum sub autumnum, se prodit, infantes præ cæteris infestans; rigent horrentque in initio, ut in aliis Febribus, neque vehementer agitant; postea cutis universa maculis parvis rubris interstinguitur, latioribus magisque rubentibus, at non perinde uniformibus, ac sunt in morbillis: ad duos tresve dies perdurat rubedo, & deinde evanescit, cutem relinquens aliquantò asperam & furfuraceam.

Art. 121.

Art. 121. Quoad curam naturæ prorsus relinquitur. Curatio. da est, vel, si medicatione opus sit, cum morbillis satis convenit.

Art. 122. " Febris scarlatina [inquit Morto- ^{Efflores-}
 „ nus] a morbillis minimè distat, nili ^{centia-}
 „ *efflorescentia* modo; *morbilli confluentes* dici possunt. Idem ^{modus.}
 „ postulat regimen, eandemque medendi metho-
 „ dum. *Efflorescentia* in morbillorum interstitiis
 „ figuram diversam viz. oblongam, quadratam,
 „ vel multangulam obtinet, undè cutis variegata
 „ est: in Febre autem *scarlatina* una continua-
 „ ta inflammatione & rubedine cuticula perfun-
 „ ditur.

M O R B I L L I.

Sydenhami sententia.

Art. 123. In morbillorum apparatu primo die ^{Historia}
 calor & frigus se mutuo expellunt, die secundo ^{morbillo-}
 Febris sensibilis adoritur vehementi ægitudine, si- ^{rum accu-}
 ti, inappetentia, lingua alba (non verò sicca) ^{rata.}
 ruficula, capitis atque oculorum gravedine, &
 somnolentia perpetua stipata, plerumque etiam a
 naribus & oculis stillat humor (*signum certissi-*
imum morbillorum ingruentium) insuper maculæ
 latæ & rubræ in facie & pectore conspiciuntur;
 sternutat æger, intumescunt palpebræ [viz. paul-
 lù ante eruptionem] vomit, sæpiùs tamen labo-
 rat diarrhœa cum dejectionibus subviridis coloris.
 Ingravescunt symptomata ad quartum usque diem,
 vel aliquando ad quintum, quo tempore macu-
 læ pulicum moribus similes prodeunt, quæ tam
 numero quàm magnitudine auctæ racematim coa-
 lescent, & faciem maculis rubris variæ figuræ
 interstinguunt, quæ quidem maculæ a parvulis
 quibusdam papulis rubris haud longè ab invicem
 distitis super cutis superficiem paululum elevatis
 constan-

conflantur, digitorum levi tactu deprehenduntur, oculis remotis fugiunt: a facie sensim ad pectus, ventrem, crura, &c. se diffundunt. Die sexto aut circiter asperescit facies emorientibus pustulis; octavo in facies penitus evanescunt, nono vix ullibi inveniuntur; tunc temporis augetur Febris, & spirandi difficultas, urget tussis, &c. *Morbilli omni vacant periculo, si modò perisè tra-
sientur.*

Curatio. *Art. 124.* "Morbilli ab Avicenna *variola cho-
lericæ* appellati cum ipsis variolis coeervi sunt,
" [*Art. 130.*] & quoad curam his cum illis satis
" convenit: "*Diacodium* quotidie vesperi exhi-
bendum est; *linctus* quoque & *apozemata pectora-
lia* propinari possunt ad tussim leniendam. Sin ve-
rò ex calidiore regimine, vel aliter, Febris, dy-
spnoea, aliave accidentia post morbillorum deces-
sum supersint, *venasectione* sola curantur, quæ si-
ne metu in tenellis audacter celebranda est. In re-
gimine intensè calido exanthemata aliquando li-
vescunt, & pigrescunt, in adultis phlebotomia &
temperatone regimine sublevantur aut pereunt; in
peripneumoniam incidunt.

Art. 125. "Morbilli nonnunquam [inquit Syl-
" vius & omnes hoc scimus] per aliquot dies di-
" stingui non possunt a variolis, *ne quidem a me-
" dicis peritissimis, atque diu in praxi versatis* :
" longè proinde satius est in re dubia medicum
" vel suspendere suum iudicium, vel dubiè dun-
" taxat respondere.

Mortoni sententia.

Curatio in *Art. 126.* Quoad curam morbillorum, in pri-
Angulis mo stadio, scilicet, ante efflorescentiam paucis-
Radus. sima remedia sunt adhibenda, nisi gravissima sym-
ptomata superveniunt, uti spasmi, enormes hu-
Spasmi. morum colliquationes, &c. Si spiritus nimis ir-
riten-

ritentur, & in spasmos rapiantur, remediis appropriatis compescendi sunt, nempe *julapiis ex aquis cephalicis cum tinctura castor. pulvere ad Guttetam*, &c. Et si nifus spirituum indè non minuat, guttæ aliquot *laudani liquidi* propinari debent. Ad *diarrhæam* quod attinet, satius est palliativa curatione ejusdem molestiam, quoties insolito more sævit, minuire, quàm contra naturæ legem eam penitùs tollere, atque ita ægrotantem occidere; abstineat æger a cerevisia, bibatque decoctum album, & exhibeantur pulveres testacei; non nisi extrema necessitate ad *laudanum* perveniendum est. Ad tussim ferinam ab acri lymphâ ortam quadantenus cohibendam conveniunt *mucilaginosâ, pectoralia, oleum amygdalarum dulcium, &c.* [privatim *syrupus e coral. & tinctura ejusdem.*] “In tussi morbillorum pathognomonica, sæpè permolesta, & convulsiva, & nonnunquam lethali nullum remedium præstantius novi [inquit *Harris*] quam *gummi tragacanthum* copiosius sumptum in linctu vel decocto pectorali solutum, & pulveribus testaceis mixtum. Id enim *gummi catarrhum* maximè lenire solet, tussimque inde prognatam, symptoma morbillorum primarium, sistere aut levare aptum natum est longe melius tutiusque narcoticis, quantumcunque hoc laudantur a clarissimo Sydenhamo, &c.”

Alvi fluxus.

Tussis.

Art. 127. Efflorescentia jam incepta, imò erup-tione plena existente quandoque suboritur *peripneumonia* cum respiratione anhelosa, strangulatione suffocativa, deglutitione læsa, &c. quo in casu, multo usu fretus omnibus author sum, ut sanguis copiosius educatur, æque ac si æger morbillioso affectu correptus non fuisset. Idem in *ophthalmia* molesta ac periculosa faciendum moneo. Ad *alvi fluxum* in hoc stadio compescendum non minus tutus quàm necessarius est opiatorum usus.

Peripneumonia.

Ophthalmia.
Diarrhæa.

Efflo-

Ultimum
stadium.

Efflorescentia peracta, si Febris venenatis symptomatis adjuncta remaneat, actum est de ægro: Contrà, si crisis fuit perfecta, cathartica hydragoga adhibeantur ad lymphæ colliquatæ affectus exitiales impediendos: non tamen præproperè massa sanguinis agitur, antequam venenum fuerit omnino subactum. Quoties æger post morbillos *tussi ferina*, & *perpetua*, vexetur; primo in loco *venesectio* celebretur, &, si opus fuerit; post unum vel alterum diem iteretur, & unà cum *lin-tilibus* & *medicamentis lenientibus* [quemadmodum in catarrho exhibere solemus] *cortex Peruvianus* copiosè exhibeatur, & *opiatum* hora decubitus pro re nata.

Tussis fe-
rina super-
ues.

v. s.

Art. 128. "Ad præcavenda dira symptomata in hoc affectu evenientia, ab authore nostro enumerata, *phlebotomia* maturè, in morbi initio; celebrata; & vomitorium exhibitum feliciter, plerumque succedunt. [vid. *Art. 119.*]

Art. 129. "Qui Variolis laborarunt, non sunt, aded morbillis postea obnoxii, quare ætate gra-
viores non ita promptè inficiuntur.

V A R I O L Æ.

Art. 130. "Nihil de Variolis ante *medicos Arabes* scriptum invenitur. Hic verò morbus antiquior est, quàm vulgè creditur. Authores isti existentiam ejus usque ab initio septimi seculi temporibus *Muhammedis* investigarunt. (Vid. *Freind. hist. med. p. 188. vol. 2.*) Variolæ ita appellantur; quasi parvi vari; quod cutem variant. Homini omni, soli & semel convenit Variolis & morbillis affici: in hoc autem censu non supputandæ sunt pustulæ variolosis similes, quas vulgè vocant *the Chicken Pox*; pueris familiares sunt; Variolis veris quidem similes sunt, quoad magnitudinem & figuram,
sed

Chick-
en-
Pox.

„sed in eo ab iis distinguuntur, quod Variolæ
 „cum rubore & inflammatione insigniori appa-
 „reant, hæc verò albidiores sunt, & veluti vesi-
 „culæ seroso humore repletæ, quæ intra triduum
 „disrumpuntur, & exsiccantur, nullumque as-
 „ferre solent periculum, & plerumque sine Fe-
 „bre erumpunt: *Morbus est adeo benignus, ut*
 „*nunquam sub curam medicam cadat.* Variolæ
 „[inquit Dolæus] quoad ortum suum semina-
 „rium habent nobiscum connatum, quod ali-
 „quamdiu sepultum jacet, donec nacta emergen-
 „ti occasione ex latibulo erumpat, & massæ san-
 „guineæ commixtum symptomata terribilia, &
 „sæpe mortem producat: inter multas hominum
 „myriadas vix unus & alter per totam vitam
 „ab his immunis manet. Ex cadaverum sectio-
 „nibus patet viscera universa in corporis cavitati-
 „bus contenta pustulis variolosis confertim affi-
 „ci, æque ac cutis externa.”

Sydenhami sententia:

Art. 131. Variolæ sunt *distinctæ* vel *confluen-* Variolæ
tes: *Distinctæ* seu discretæ cum rigore ac horro- rum dis-
 re invadunt; sequitur calor intensus, capitis & secretarum
 dorsi dolor vehemens, vomituritio, dolor circa histeria.
 scrobiculum cordis, somnolentia, in infantibus
 præsertim; quandoque etiam paroxysmi epilepti-
 ci, qui Variolas mox prorupturas, easque futu-
 ras esse mites ac benigniores plerumque præsa-
 giunt; quarto ut plurimum die ab invasione erum-
 punt, & symptomata febrilia evanescent, nisi
 quiddam adulti in sudores sint propensi. In facie pri-
 mò conspiciuntur pustulæ subrubræ, deinde collo,
 pectore, & universo corpore, quæ magis magis-
 que inflammantur, & in dies elevantur, & subal-
 bidæ fiunt, cute in intersitiis satis floridum colo-

rem

rem exhibente; die undecimo faciei tumor ac inflammatio recedunt, & pustulæ exarescere incipiunt; in hac Variolarum specie (si quando) die 14^o. vel 15^o pereunt.

Confluent
cum his-
toria.

Art. 132. Confluentes cum discretis symptomata communia habent, nisi quoddam hæc atrociora sint omnia; tertio die erumpit hæc species, aliquando citius, raro serius; interdum verò, licet oppidè raro, ob gravius aliquod symptoma, lumbaginem doloremve lateris, &c. serius erumpunt, neque periculo vacant. Febris etiamnum durat, crescente morbo pustulæ non in spectabilem molem attolluntur, uti in discretis, sed sibi invicem implicitæ vultum omnem contegunt, & illum in tumbrem elevant, dein ad instar pelliculæ albæ in cutis superficie conspiciuntur. Præterlapso die octavo pellicula alba quotidie exasperatur, & ad colorem fuscum vergit, eoque magis Variolæ confluerunt. *Magnitudo morbi a facie maximè æstimanda est, potius quàm reliquo corpore.* In hoc genere adest in adultis salivatio, in infantibus diarrhœa; salivatio nonnunquam sub primum eruptionis tempus se prodit interdum post diem unum vel alterum; die serè undecimo saliva viscidior facta difficulter excreatur, ægro suffocationem intentans, & circa id temporis ut plurimum cessat, & tumor faciei paulatim subsidet, & tunc ejus loco manus intumescere solent, aut debent; diarrhœa non ita maturè infantes invadit; sub vespèram exacerbatur morbus. Variolis discretis laborantes octavo, confluentibus verò undecimo die maxime intereunt. Interdum accidit pleuritis, interdum coma; interdum maculæ purpuræ (*totidem quasi sphaceli*) pustulis interspersæ (mortis serè semper prænuntia;) quandoque mictus sanguineus, & aliæ Hæmorrhagiæ, quæ idem ominantur, nonnunquam urinæ suppressio.

Art. 133.

Art. 133. In confluentium genere æger [ut dixi] maximè periclitatur (a primo insultu computatione facta) die undecimo viz. in maximè vulgari confluentium genere, in crudiori adhuc 14, in crudissimo 17^o, rarissimè 21^o. Ego Variolosum ab usu lectuli interdium semper arceo usque ad sextum diem a prima morbi invasione, quantum ab eruptione, quo tempore omne pustularum agmen in conspectu est: posthac eundem lectulo committo usque ad morbi finem.

Regula
ferè semper obse-
vanda.

Art. 134. "In confluentibus (ut rectè inquit „*Doleus*) periculosa plena res est aleæ, & me-
„dicus occasionem habet suas tentandi vires, &
„ostendendi, quid in arte medica calleat." Indicationes curativæ duæ sunt, nempe, 1^o ut æqualis tenor ebullitionis conservetur; 2^o ut pustulæ debito modo sustineantur, regimen calidius vitandum est; *gradus caloris earum expulsionem accommodatissimus naturalis omnino est*; non opus est, ut æger ante diem quartum [133.] lecto addicatur; neque ut ad propellendas Variolas ullum remedium sumat; quarto verò die, si eruptio ex votis haud succedat, exhiberi licet cardiacum aliquod blandius. Discretum genus ex sua natura plerumque omni vacat periculo. In confluentibus æger, a sudore, quantum fieri potest, prohibendus est, & ptialismus in vigore conservandus; promovetur autem affatim bibendo cerevisiam tenuem vel liquorem alium non nimis calefacientem. Adultis propinare soleo *paregoricum cum laudan. liquid. gut. xiv. vel syr. de mecon. ʒj.* hora sexta vel septima vespertina singulis noctibus post plenam eruptionem ad morbi usque finem; temporibus autem *hypnoticum* quàm pro recepto more præscribo, quoniam exacerbatio caloris quotidie sub vespere ferè reperitur, ex quo non modò incommodi nihil, sed magnum emolumentum, quod frequentius experientia

Curatio.

didici. In hoc genere diarrhoea in infantibus est salutaris, & non temere sistenda, contra in discretis. De venæsectione die octavo, & de auræ liberaliori exponendo, si quis velit, authorem consulat. p. 153. &c. Cum saliva admodum viscida evadat, uti soleo gargarismate sequente; ʒi. Cort. ulmi ʒvj. rad. glycyrrhiz. ʒß. passular. enucleat. N. xx. ros. rub. p. ij. coq. in q. s. aq. font. ad ʒß. colatura dissolv. oxymel. simpl. mel. ros. ana ʒij. m. s. gargarisma. Interdum emeticum propinandum est. In urinæ suppressione æger è lecto debet eximi. Pustularum depressio & diarrhoea in Variolis discretis medicamenta cardiaca postulant. Febris illa, quæ die undecimo, &c. adortur, diversa est ab ista, quæ eruptionem præcedit, nihil enim est aliud, quam Febris putrida propriè dicta hæc Febris secundaria; ad hanc autem fugandam nihil efficacius præstat, quam copiosa sanguiniseductio: non enim nunc cum Variolis res est sed Febre putrida; mittendus est itaque sanguis ad ʒx. vel xij. & anodynum bis in die propinandum; ob immensam alvi constipationem præscribere soleo elect. lenitiv. ʒiß. in aqua lactis solut. Nihilominus anodynum itato tempore continuandum est; si prima vice votis non respondeat, iteretur die proximo: atque hac ratione tam venæsectio quàm catharsis per intervalla repeti possunt, prout Febris mos atque ægri inquietudo postulare videantur, donec tandem res in vado sit. Sched. mon. p. 81. &c. In Variolis confluentibus magna est virtus spiritus vitrioli a 5^{to} vel 6^{to} morbi die usque ad finem copiosè in cerevisia ten. exhibiti; commodæ & incommoda hujus remedii. p. 256. &c. ubertim recensentur.

Variolæ
anomalæ
discretæ.

Art. 135. Variolæ anomalæ: Discretæ hæc a legitimis discriminabantur, quod erumpant die 3^o, illæ 4^o, pustulæ minores fuerant; sæviebant tamen

men magis, & ante maturationem frequentius nigrescebant; ptyalismus [ut in confluentibus] aderat immediate post eruptionem: *Confluentes* ^{Confluentes} hæ ab aliis discrepabant; quod nunc die secundo, nunc tertio se primum monstrabant tumore subrubro atque uniformi, quibusdam in locis; in femoribus præcipue; vesiculæ, ambustorum ad instar sero limpidio distentæ eminebant; quod disrupta pellicula copiose affluebat; subjecta carne nigredine & *sphacelo* quasi affecta; periculo non vacante ante diem septimum, in aliis confluentibus dies undecimus (ut plurimum) est criticus. Postremò hæ calidioris naturæ sunt & magis inflammatoriæ; ideoque temperato regimini indulgendum est: *Hydrogala* ex tertia parte aquæ & lactis unâ simul coctis ægri palato & votis ut plurimum respondet, & ptyalismum feliciter promouet.

Mortoni sententia.

Art. 136. Variolarum quatuor sunt stadia, viz. ^{Quatuor} apparatus, eruptio, maturatio, & declinatio, in ^{stadia Va-} quibus varia occurrunt symptomata, quæ diver- ^{riolarum.} sam medendi methodum postulant.

Art. 137. Primum stadium est a morbi ipsius ^{Primum} insultu usque ad eruptionem generalem. In hoc ^{stadium,} stadio urina tenuis & pallida, præsertim si adsit frequens misturatio; malè ominatur; urina rubicunda & contentis saturata contrarium indicat (insolitus aliqualis dolor vehemens; præsertim colicum æmulans; est pessimum signum.) ^{Diarrhœa.} Diarrhœa in hoc stadio non permittenda est, quin ^{Vomitio.} decocto albo & repetitis *laudani* dosibus est cohibenda, vel astringentibus sistenda. Vomitus in hoc stadio non statim supprimenda est, sed potius (nisi valdè enormis fuerit) cum repetitis haustibus liquoris possetrici carduati, vel cum paucis

sale Vitrioli leniter promovenda est : Evacuatio-
 ne autem hac levi peracta, vel si vomitio ex mor-
 bi ipsius genio modum excedat ; illico tumultum
 spirituum compescere oportet, eorumque vires
 conservare alexipharmaco aliquo remedio cum o-
 piato commixto, & post justa intervalla repeti-
 to ; sequens est formula mihi familiaris, *℞. Aq.*
card. lact. alexiter. cinnam. hord. menth. stephan. ana
℥ij. sal. absynth. gr. xii. pulv. rad. serpent. virgin. o
chel. cancr. comp. lapid. Contrayerv. ana ℥ss. syr. ca-
ryoph. vel menth. ℥ss. m. f. julap. de quo capiat
ægrotus coch. ij. iij. vel iv. quarta quaque hora,
addendo singulis dosibus laudan. aliquid guttas ali-
quot pro re nata. “ Sanguis [inquit *Lister*] in
 „ Variolis non propriè mittitur, sed ex acciden-
 „ te tantum ut symptomati alicui vehementiori
 „ succurratur. “ In dolore capitis, artuum vel
 „ lumborum, item in dolore pleuritico, seu peri-
 „ pneumonico, ut etiam quandoque in colico, ne-
 „ cessaria est *venesectione*, ut symptomata ista aver-
 „ runcentur ; *vesicatoria* etiam & *opiata* hic locum
 „ habent ; præcipuè autem in affectibus comatosi-
 „ bus. Ubi vigilie in hoc stadio pertinaces fuerint, non
 „ raro in proximo stadio exanthemata confluunt,
 „ quorum eruptioni deliria, spasmi, cæteraque su-
 „ gesta symptomata superveniunt, quo nomine hoc
 „ symptomata *venesectione* & *opiatis*, ut ut spiri-
 „ tum vires indè minuantur, opportunè cohibere
 „ par est, adhibitis interea vesicatoriis & alexiphar-
 „ macis. “ Insolitus aliqualis dolor vehemens an-
 „ te eruptionem Variolarum, privatim *dolor co-*
 „ „ *licam passionem emulans* ; est pessimum si-
 „ „ gnum, & ferè semper lethale, ut plus semel
 „ observavi, præsertim si adfuerit etiam *miel-*
 „ „ *ritio.* “

Dolores
 spasmodi-
 ca.

Vigilie.

§ 2. li. m
 secundum

Art. 138. In stadio secundo exanthemata par-
 va instar acupuncturarum primò in facie, collo,
 pectore, &c. erumpunt tumore renitente, & ro-
 tundo ;

tundo ; die secundo bases suas ampliant , & tertio (ultra quem hoc stadium non excurrit) in summitatibus acuminantur ; quod longius est hoc stadium, ed periculosior est eventus ; in hoc stadio in benigniori saltem genere, ubi nullum adest funestum symptoma , haud par est ullo remedio naturam lacessere , utpote quæ propriis viribus instructa sine artis suppetiis satis validè suo officio fungi potis est.

Stadium
tertium.

Art. 139. Triduo eruptionis elapso Variolæ , sicut alia quævis tubercula inflammata , concoqui incipiunt ; & lymphæ venenata per glandulas cutaneas naturæ lege colata acrimonia sua cuticulam a vera cute separat ; unde apices exanthematum , paucarum horarum spatio , primum albescentes quadantenus intumescunt ; dein lymphæ eadem pro morbi indole & naturæ viribus citius vel ferius in pus mutata flavescent , aut saltem colorem cineritium vel subfuscum obtineant , ubi definit hoc stadium . Durante maturatione Variolarum benignarum nulla exsurgit indicatio , nisi forsitan adhiberi possunt *laudani liquidi* guttæ aliquot ad dolorem leniendum , & somnum conciliandum . Inter maturandas Variolas , si tardè procedant , *℥i. Lentium crassè contus. ʒi. ficuum ping. par. vi. ras. C. C. ʒss. coq. in liquore posset.* *℥ij. bibatur copiose ad libitum , & si adsit pyralismus commodè usurpatur gargarisma sequens ,* *℥i. Lentium crassè contus. ʒi. rad. alth. ʒss. ficuum ping. par. vi. vel vij. hord. mundat. p. j. glycyrrhiz. ras. ʒij. coq. in q. s. aq. font. ad ℥iij. colatur. add. mel. ros. ʒss. m. vel gargarism.* Variolos Fuller. Vitentur acida in gargarismatis , nisi in maxima deglutiendi difficultate ; deficiente salivatione , promoveatur urinx profluvium exhibendo dosin unam vel alteram pulveris *Æthiopici* .

Art. 140. Stadium ultimum Variolarum est ead-

Stadium
ultimum.

sum declinatio, in quo exanthemata pure maturo & laudabili referta primum incrustari & scabie subflava obduci incipiunt; dein post unum vel alterum diem pure conrescente exsiccantur, & in arida tubercula ubique mutantur, quæ sensim emollita sponte evanescunt. Rard quispiam hoc morbo interimitur, nisi in declinationis stadio, scilicet in Variolis benignis; de his etenim ut plurimum hætenus locuti sumus. Declinatio cum ἀνύψις, & appetitu restituto optimè significat. Petechiæ seu vesiculæ miliares in hoc stadio erumpentes funestum eventum denuntiant; deliria, vigilæ, subsultus tendinum, &c. in hoc stadio pejus ominentur, quàm in præcedentibus; paucissimi enim vel nulli hoc modo affecti convalescunt; scabies diu pure scatens, atque inde sæpe decidens, & renascens, meliorem sortitur eventum, quàm ea, quæ de repente exarescit; Variolæ, quæ scabie tessili & adhærenti obducuntur, malè præagiunt.

Variolæ
benignæ.

Art. 141. Ubi Variolæ fuerint figuræ exactissime rotundæ, discretæ, & margine admodum rubro circumscinctæ, neque petechiis, eruptionibus miliaribus, vel quavis alia nota exitiali, interpunctæ, & primo maturationis die in summitate albæ, tumore turgidæ, & diè secundo circa basin auctæ, & in summitate acuminatæ, minùs pellucidæ; & tertio materia in pus convertatur, eventus felix duodecimo saltem morbi die insculturus expectandus est.

Variolæ
sum malignarum
quatuor
gradus.

Art. 142. Quatuor sunt Variolarum malignarum gradus, viz. confluentes universaliter, confluentes particulariter, discretæ verùm admodum parvæ & coherentes, maximè confertim ubique erumpentes, & denique discretæ cum petechiis & eruptione miliari conjunctis. Primi gradus sunt, quando cutis universa erysipelatoso tumore [maculis nigris hic illic interspersis] cum æquali super-

Gradus
primus.

per-

perficie quadantenus crassefcit; post triduum cutis albefeit, & pergamenæ speciem inducit; atque hæc sunt Variolæ maximè exitiales; ægrum ultra secundum maturationis diem nunquam superstitem novi. Variolæ secundi gradus magis vulgares sunt, quando cutis faciei sola erysipelatoſa eſt, & primo maturationis die pergamenæ speciem reſert, dum in artubus & trunco corporis exanthemata fuerint ferè diſcreta non tamen regularia; vix enim oculo diſtinguuntur ab effloſcentia morbilloſa, vix apices tollunt, ſed ſæpe liveſcunt, undè mortem inſtare certò præſagire licet. Variolæ malignæ tertii gradus, ubi quaſi diſcretæ verùm admodum parvæ & cohærentes, quæ non acuminantur, ſed cute ſolummodò conſpiciuntur, ac ſi ab urticæ plaga exaſperatæ, donec ſub initium maturationis albeſcentes confluant, & ſpeciem pergamenæ exhibeant. Rariùs quæquam hæc ſpecie affectum, niſi ope Ptyaliſmi diutius protracti, ingentis urinæ profluvii, vel intumeſcentiæ artuum diuturnæ, ad decimum quartum vel decimum quintum morbi diem ſuperſitem novi.

Secundus.

Tertius.

Art. 143. Gradus ultimus eſt, quando Variolæ erumpunt quidè diſcretæ figura & magnitudine regulares, verùm veſiculis aqueis; vulgè *the Whiſh-hives*, petechiis, vel maculis lividis in interſitiis, præſertim in collo, pectore, & artubus diſſinctæ; atque hæc non minùs ſunt exitiales quàm confluentes.

Gradus ultimus.

Art. 144. In Variolis malignis Febris continua mali moris poſt eruptionem remaneat cum lingua arida, pulſu debili, &c. Neque prorsus exulat, ut in benignis ſolet: materia enim morboſa, vel propter malignitatem, vel morbi magnitudinem, per glandulas cutaneas ſatis protrudi nequit, unde dira ſymptomata evenire ſolent nimirum hæmorrhagiæ admodum periculofæ, quæ (ut pluri-

Curatio ſymptomatum.

Hæmorrhagiam,

mum) (maculis purpureis & nigris eodem tempore in conspectum venientibus) funestissimæ sunt , & vix aut ne vix arte cohibendæ , nisi forsitan Vitrioli fræno præpotenti (aq. hyptic. reg.) obsignari possint ; nihil tamen proficimus , si non undè possumus vesicatoriis & alexiteriis generosissimis vires spirituum penè extinctorum denudè resuscitare ; venæsectio mortem accelerat . Micturitie licet non adeo formidabilis , pessimè tamen ominatur ; in hoc symptomate sublevando cineres busonum egregias obtinent vires [ut mihi usu compertum est] dos. ℞i. cum aliis alexiteriis quarta vel sexta quaque hora . Dolor gutturis & deglutitio im-

Micturitie .

Dolor Gutturis .

Salivatio .

pedita est symptoma quandoque maximè affligens & molestum ; fauces itaque externæ ab aeris injuriis pannis laneis mollibus duplicatis muniri debent , quæ plus valeat , quàm croceata , vel alia quæcunque amuleta ; & usurpentur gargarismata appropriata , &c. Salivatio copiosa , & diu protensa cum insigni capitis & faciei intumescencia benè significat ; ptyalismus vero brevis & de repente suppressus , nisi profluvio urinæ , aut intumescencia extremorum excipiat , malum omen exhibet ; salivatio diarrhœa excepta pessimè significat .

Post Variolarum declinationem inappetentia & calor hæcticus .

Parotides , &c.

Art. 145. Morbosi quidam affectus quandoque post Variolas suboriri solent , inter quos inappetentia primum locum vendicat , quæ frequenter cum calore hæctico conjuncta est , quo in casu ego multo usu doctus alexipharmaca [quod cæteros professores serio moneo] ubi calor fuerit contiguus jugiter ministranda duco ; corticem autem Peruvianum , ubi calor statis periodis recurrit , cum felici successu exhibendum impero ; & deinde postea ad alvum subducendam turò progredior . Parotides nonnunquam sub finem Variolarum suboriuntur , quæ diu tanquam strumæ sine calore vel rubore permanent ; discutientibus non sunt

sunt tentandæ, sed potius fortibus maturationem promoventibus tractandæ sunt. Eadem via procedendum est in furunculis, scabie saniosa, ulceribus mali moris, impetigine fursuracea, &c. viz. alexipharmacis & febrisugis ab evacuationibus religiosè abstinendo. Gangræna & caries ossium post Variolas nullo medicamento cedunt. Tumores œdematosi frictionibus, fortibus lixivialibus & more hydropicorum curandi sunt. De dolore capitis post Variolas (Vide Art. 279.)

Furunculi, &c.

Gangræna & caries.
Tumores œdematosi.

Freindii sententia.

Art. 146. Sunt nonnullæ Febres, quæ purgantia commodè recipiunt, sunt etiam, quæ omnino desiderant (sed de hac re nondum satis accuratè ab auctoribus traduntur regulæ) ex quibus nullam aliam æquè purgationi opportunam repetio, ac eam, quæ Variolas confluentes, maturitate pustularum aut vigente aut jam inclinata, semper excipit; ea quippe Febris uti omnium maximè putrida est, & periculi plena, ita præ cæteris curationem hanc aptius recipit. Atque hanc præ aliis medendi rationem in putridis hisce Febribus, quæ Variolis superveniunt, suadet Sydenhamus. Mihi quidem sæpius usu venit, ut in Variolarum statu, ubi pustulis exarescentibus Febris nihilo secius invaluerit, ad purgantia confugerem, quæ ita periculo vacare, ita commodè adhiberi posse expertus sum; ut multorum vitas ab hac maximè medendi via conservatas esse haud absurdè dixerim. "Doctrina de usu phlebotomia & catharsis in Variolis confluentibus post imperfectam crisin in literis a peritissimo D. Cade ad eundem datis succinctè admodum continetur; en ejusdem summarium!

Art. 147. In Variolis confluentibus, quamdiu faciei tumor & inflammatio manet, & saliva re-

Purgationis usus in Febre secūdaria.

Quando neque res solutio.

Neque
catharsis
conveni-
unt.

Et fluit, a *venesectione & catharsi* (pari ratione ac furunculo maturante) prorsus abstinendum esse duco . Scilicet , ne istæ evacuationes , materiæ morbidæ a massa sanguinea separationem , & per pustulas , tanquam per tot phlegmonas , (cui unico hoc tempore natura incumbit) ejectionem obturbarent . Insuper , procedente morbo , si eo tempore , quo facies detumere , & ptyalismus decrescere incipit (quod die nono vel decimo ab eruptione accidit) si his , inquam , diebus manus debito modo tumeant , & nulla malæ notæ appareant symptomata , haud omnino (me iudice) vel *phlebotomia vel catharsis* , adhuc indicatur ; sed totum negotium rectè committitur naturæ . Interim tamen in hoc morbi statu *enema* quotidie injiciendum præscribo , quo alvum sæcibus exonerare , & Febris furorem coercere curo .

Quando
utraq;
evacuatio-
nes sunt
necessariæ

Art. 148. Attamen , facie diebus prædictis criticis detumente , quoties (quod nimis frequenter evenit) pustulæ corporis non turgent maturo pure , nec manus intumescunt ; undè (nempe a materia morbida in sanguinis massa remanente eamque inquinante) ardens Febris nascitur ; respiratio brevis & frequens oritur , corporis jaectatio , & obstinatæ (narcoticis incassum exhibitis) vigiliæ urgent ; quoties equidem diris his symptomatibus vexatur æger , medico incumbit per *venesectionem & medicamenta leniter purgantia* , sæpiusque debitis intervallis repetita , humorem peccantem detrahere , & eo , quo possit , modo , laboranti , subvenire . In Variolis denique confluentibus , licet facies & manus & pustulæ corporis debito modo , ac tempore , intumuerint , & saliva satis copiosè statuto tempore fluxerit ; si tamen ptyalismo desinente & dictis partibus jam subsidentibus , Febris utcumque (quod in hac morbi specie ut plurimum accidit) gravior assidue in hæreat , & symptomata , ex hac nata (utpote anhe-

losa

losa respiratio, vigiliæ, anxietates, cum pallida & diluta urina) indefinenter urgeant ægrotantem, rebus sic stantibus, necesse habet medicus sanguinis quantitatem *venæsectione* minuere, (nimirum ut exinde pars reliqua magis placidè per vasa fluat) & materiam morbidam (quæ per pustulas, jam induratas & crusta obductas amplius transire nequit) *Catharsi* sæpius repetita evacuare; his enim evacuationibus omissis, semper evenit, ut vel memorata symptomata in dies augeantur, & inter diem duodecimum & vicesimum quartum lethalia evadant; vel humor putridus in pulmonibus extravasetur, eorumque vesiculas corrumpat; undè ægrotus, miseram vitam paulisper trahit, & brevi moritur tabidus.

Art. 149. Anhelosæ respirationi, crisi superveniente *phlebotomia* feliciter ac unicè occurrit, quæ nisi confestim peragitur, actum erit de ægroto, neque hoc in casu pulsus humilis & angustus metueret; quippe sæpius observavi vacuato sanguine arteriam fortius vibrasse; unde constat pulsus obscuritatem non infirmitati virium, sed humoris lædenti oneri, deberi. Venæsectio tamen mictum cruentum non modò non cohibet, sed auget, & mortem in procinctu stantem accersit: hoc tamen funestum fati impendentis prænuntium (*Campphora* bis in die exhibita & acidis larga manu propinatis) amovi, ægroque brevi morituro ad tempus succurri; sed ut vera fatear, ne unum quidem Variolis affectum, cui urina cruenta fluxerit, diem 16^{rum} ab eruptione supervixisse notavi. De rationibus, quibus innititur hæc praxis, videatur auctor. "Atque ita *purgationis* methodum in, Febre secundaria tanquam unicam salutarem venditat *D. Freind* & alii apud illum, nonnulli magni nominis medici: Ego verò, qui sum tardioris ingenii, rurique dego, de hac re aliquantò dubius adhuc hæreo. Hi viri,

,, in-

In anhelosa respiracione phlebotomia est unicum remedium

In mictu cruento est nociva

didici. In hoc genere diarrhœa in infantibus est salutaris, & non temere sistenda, contra in di-
feretis. De venæsectione die octavo, & de auræ liberaliori exponendo, si quis velit, authorem consulat. p. 153. &c. Cùm saliva admodum visci-
da evadat, uti soleo gargarismate sequente; 24.
Cort. ulmi ʒvj. rad. glycyrrhiz. ʒß. passular. enu-
cleat. N. xx. ros. rub. p. ij. coq. in q. s. aq. font. ad
ʒß. colatura dissolv. oxymel. simpl. mel. ros. ana
ʒij. m. f. gargarisma. Interdum emeticum propi-
nandum est. In urinæ suppressione æger è lecto
debet eximi. Pustularum depressio & diarrhœa
in Variolis discretis medicamenta cardiaca postu-
lant. Febris illa, quæ die undecimo, &c. adori-
tur, diversa est ab ista, quæ eruptionem præce-
dit, nihil enim est aliud, quam Febris putrida
proprie dicta hæc Febris secundaria; ad hanc au-
tem fugandam nihil efficacius præstat, quàm co-
piosa sanguiniseductio: non enim nunc cum Va-
riolis res est sed Febre putrida; mittendus est
itaque sanguis ad ʒx. vel xij. & anodynum bis in
die propinandum; ob immensam alvi constipatio-
nem præscribere soleo elect. lenitiv. ʒiß. in aqua
lactis solut. Nihilominus anodynum itato tempo-
re continuandum est; si prima vice votis non re-
spondeat, iteretur die proximo: atque hac ratio-
ne tam venæsectio quàm catharsis per intervalla
repeti possunt, prout Febris mos atque ægri in-
quietudo postulare videantur, donec tandem res
in vado sit. Sched. mon. p. 81. &c. In Variolis
confluentibus magna est virtus spiritus vitrioli
& 5^{to} vel 6^{to} morbi die usque ad finem copio-
sè in cerevisia ten. exhibiti; eommoda & incom-
moda hujus remedii. p. 256. &c. ubertim recen-
sentur.

Variolæ
anomalæ
discretæ.

Art. 135. Variolæ anomalæ: Discretæ hæc a le-
gitimis discriminabantur, quodd erumpant die 3^o,
illæ 4^o, pustulæ minores fuerant; sæviebant ta-
men

men magis, & ante maturationem frequentius nigrescebant; ptyalismus [ut in confluentibus] aderat immediatè post eruptionem: *Confluentes* *Confluentes* hæ ab aliis discrepabant; quod nunc die secundo, nunc tertio se primum monstrabant tumore subrubro atque uniformi; quibusdam in locis; in femoribus præcipuè; vesiculæ, ambustorum ad instar sero limpido distentæ eminebant; quod disrupta pellicula copiosè affluebat; subjecta carne nigredine & *sphacelo* quasi affecta; periculo non vacante ante diem septimum, in aliis confluentibus dies undecimus (ut plurimum) est criticus. Postremò hæ calidioris naturæ sunt & magis inflammatoriæ; ideoque temperato regimini indulgendum est: *Hydrogala* ex tertia parte aquæ & lactis unâ simul coctis ægri palato & votis ut plurimum respondet; & ptyalismum feliciter prouocat.

Mortoni sententia.

Art. 136. Variolarum quatuor sunt stadia, viz. *Quatuor stadia Variolarum.*
apparatus, eruptio, maturatio, & declinatio, in quibus varia occurrunt symptomata, quæ diversam medendi methodum postulant.

Art. 137. Primum stadium est a morbi ipsius insultu usque ad eruptionem generalem. In hoc stadio urina tenuis & pallida, præsertim si adsit frequens micturitio; malè ominatur; urina rubicunda & contentis saturata contrarium indicat (insolitus aliqualis dolor vehemens; præsertim colicum æmulans; est pessimum signum.) *Primum stadium.*
Diarrhœa in hoc stadio non permittenda est, quin *decocto albo* & repetitis *laudani* dosibus est cohibenda, vel astringentibus sistenda. *Diarrhœa.*
Vomitio in hoc stadio non statim supprimenda est, sed potius (nisi valdè enormis fuerit) cum repetitis haustibus liquoris possetici carduati, vel cum paucis *Vomitio.*

sale Vitrioli leniter promovenda est : Evacuatio-
 ne autem hac levi peracta, vel si vomitio ex mor-
 bi ipsius genio modum excedat ; illico tumultum
 spirituum compescere oportet, eorumque vires
 conservare alexipharmaco aliquo remedio cum o-
 piato commixto, & post justa intervalla repeti-
 to ; sequens est formula mihi familiaris, *℞. Aq.*
card. lact. alexiter. cinnam. hord. menth. stephan. ana
℥ij. sal. absynth. gr. xii. pulv. rad. serpent. virgin. o
chel. cancer. comp. lapid. Contrayerv. ana ℥℥. syr. ca-
ryoph. vel menth. ℥℥. m. f. julap. de quo capiat
ægrotus coch. ij. iij. vel iv. quarta quaque hora,
addendo singulis dosibus laudan. aliquid guttas ali-
quot pro re nata. “ Sanguis [inquit *Lister*] in
 „ Variolis non propriè mittitur, sed ex acciden-
 „ te tantùm ut symptomati alicui vehementiori
 „ succurratur. “ In dolore capitis, artuum vel
 „ lumborum, item in dolore pleuritico, seu peri-
 „ pneumonico, ut etiam quandoque in colico, ne-
 „ cessaria est *venæsectio*, ut symptomata ista aver-
 „ runcantur; *vesicatoria* etiam & *opiata* hîc locum
 „ habent; præcipuè autem in affectibus comatosi-
 „ bus. Ubi vigilæ in hoc stadio pertinaces fuerint, non
 „ raro in proximo stadio exanthemata confluunt,
 „ quorum eruptioni deliria, spasmi, cæteraque su-
 „ perflua symptomata superveniunt, quo nomine hoc
 „ symptomata venæsectione & opiatâ, ut ut spiri-
 „ tum vires indè minuantur, opportunè cohibere
 „ par est, adhibitis interea vesicatoriis & alexiphar-
 „ macis. “ Insolitus aliqualis dolor vehemens an-
 „ te eruptionem Variolarum, privatim *dolor co-*
 „ „ *licam passionem emulans*; est pessimum si-
 „ „ gnum, & ferè semper lethale, ut plus semel
 „ observavi, præsertim si adfuerit etiam *mictu-*
 „ „ *ritio*. “

Dolores
 spasmodi-
 ca.

Vigilæ:

Stadium
 secundum

Art. 138. In stadio secundo exanthemata par-
 va instar acupuncturarum primò in facie, collo,
 pectore, &c. erumpunt tumore renitente, & ro-
 tundo;

CAP. I.

Variolæ.

33

53

tundo ; die secundo bases suas ampliant , & tertio (ultra quem hoc stadium non excurrit) in summitatibus acuminantur ; quod longius est hoc stadium , eò periculosior est eventus ; in hoc stadio in benigniori saltem genere , ubi nullum adest funestum symptoma , haud par est ullo remedio naturam lacessere , utpote quæ propriis viribus instructa sine artis suppetiis satis validè suo officio fungi potis est .

Art. 139. Triduo eruptionis elapso Variolæ , sicut alia quævis tubercula inflammata , concoqui incipiunt ; & lymphæ venenata per glandulas cutaneas naturæ lege colata acrimonia sua cuticulam a vera cute separat ; unde apices exanthematunt , paucarum horarum spatio , primum albescentes quadantenus intumescunt ; dein lymphæ eadem pro morbi indole & naturæ viribus citius vel ferius in pus mutata flavescent , aut saltem colorem cineritium vel subfuscum obtineant , ubi desinit hoc stadium . Durante maturatione Variolarum benignarum nulla exsurgit indicatio , nisi forsan adhiberi possunt *laudani liquidi* guttæ aliquot ad dolorem leniendum , & somnum conciliandum . Inter maturandas Variolas , si tardè procedant , *℥i. Lentium crassè contus. ℥j. ficuum ping. par. vj. ras. C. C. ℥ss. coq. in liquore posset. ℔ij.* bibatur copiose ad libitum , & si adsit pyralismus commodè usurpatur gargarisma sequens , *℥i. Lentium crassè contus. ℥j. rad. alth. ℥ss. ficuum ping. par. vj. vel vij. hord. mundat. p. j. glycyrrhiz. ras. ℥ij. coq. in q. s. aq. font. ad ℔ss. colatur. add. mel. ros. ℥ss. m. vel gargarism.* Variolos Fuller. Vitentur acida in gargarismatis , nisi in maxima deglutiendi difficultate ; deficiente salivatione , promoveatur urinæ profluvium exhibendo dosin unam vel alteram pulveris *Æthiopici* .

Secundum
tertium.

Art. 140. Stadium ultimum Variolarum est ca-

Stadium
ultimum.

rum declinatio, in quo exanthemata pure maturo & laudabili referta primum incrustari & scabie subflava obduci incipiunt; dein post unum vel alterum diem pure conrescente exsiccantur, & in arida tubercula ubique mutantur, quæ sensim emollita sponte evanescent. Raro quispiam hoc morbo interimitur, nisi in declinationis stadio, scilicet in Variolis benignis; de his etenim ut plurimum hætenus locuti sumus. Declinatio cum ἀνωσιξία, & appetitu restituto optimè significat. Petechiæ seu vesiculæ miliares in hoc stadio erumpentes funestum eventum denuntiant; deliria, vigiliæ, subsultus tendinum, &c. in hoc stadio pejus ominentur, quàm in præcedentibus; paucissimi enim vel nulli hoc modo affecti convalescunt; scabies diu pure scatens, atque inde sæpe decidens, & renascens, meliorem sortitur eventum, quàm ea, quæ de repente exarescit; Variolæ, quæ scabie tessili & adhærenti obducuntur, malè præfagiunt.

Variolæ
benignæ.

Art. 141. Ubi Variolæ fuerint figuræ exactissime rotundæ, discretæ, & margine admodum rubro circumcinctæ, neque petechiis, eruptionibus miliaribus, vel quavis alia nota exitiali, interpunctæ, & primo maturationis die in summitate albæ, tumore turgidæ, & die secundo circa basin auctæ, & in summitate acuminatæ, minùs pellucidæ; & tertio materia in pus convertatur, eventus felix duodecimo saltem morbi die insecuturus expectandus est.

Variolæ
cum malignarum
quatuor
gradus.

Art. 142. Quatuor sunt Variolarum malignarum gradus, viz. confluentes universaliter, confluentes particulariter, discretæ verùm admodum parvæ & cohærentes, maximè confertim ubique erumpentes, & denique discretæ cum petechiis & eruptione miliari conjunctis. Primi gradus sunt, quando cutis universa erysipelatoso tumore [maculis nigris hic illic interspersis] cum æquali su-

Gradus
primus.

per-

perficiæ quadantenus crassescit; post triduum cutis albescit, & pergamenæ speciem inducit; atque hæ sunt Variolæ maximè exitiales; ægrum ultra secundum maturationis diem nunquam superstitem novi. Variolæ secundi gradus magis vulgares sunt, quando cutis faciei sola erysipelatosa est, & primo maturationis die pergamenæ speciem refert, dum in artubus & trunco corporis exanthemata fuerint ferè discreta non tamen regularia; vix enim oculo distinguuntur ab efflorescentia morbillosa, vix apices tollunt, sed sæpe lvescunt, undè mortem instare certò prælagire licet. Variolæ malignæ tertii gradus, ubi quasi discretæ verùm admodum parvæ & cohærentes, quæ non acuminantur, sed cute solummodò conspiciuntur, ac si ab urticæ plaga exasperatæ, donec sub initium maturationis albescerent confluant, & speciem pergamenæ exhibeant. Rariùs quæquam hac specie affectum, nisi ope Ptyalismidiutius protracti, ingentis urinæ profluvii, vel intumescentiæ artuum diuturnæ, ad decimum quartum vel decimum quintum morbi diem superstitem novi.

Secundus.

Tertius.

Art. 143. Gradus ultimus est, quando Variolæ erumpunt quidè discretæ figura & magnitudine regulares, verùm vesiculis aqueis, vulgò *the Whith-bives*, petechiis, vel maculis lividis in interstitiis, præsertim in collo, pectore, & artubus distinctæ; atque hæ non minùs sunt exitiales quàm confluentes.

Gradus ultimus.

Art. 144. In Variolis malignis Febris continua mali moris post eruptionem remaneat cum lingua arida, pulsu debili, &c. Neque prorsus exulat, ut in benignis solet: materia enim morbosa, vel propter malignitatem, vel morbi magnitudinem, per glandulas cutaneas satis protrudi nequit, unde dira symptomata evenire solent nimirum hæmorrhagiæ admodum periculosa, quæ (ut pluri-

Curatio symptomatum.

Hæmorrhagiam.

mum) (maculis purpureis & nigris eodem tempore in conspectum venientibus) funestissimæ sunt , & vix aut ne vix arte cohibendæ , nisi forsân Vi-
 trioli fræno præpotenti (aq. Hyptic. reg.) obli-
 gari possint ; *nihil tamen proficimus , si non unâ pos-*
simus vesicatoriis & alexiteriis generosissimis vires
spirituum penè extinctorum denuð resuscitare ; ve-
 næfectio mortem accelerat . Micturiti-
 tio . licet non adeo formidabilis , pessimè tamen ominatur ; in
 hoc symptomate sublevando *cineres busonum* egre-
 gias obtinent vires [ut mihi usu compertum
 est] dos. ʒi. cum aliis alexiteriis quarta vel sex-
 ta quaque hora . Dolor gutturis & deglutitio im-
 pedita est symptoma quandoque maximè affli-
 gens & molestum ; fauces itaque externæ ab æ-
 ris injuriis pannis laneis mollibus duplicatis mu-
 niri debent , quæ plus valeat , quàm croceata ,
 vel alia quæcunque amuleta ; & usurpentur gar-
 garismata appropriata , &c. Salivatio copiosa , &
 diu protensa cum insigni capitis & faciei intum-
 mescentia benè significat ; pyralismus vero bre-
 vis & de repente suppressus , nisi profluvio urinæ ,
 aut intumescencia extremorum excipiat , malum
 omen exhibet ; salivatio diarrhœa excepta pessimè
 significat .

Post Va-
 riolarum
 declina-
 tionem
 inappet-
 tia & ca-
 lor hecti-
 cus .

Art. 145. Morbosi quidam affectus quandoque
 post Variolas suboriri solent , inter quos inappe-
 tentia primum locum vendicat , quæ frequenter
 cum calore hectico conjuncta est , quo in casu
 ego multo usu doctus *alexipharmaca* [quod cæte-
 ros professores serio moneo] ubi calor fuerit con-
 tinuus jugiter ministranda duco ; *corticem* autem
Peruvianum , ubi calor statis periodis recurrit ,
 cum felici successu exhibendum impero ; & dein-
 de postea ad alvum subducendam turò progred-
 ior . Parotides nonnunquam sub finem Vario-
 larum suboriuntur , quæ diu tanquam strumæ si-
 ne calore vel rubore permanent ; *discutientibus* non
 sunt

Paroti-
 des , &c.

sunt tentandæ, sed potius fortibus maturationem promoventibus tractandæ sunt. Eadem via procedendum est in furunculis; scabie saniosa, ulceribus mali moris, impetigine fursuracea, &c. viz. alexipharmacis & febrifugis ab evacuationibus religiose abstinendo. Gangræna & caries ossium post Variolas nullo medicamento cedunt. Tumores œdematosi frictionibus, fotibus lixivialibus & more hydropicorum curandi sunt. De dolore capitis post Variolas (Vide Art. 279.)

Furunculi, &c.

Gangræna & caries.

Tumores œdematosi.

Freindii sententia.

Art. 146. Sunt nonnullæ Febres, quæ purgantia commodè recipiunt, sunt etiam, quæ omnino desiderant (sed de hac re nondum satis accuratæ ab auctoribus traduntur regulæ) ex quibus nullam aliam æquè purgationi opportunam reperio, ac eam, quæ Variolas confluentes; maturitate pustularum aut vigente aut jam inclinata, semper excipit; ea quippe Febris uti omnium maximè putrida est, & periculi plena; ita præ cæteris curationem hanc aptius recipit. Atque hanc præ aliis medendi rationem in putridis hisce Febribus, quæ Variolis superveniunt, suadet Sydenhamus. Mihi quidem sæpius usu venit, ut in Variolarum statu, ubi pustulis exarescentibus Febris nihilo secius invaluerit, ad purgantia confugerem, quæ ita periculo vacare, ita commodè adhiberi posse expertus sum; ut multorum vitas ab hac maximè medendi via conservatas esse haud absurdè dixerim. "Doctrina de usu phlebotomiæ & catharsis in Variolis confluentibus post imperfectam crisin in literis a peritissimo D. Cade ad eundem datis succinctè admodum continetur; en ejusdem summarium!

Art. 147. In Variolis confluentibus, quamdiu faciei tumor & inflammatio manet, & saliva re-

Purgationis usus in Febre secūdaria.

Quando neque vomitio.

et

Neque
catharsis
conveni-
unt.

Et fluit, a *venesectione* & *catharsi* (pari ratio-
ne ac furunculo maturante) prorsus abstinendum
esse duco. Scilicet, ne istæ evacuationes, mate-
riæ morbidæ a massa sanguinea separationem, &
per pustulas, tanquam per tot phlegmonas, (cui
unico hoc tempore natura incumbit) ejectionem
obturbarent. Insuper, procedente morbo, si eo
tempore, quo facies detumere, & ptyalismus de-
crescere incipit (quod die nono vel decimo abe-
ruptione accidit) si his, inquam, diebus manus
debito modo tumeant, & nulla malæ notæ appa-
reant symptomata, haud omnino (me iudice)
vel *phlebotomia* vel *catharsis*, adhuc indicatur;
sed totum negotium rectè committitur naturæ.
Interim tamen in hoc morbi statu *enema* quotidie
injiciendum præscribo, quo alvum sæcibus exonè-
rare, & Febris furorem coercere curo.

Quando
utraq;
evacuatio-
nes sunt
necessariæ

Art. 148. Attamen, facie diebus prædictis criti-
cis detumescite, quoties (quod nimis frequenter
evenit) pustulæ corporis non turgent maturo pu-
re, nec manus intumescunt; unde (nempe a ma-
teria morbida in sanguinis massa remanente eam-
que inquinante) ardens Febris nascitur; respira-
tio brevis & frequens oritur, corporis jactatio,
& obstinatæ (narcoticis incassum exhibitis) vi-
gilæ urgent; quoties equidem diris his sympto-
matibus vexatur æger, medico incumbit per *ve-
nesectionem* & *medicamenta leniter purgantia*, sæ-
piusque debitis intervallis repetita, humorem pec-
cantem detrahere, & eo, quo possit, modo, la-
boranti, subvenire. In Variolis denique confluen-
tibus, licet facies & manus & pustulæ corporis
debito modo, ac tempore, intumuerint, & saliva
satis copiosè statuto tempore fluxerit; si tamen
Ptyalismo desinente & dictis partibus jam subsi-
dentibus, Febris utcumque (quod in hac morbi
specie ut plurimum accidit) gravior assidue inhæ-
reat, & symptomata, ex hac nata (utpote anhe-
losa

losa respiratio, vigiliæ, anxietates, cum pallida & diluta urina) indefinenter urgeant ægotantem, rebus sic stantibus, necesse habet medicus sanguinis quantitatem *venæsectione* minuere, (nimirum ut exinde pars reliqua magis placidè per vasa fluat) & materiam morbidam (quæ per pustulas, jam induratas & crusta obductas ampliùs transire nequit) *Catharsi* sæpius repetita evacuare; his enim evacuationibus omissis, semper evenit, ut vel memorata symptomata in dies augeantur, & inter diem duodecimum & vicesimum quartum lethalia evadant; vel humor putridus in pulmonibus extravaseretur, eorumque vesiculas corrumpat; undè ægrotus miseram vitam paulisper trahit, & brevi moritur tabidus.

Art. 149. Anhelosæ respirationi, crisi superveniente *phlebotomia* feliciter ac unicè occurrit, quæ nisi confestim peragitur, actum erit de ægroto, neque hoc in casu pulsus humilis & angustus metueret; quippe sæpius observavi vacuato sanguine arteriam fortius vibrasse; unde constat pulsus obscuritatem non infirmitati virium, sed humoris lædenti oneri, deberi. Venæsectio tamen mictum cruentum non modò non cohibet, sed auget, & mortem in procinctu stantem accersit: hoc tamen funestum fati imponentis prænuntium (Camphora his in die exhibita & acidis larga manu propinatis) amovi, ægroque brevè morituro ad tempus succurri; sed ut vera fatear, ne unum quidem Variolis affectum, cui urina cruenta fluxerit, diem 16^{tum} ab eruptione supervixisse notavi. De rationibus, quibus innititur hæc praxis, videatur auctor. "Atque ita *purgationis* methodum in
 „Febre secundaria tanquam unicam salutem
 „rem vendit D. Freind & alii apud illum
 „nonnulli magni nominis medici: Ego verò,
 „qui sum tardioris ingenii, rurique dego, de
 „hac re aliquantò dubius adhuc hæreo. Hi viri,
 „in-

In anhelosa respiratione
phlebotomia est
 unicum remedium

In mictu cruento
 est nociva

ingentia cettè artis nostræ lumina , seculique
 ornamenta , satis ingeniosè ratiocinantur , o-
 mnesque serè summa eloquentia victos in illo-
 rum sententiam facillimè descendentes inve-
 niunt : sed sola experientia duce caute admo-
 dum progredi decet . In praxi mea per viginti
 circiter annos *clysmatum* injectionis utilitatem
 deprehendi ; sed *cathartica non nisi rarissimè pro-*
pinare ausus sum . Optandum erat , quòd viri
 præfati meritissimi numerosiore[m] historiarum
 seriem tam morientium quàm viventium protu-
 lissent , ut in re adeo ancepsit æquius iudicium
 ferre potuerimus .

Farrago sententiarum .

Variolæ
morbus
novus.

Art. 150. Variolas esse morbum novum satis demonstratur , quòd in multis mundi partibus nunquam visæ fuerunt , ut apud *Indos occidentales* ubi nunquam apparuerunt ; nisi postquam Hispani eo pervenere ; siquidem per contagionem *Æthiopis* cuiusdam , illuc delati , magnam *Indorum* partem sustulerunt , ut testatur *R. a Fonseca* ; *Helbigius* indubitanter affirmat incolas *Indiæ orientalis* Variolas nunquam tentasse ante commercium *Hollandicum* .

Regimen
frigidum.

Art. 151. In Variolis *Alfaharavius* omnes in-
 frigidantes medicos nostri seculi multis parasangis
 anteivit ; maximè in primo Variolarum tempo-
 re , nempe , in sanguinis missione ad syncopen , &
 frigida immensa quantitate , & confertim exhibi-
 ta , potione ; eaque sæpius repetita , paucis horis ;
 at quantum video , sine successu ; his enim non ob-
 stantibus , venenum intra habitum corporis re-
 sistabat .

Sanguinis
textura in
Variolis
malignis.

Art. 152. Illud tantùm (inquit *Lister*) curiosiùs
 animadverti (in Variolato cum maculis purpureis
 hæmorrhagia narium & mictu sanguineo) sangui-
 nem refrigeratum tenerrimum fuisse , & ejus oras-
 famen-

famentum rubrum vel molliori pennæ pluma percussum faciliè dividi potuerit. In aliis autem multis, quibus urina cruenta, sanguinem e brachio missum adeo aquatum, putridumque esse vidi, ut fluctuaret crassamentum in vase, non aliter quàm ipsum serum; neque ullum servatum meminimus in tanta pestilentia, (76.) “Variolæ præcedente crapula accidentes, ut etiam luxuriæ & intemperantiæ deditis, plerumque graviores sunt, & pessimi moris, & ferè semper lethales.”

Art. 153. In Variolis confluentibus (inquit idem author) hunc in modum præscripsi; ℞. *Croc.* ℥j. *cochin.* ℥ss. *sacchar. tantillam*; m. pro chart. viij. capiebat ægra unam quarta quaque hora cum coch. i. vel ij. aq. theriacal. per triduum & postea sexta quaque hora; item *diacod.* ℥j. mane & vespere, & convaluit; & pro alia fœmina ad eundem ferè modum, ℞. *Croc.* ℥ss. *cochin.* ℥ss. *sacchar. cand.* ℥j. m. pro chart. vi. cepit. unam tertia quaque hora.

Vires cochinel. in Variolis confluentibus.

Art. 154. Ego (inquit idem) neminem bis infectum memini, præter unam fœminam, quæ in hac urbe (*Eboracensi*) me teste, intra annum Variolis bis decubuit, & convaluit.

Rarissima aliquis bis inficitur.

Art. 155. Nihil observatione dignius est (inquit *Etmullerus*) quàm anhelitus & vox in Variolis; ubi enim promptè recteque agitur respiratio, vox faciliè sequitur, neque raucescit, admodum salutare signum est, *Stercus equinum* in Variolis est sordidum quidem, sed egregium remedium, promovet sudorem, præservat guttur, &c. a quibusdam etiam deprædicatur *Stercus ovinum*. “Nec locum infimum obtinet oleum semini, vel amygdalarum dulcium, ut prædicis, quibusdam peritis satis notum est. Quodnam sit istud remedium, cui vires supereminentes, *Vvaldschmidius* & *Dolæus* attribuant, planè nescimus: optandum sanè esset, quòd tale me-

Signum salutare.

Remedia nonnulla singularia.

„ dica-

dicamentum, de quo loquuntur in morbo tam exitiali, in rerum natura revera daretur. De hoc remedio hæc habet *Vvaldschmidius*; utimur *aliis quodam remedio in forma liquida*; quod a primis statim diebus usque ad finem in adultis ad cochleare unum dari potest, quo ipso puto reconvalescentiam, divina adjuvante gratia; certè promitti posse; ut ut gravissima ad sint symptomata; præcipuè autem hoc remedium est dicatum *inflammationi*, quo & externe uti possumus. Et alibi; omnibus commendo *liquorem contra Variolas* a D. D. *Dolæo* & me millies expertum, quem & nos unà invenimus; Multò uberior est *Dolæus* in hujusce specifiici laudibus, ut & videre licet, p. 374.

Art. 156. "Variolæ acu perforatæ tardiùs curantur, & crustas diutiùs retinent; undè cicatrices scædiores relinquuntur; idedque naturæ satiùs sunt relinquendæ." Maculas a Variolis relictas [observante *Barbette*] præprimis delet *oleum myrrhæ per deliquium ex albuminibus ovorum paratum*, ut & *oleum vitellorum ovorum*. "Si quis linimentum velit, sequens in usu apud medicos *Londinenses* est elegans præscriptum; ʒi. *Ol. amygd. dulc.* ʒi. *cer. alb. sperm. cer. ana* ʒi. *balsam. Gileadens.* ʒss. f. s. a liniment." "Ulcera corrosiva [inquit *Bonetus*] in facie & alibi optimè sanantur cum *spiritu vitrioli mille rosaceo ad sufficientem aciditatem permisto*; semper respondent voto medentis, etsi dimidiam genam ulcus absumpserit.

Art. 157. Remedia in hoc morbo insigniora; præter jam memorata; sunt, quæ sequuntur: *Kermes, gum. lacca, viperina, cinnabaris ammonii, tinctura bezaordica, tinctura corallii, decoctum rubicundum, decoctum variolosum, gargarisma variolosum, lochoch rubrum, unguentum de bismuth, ad foveas Bat. &c.*

Ino-

Ulcera
Corrosiva.

Inoculatio Variolarum.

Art. 158. Medicorum est morbos curare non inferre; dices tamen medicum peritum ac probum <sup>Prom-
mum.</sup> humanarum infirmitatum providum morborum futurorum occasiones præscindere; vel saltem leviores reddere, æque ac præsentēs sanare, omni arte decere: Si hoc non concedatur, quamobrem venæsectionem imperamus, emetica, & cathartica adhuc sanis & vegetis prophylaxeos gratia propinamus?

Art. 159. Inoculatio Variolarum est nova pra- <sup>Nova pra-
xis.</sup> xis a *Constantinopoli* ad nos nuperis annis translata; & mirum est, quanta expectatione recepta fuit, quanta industria exculta; statim incredibiliter inclaruit: in ipsa domo regia, in multorum procerum & optimatum familiis magna ostentatione celebrata fuit; quo eventu & quali successu eandem exercentes ediderunt. Nihilominus sub tantis auspiciis & tam magnis exemplis inter gentem popularem minus increbuit; nostrorum hominum genio & cogitandi modo vix ritè quadrare videtur. Quoad fas, & an cum bona conscientia fieri posse multum varieque ligatur; de certitudine & incertitudine Variolas genuinas producendi, itemque an alios etiamnum morbos, & humorum contaminationes, unà cum Variolis, implantari posse vehementer ac strenuè disputatur. Mihi quidem neque otium neque facultates soppetunt tantas componere lites.

Art. 160. Interim inoculationis operatio ad hunc ^{Operatio} modum facillimo negotio peragitur. Imprimis in promptu comparandum est exiguum pus (guttæ v. vel vj. puta) ab adolescente Variolis discretis decumbente, inter maturandum depromptum, quod parva phiala vel pyxide inclusum loco operationi assignato deportandum est, ubi omnibus præ-

præparatis inoculando vulnuscula duo infligenda sunt, unum in brachio, alterum in crure lateris oppositi; & pus prædictum penicillis applicandum, & ligaturis firmandum; non opus est, ut incisiones fiant profundiores quam per cutem, neque grano hordei longiores, penicilli ad finem 24. horarum removendi sunt, & ulcera emplastr. Diachl. vel foliis brassicæ operanda, & in futurum semel vel bis in die pro ratione quantitatis puris ibidem scatentis detegenda & medicanda. Hoc facto morbus sensim produceretur, & symptomata sequentia plerumque exoriri solent.

Symptoma-
ta, su-
perve-
nientia.

Art. 161. Circa diem octavum post operationem erumpere solent pustulæ, iis, quæ in discretarum genere ordinariè contingere solent, haud dissimiles, præeunte febricula, & reliquis usitatis symptomatis, sed mitioribus. Quoad loca incisa, 4^{to} die rubescunt, & inflammantur, die 6^{to} ad suppurationem vergunt, & pus ichorosum emittunt. Sub eruptione quidem pustularum invadente Febre ulcuscula paulò minùs fluunt; post verò eruptionem, usque ad declinationem Variolarum pus in dies augetur, ex quo tempore iterum sensim diminuitur; ita ut spatio quinque hebdomadarum ulcera plerumque penitùs claudantur. Quanto major est evacuatio puris per ulcera hæc artificialia durante morbo, tantò mitior erit morbus. In genere observatum fuit Variolas per inoculationem inductas discretas esse, periculo ut plurimum vacantes, pustulas perpaucas, cuti foveas rarè relinquentes. Subsequuntur sæpissime in variis corporis partibus tubercula & abscessus, nonnulla quidem levioris momenti, interdum verò mali moris, & difficillimæ curationis.

Præpara-
tio & re-
gimen.

Art. 162. Ad corpus inoculationi præparandum multi multa loquuntur de Venæsectione, de usu emeticorum, & cathartico, &c. Sed professò, si inoculandus sit ætatis juvenilis, boni habi-
tus,

tus, & absolute sanus, nihil horum necessarium videtur. Sufficit temperati regiminis ad tempus ante operationem observatio. Operatione peracta inoculato solitum vivendi morem persequi concessum est, nisi quoddam fortassis carniū nimis liberalem indulgentiam prohibere prudentis erit. Morbo incepto idem regimen ac in Variolis discretis, modo ordinario contractis, observandum est, & si medicatione aliquali opus sit, Variolæ inoculatione inductæ eandem postulant medendi methodum.

FEBRIS PESTILENTIALIS & Pestis.

Diemerbroeckii sententia.

Art. 163. Pestis est morbus peracutissimus, perniciosissimus, & maxime contagiosus, ex maligno & occulto spiritibus calorique nativo tota substantia infestissimo inquinamento ortus, a quo omnium viscerum, & imprimis cordis, functiones læduntur. Pestis dei finitio.

Art. 164. Pestis est diversum quid a Febre, & Febris est tantum ejus symptoma, ut multoties observavimus, ac proinde nonnulli Pestem male per Febrem definiunt, cum Febris non sit de ipsius essentia, ut infra probabitur. Diversum quid a Febre.

Art. 165. Inter signa Pestem præcedentia & prælagientia sequens *Noviomagi* observatum fuit, nimirum, maxima & incredibilis insectorum copia, qualis vix unquam vita fuit, ut culicium, papilionum, scarabæorum, erabronum, cicadarum, omniumque maxime muscarum, quarum utroque anno stupenda ubique copia reperiebatur, ut ædium interiorum parietes undique muscis confiti viderentur, & foris ipse aer multis in locis quasi muscarum nubibus obscuraretur. Signum prælagientis Pestem.

Art. 166. De causis Pestis maximè ardua inter medicos quæstio movetur. In eo conveniunt omnes, illam excitari a cæca quadam pernície, & inexplicabili aeris labe; sed unde labes illa emerferit, quomodo aer tantum vitium contraxerit, quid hoc elementum inquinaverit, de eo dubitant, & in eo inveniendò laborant omnes. Prima & primaria causa est *justissima summi Dei ira propter hominum peccata*; ab hac causa promanat illud *ῥὸ Θεῶν*, quod pesti inesse animadvertitur, cujus etiam Hippocrates sæpe mentionem facit: & hoc omni ævo creditum fuit tam apud Gentiles, quàm apud Judæos, & Christianos; idem quoque sacræ literæ passim plus satis confirmant. Nos arbitramur Hippocratem per *ῥὸ Θεῶν* intellexisse causam quandam morificam, præter naturæ ordinem ac potentiam, a diis e sublimi immisam, vel in & ex aere de novo ab ipsis suscitam, cujus essentia nec in certa elementorum mistione, nec in manifestarum qualitatum intemperie, nec in magna aliqua putredine, consistit, sed in novo quodam veneno, præternaturaliter a diis in hoc sublunari mundo suscitato.

Quomodo
incipere
solet.

Art. 167. Cum aer a venenoso inquinamento incipit alterari, pollui, ac ad venenositatem disponi; incipit simul etiam rebus sublunaribus valdè insensus & noxius esse, interdum armentorum magnas strages edere, interdum segetes & terræ fructus corrumpere, inter genus humanum Febres malignas & Pestilenciales generare, & mox ipsam Pestem.

Contagii
communicatio.

Art. 168. Contagium est communicatio inquinamenti ab uno corpore in aliud, siue illa actio communicationis fiat per immediatum contactum, siue per medium; requiritur autem apta dispositio ad hujusmodi seminarium recipiendum; aliàs non communicabitur. Pestilens venenum cum vesti.

vettibus; aliisque rebus ad alias civitates & regiones deferri videmus. *Inexplicabilis quidem est hominum dispositio, quoad contagium recipiendum, vel non;* in aliis talis est, ut a Pestilenti veneno statim afficiantur; in aliis talis, ut difficulter ab eo lædantur; in aliis talis, ut eidem sine ulla noxa resistere possint.

Art. 169. Febris Pestilens, Pestis comes, non oritur a veneno Pestilenti, sed mediante putredine, id est; non generatur propterea; quod humores a veneno Pestilenti inquinantur; sed quod cor Pestilenti veneno irretitum, obrutum; plurimumque debilitatum, inquinatos humores debito modo neque coquere; ac dilatare; neque regere, & satis dispellere possit; qui hac de causa putrescunt; caloremque præter naturam concipiunt, sicque Febrem excitant; quæ ob dictam causam ordine posteriorem necessarium est diversa ac separabilis a Peste, ejusque symptoma. Hoc ipsum confirmant dogmata & auctoritas tam veterum quam neotericorum, nec minus quotidiana praxis, & obvia exempla.

Febris pestilens una.

Art. 170. Multa symptomata horrenda & gravia Pestem comitantur, quorum nonnulla sunt ei magis propria; ut bubo, anthrax, & exanthemata; alia autem aliis morbis communia; quorum primaria hæc sunt; capitis dolor, phrenitis, sopor, vigilæ, anxietas, debilitas seu magna virium prostratio, visus turbulentus, cordis palpitatio; linguae siccitas, vomitus, singultus, lumbrici, fluxus alvi, hæmorrhagia narium, menstruorum profluvium; sanguinis mictus, sputum cruentum, dolores lateris, hepatis, renum, aliarumve partium.

Pestis symptomata.

Art. 171. Bubones & carbunculi fiunt, a veneno Pestilenti, quod cor ex sese per arterias ad alias partes expellit. Bubo est tumor dolorosus earum glandularum, quæ sitæ sunt retro aures;

Bubo.

Carbunculus.

& in collo, sub axillis, & in inguinibus. Carbunculus a pustula plerumque ortum ducit, & est partis alicujus gangræna, dum est in fieri, & sphacelus, dum est in facto; nulla vi naturæ aut artis edomari, & in pus converti potest, sed integer a vicinis partibus separatur. Carbunculi non habent certa determinata loca, in quibus exoriantur, sicut bubones, sed in quacunque corporis parte excitari possunt: modò enim conspiciuntur in thorace, vel collo; modò in abdomine, vel dorso; modò in brachiis, vel cruribus; modò in manuum pedumve digitis; modò unus aut alter, modò plures simul, vel in una vel in diversis partibus: imò sæpe etiam in partibus internis oboriuntur, ut in pulmonibus, ventriculo, renibus, &c.

Exanthemata.

Art. 172. Exanthemata Pestilentialia sunt maculæ purpureæ vel rubræ, vel nigræ, vel violaceæ, ut plurimum rotundæ, aliquando latæ, oblongæ aliussve formæ, in summa cute efflorescentes.

Signa
prognost.

Art. 173. Acutorum morborum (inquit Hippocrates) incertæ admodum ac fallaces sunt prædictiones. In Peste *Noviomagensi* observavimus sextæ diei crises semper certò lethales fuisse. Quicumque circa novilunium aut plenilunium Peste corripiebantur, ii maximè de vita periclitabantur. Prostratio virium in morbi principio, animi deliquia, & cordis palpitaciones plerumque lethalia signa erant; pulsus intermittens semper lethalis; sopores, sternutationes, motus tremuli, delirium, dolor in gutture, & raucedo, anhelitus fortens, malè ominantur; Pleuritides semper lethales; suppressio alvi bonum signum, spem salutis exhibens; alvi fluxus contrarium, cum hoc vix centesimus æger evadebat; sanguinis per sedes vel urinas signum lethale, ut & menstruorum fluxus. Quo citius bubones prodibant, tanto meliores, si sine Febre, vel ante Febrem, prodirent, salutis magnam

gnam spem dabant, & contra; si in emundatorii loco bubonum emergerent carbunculi, gravissimum periculum indicabatur. Si carbunculi tardius prodirent, malum, & si valde multi, pessimum; in locis carnosis, meliores, in nervosis, periculosiores; maculae purpureae, nigrae, virentes, violaceae, quocunque tempore apparentes, semper lethales; cum rubris nonnulli evadebant, etsi paucissimi.

Art. 174. Praestantissimum & certissimum prophylacticum a Peste est *fuga cum timore Domini copulata*; recessus circumstantiae in sequenti versiculo continentur;

Propheta
laetifica.

Hac tria tabificam tollunt adverbia Pestem;
Mox, longè, tardè, cede, recede, redi.

Nullum melius Pestilentis aeris correctorium in rerum natura datur quàm ignis; ut multiplex experientia comprobavit. Hippocrates famosam illam Pestem, quae ex Aethiopia Graecos invaserat, olim per ignes edomuit, & extinxit: jussit enim per totam civitatem accendi ignes luculentos nocturnis praecipue temporibus, ut aeris inquinamenta purgarentur. Ignis ligno juniperino vel fraxineo nutritus ad venenatas aeris corruptiones emendandas multum valere creditur. Accensio *sulphuris & pulveris pyrii* aerem purificat, & ejus corruptionem abigit; idem facit crematio *succini, thuris, picis navalis*, &c. Item suffumigium *aceti* cum ferro candente vel ignitis lateribus excitatum. Quoad dietam consultum est Pestilenti constitutione temperantiam colere, quae magnopere ad sanitatis conservationem prodest; omnis verò repentina mutatio periculosa est, quapropter a consueta victus ratione subito discedere maximè periculosum esset. Malum est vigente Peste jejuno stomacho in publicum exire. Carnes porcinæ maximè damnosae censentur. Omnia dulcia vitanda sunt.

Dietæ.

Venæse-
ctio.

Fonticuli.

Antidoti.

Vinum temperatè usurpatum prodest ; sed ejusdem abusus est valdè periculosus : Mercurialis testatur Patavii & Venetiis se vidisse bibaces plurimos extinctos esse, qui existimabant vinis generosis se propullaturos esse Pestem. Vestes laneæ & crassiores inquinamentum contrahunt, & conservant ; præferendæ sunt itaque vestes ex serico tenuiore vel satino, aliove simili, *Phlebotomiam*, quamvis a multis veteribus & neotericis medicis summè laudatam, nos tanquam valde periculosam, & damnosissimam, planè rejecimus ; experientia enim constabat Pestis invasionem brevi post venæsectionem iis, qui præservationis gratia adhibuerunt, insecutam esse, quapropter omnibus prohibuimus. Cauteria seu potius fonticulos plurimi insignes medici summopere commendant, & eorundem insignem utilitatem nos quoque multoties vidimus. Prophylaxeos gratia in corporibus sanis & firmis sat erat, ut alvus servaretur libera, non fluida ; in cacochymicis verdè paulatim ac clementer alvum subducere necessarium duximus, & præ reliquis, cum Pil. Ruffi, utpote quæ tot sæculorum experientiis ad Pestilentem malignitatem comprobatae sunt. “ Ufu sulphuris communis, *Hippocrates* Pestem istam famosam Græcia abegit : suffitus ejus pro aeris emendatione & pro potus medicatione perquam laudatur, uti quavis corruptiones & alterationes, ita sanguinis putredinalem alterationem præcavet. In graviore malignitate indusium & vestimenta imprægnari possunt cum fumo sulphuris. “ *Ettmuller*.

Art. 175. Quoad antidotos ; inter simplicia imprimis duo commendavimus ; primum erat *tabacum*, nempe illius fumus per tubulam seu fistulam ore attractus, & post paucam retentionem inde rursus dimissus, quemadmodum ordinariè a sumi suctoribus sumi solet, illius usum in hac peste

peste tam in meipso, quàm in plurimis aliis, insigniter profuisse observavimus. Alterum erat *radix Helenii*, vel sicca masticata, vel in pulvere sumpta, vel saccharo condita; de antidotis aliis compositis consulatur auctor Cap. x. Pauperibus consulimus, ut quotidie manè duo vel tria cochlearia *aceti vini optimi* biberent, atque illud in hac Peste animadvertimus fuisse unum ex optimis præservativis; quamplurimis etiam spongiam cum *aceto theriacali* ebriam paribus frequenter admo- vendam dedimus.

Art. 176. Quod ad meipsum attinet, miraban-
tur quidem multi, quidd ego, qui quaslibet æ-
des infectas indiscriminatim invisebam a tanta con-
tagii violentia non læderer; imprimis, nec terro-
ri, nec iræ, nec mœrori, locum concedebam; si
fortè meipsum aliquo modo contristatum percipe-
rem, tum tribus quatuorve vini haustibus assump-
tis cor exhilarabam, atque ita tristitiam fuga-
bam. In victu utebar cibis euehymis; potus
mihi erat cerevisia communis, ut & vinum al-
bum tenue vel mediocre, quo interdum usque ad
hilaritatem, nunquam ad ebrietatem, utebar. Ma-
ne inter horam quartam & quintam ægros invisu-
rus nihil omnino cibi aut potus aut medicamenti
assumere potui, sed *oblatis Deo precibus* solummo-
do *aliquot grana Cardamomi minoris* masticando
jejunus primos ægros invisebam usque ad horam
sextam: Tum *vel theriacæ vel diascordii* pauxil-
lum, vel *corticem aurant. conditum*, vel ut plu-
rimum *radicum helenii* conditarum tria quatuor-
ve frustula comedebam; circa horam septimam
vel octavam frustum panis cum butyro & casco
ovillo viridi jentabam, superbibendo haustum ce-
revisiæ; quandoque haustum *vini absynthitis* bibe-
bam; circa decimam, si per otium liceret, fistu-
lam unam *tabaci* exfugebam, & post prandium
duas tresve, nec pauciores post cœnam; sæpe et-

Authoris
vivendi
modus.

iam intermediis horis post meridiem duas tresve fistulas sumebam: Si autem ab ægrotorum fœtore me vel tantillum alteratum sentirem, statim postpositis omnibus negotiis, qualicunque diei hora foret ad *tabaci* usum fugiebam: nam, ut verum fatear, *tabacum* pro primario præservativo semper habui, & reverà tale esse, non sola ratione doctus sed experientia edoctus comperi; neque aliud melius pro ordinario usu hætenus inventum fuisse existimo; sed observatu dignum est, quod non nisi insuetis auxiliabitur fumifusio; quapropter ego solo *tabaco* contentus nullis aliis suffumigiis utebar, & postea ejus usum rursus dereliqui.

Curatio.

Art. 177. Circa Pestis curationem semper plurimum hallucinati fuerunt omnes medici, dubii causarum, dubii remediorum. Causa enim morbi adhuc latet, neque ullum hætenus remedium proprium inventum est par tanto malo. In Peste actu laborantibus a *venesectione* religiosè abstinendum est; *purgantia* quoque & *vomitiva* maximè fugienda sunt; alvi constipatio non est metuenda, etiamsi in longum protrahatur, utpote quam nullis nocuisse animadvertimus. In ipso morbi principio statim ad *antidota* & *sudorifera* confugiendum est: hæc autem remedia *alexipharmaca* dicta multa sunt ac varia, quæ variis modis miscentur & componuntur pro morbi ipsius genio & reliquis circumstantiis, quarum decisio ex medici judicio dependet, neque certis regulis determinari potest. Simplicia primaria sunt quæ sequuntur, *radix petasitidis*, *aristolochia*, *helenii*, *bistort.* *zedoar.* *gentian.* *angel.* *ering.* *scorzoner.* *serpent.* *virg. fol.* *scordii*, *ruta*, *card. ben.* *absynt.* *rorismarin.* *flores croc.* *calendul.* *sambuci*, *fructus berber.* *poma cydonia*, *citrea*, *aurant.* *limon.* eorumque cortices, *acetum simplex*, *sambucinum* & *calendulatum*; aromata, *myrrha*, *camphora*, *succinum*, *vipera*, &c. Compositiones sunt ferè infinitæ, quam-

Simplicia.

quamplurimarum formulæ apud authorem videri possunt. Autor suspectum habet *crocum*, quoniam cerebrum petere solet; *camphora* a quamplurimis valde laudatur, item *flores sulphuris*, & *sal absynthii*; commendatur etiam *oleum vitrioli* & *oleum sulphur. per campan.*

Art. 178. Curationem frequenti methodo instituimus; imprimis cubicula nitida servari, & ter quaterve de die aerem suffumigiis alterari iussimus, & statim ægris [morbi primo, secundo, vel die tertio] *potiunculam sudoriferam* exhibuimus, iisque benè stragulis contextis, sudores copiosos per duas tres pluresve horas [habita semper virium ratione] promovimus; qui, si difficilius prodirent, arenam calefactam siccam lineis saccis infusam pedibus, axillis & inguinibus apposuimus. Si a primo sudore non levarentur ægri, post paucas horas sudoriferum de novo repetendum est; si post secundum sudorem Febris cum aliis symptomatibus adhuc increveret, nec quidquam levarentur ægri, pessimum erat indicium: post decem vel duodecim horas & sequentibus diebus adhuc quater vel quinquies (prout necessitas exigere videbatur) *sudorifera* reiteravimus. Intermediis autem horis varia *antidota* ad veneni violentiam extinguendam; ut & *condita corroborantia*, ac *putredini resistentia*, vel *apozemata convenientia*, aliaque quæ malignitatem a centro ad peripheriam pellebant, nec non cibos quosdam liquidos facilis digestionis, & antidotali condimentorum qualitate alteratos, exhibuimus. Symptomatum quoque morbo conjunctorum diligentem rationem habuimus, de quibus proximo loco dicemus.

Methodus
medendi.

Art. 179. Inter symptomata, quæ Pestem comitantur communissimum est Febris maligna pestilens, quæ ut plurimum gravis & periculosa existit. Hanc nos, durante hac constitutione, eodem

Curatio
symptomatum.
Febris.

ferè

ferè modo, sicut ipsam Pestem, tractavimus, & sudorifera atque antidota ad illius curationem maximè profuisse observavimus, dummodo abstinemus a calidioribus, vel, si iisdem uti placeret, *alta frigida*, ut *acetum*, *succum citri*, &c.

Vigilia.

Sopor.

Anxietas,
virium de-
bilitas &
vomitus.

admisceremus. Vigiliæ in Peste non magnopere metuendas esse docuit experientia; sed sopor in principio maximè damnosus & mali ominis erat; si ad somnum nimis proclives essent [quod admodum familiare erat] illos primo die a somno studiosissimè prohibuimus; usque dum alexipharmaco assumpto priùs bene sudassent. Ad anxietatem, virium debilitatem, & vomitum, miraculosè profuerunt remedia pauca sequentia: primum erat hæc mixtura; ʒi. *Conserv. rosar. rub.* ʒi. *diascord.* ʒiij. *vel* iv. *aq. nostr. theriacal.* (Art. 192.) ʒiv. *succ. limon. recent. ac cinnam. ana* ʒi. s. m. stent per horam unam aut alteram; deinde per lintheum colentur, colaturæ add. *confect. de hyacinth. sine mosco* ʒj. m. Secundum erat hoc linimentum; ʒi. *Ol. unc. moscat. express. ol. scorpion. vel laurin. theriac. androm. ana* ʒj. *ol. junip.* ʒi. *succin.* ʒj. *garyoph. vel cinnam. gut.* iij. m. s. linimentum pro scorbic. cordis, & ventriculi regione inungendis, bis terve de die superponendo hanc pastam ad ignem calefactam; ʒi. *Rad. calam. arom. unc. moscat. ana* ʒj. *garyoph. benzion. ana* ʒi. s. *sol. menth.* ʒij. *pulverizatis add. mic. panis secalin.* ʒiij. *vel* iv. *acet. rosac. q. s. f. pasta.* Ad linguæ ariditatem post varias alias collutiones tentatas solam *aquam simplicem* plus profuisse animadvertimus. Nihil perniciosius quàm hæmorrhagia narium, & menstruorum, & sputa cruenta; quàm citissimè omni arte sistendæ sunt, aut actum erit de ægris. Illud sæpissime observavimus, si alvi fluxus in principio non sisteretur, postea plenè incurabilem in omnibus fuisse.

Rubonum
curatio.

Art. 180. Bubonum curationem per suppurationem

nem omnino tentavimus; quamprimum igitur ægri, sive in ipso morbi principio, sive in progressu duritiem aliquam cum dolore sentirent pone aures, in collo, sub axillis, vel in inguinibus, huic plerumque ad citiorem tumoris provocationem, & maligni ichoris extractionem, *vesicatorium* in inferiore ejusdem parte applicavimus, ita ut *vesicatorium* ipsam duritiem attingeret, ut hoc modo ulcere facto locus apertus teneatur, & damnosi ichores melius effluant (*cucurbitulas* minus approbamus;) secunda die ut noxia materia ad bubones attrahi bique digereri, ac suppurari posset, toti tumori *cataplasmata attrahentia & emollientia*, ac *suppurantia* imposuimus, quibus præter alia etiam *cape*, *stercus columbinum*, *fermentum panis acidum* & similia admista erant; nonnullis etiam *solas capas sub cineribus aliquantum assatas*, & deinde contusas, paucis *theriaca* & *butyri insulsi* admixto cataplasmatibus forma biduo vel triduo imposuimus; cum autem tumorem jam satis magnum esse, atque ad maturationem tendere videremus, tunc attrahentia amplius non addidimus, sed *solis maturantibus* usi sumus, ut tumores citius ad suppurationem perducere possent. Sæpè ab ipso principio usque ad perfectam suppurationem hoc solum emplastrum imposuimus quod omnibus intentionibus satisfacerebat, eoque solo tumores ad integram sanationem non raro perveniebant; ʒi. Gum. galban. acet. dissolut. empl. oxy. eroc. diachyl. cum gummis ana ʒi. misceantur. Notandum tamen nos quibuslibet tumoribus non imposuisse *fortiora attrahentia*, sed tantummodo iis, qui sub axillis, & in inguinibus oriebantur; tumoribus autem, qui propè aures vel in collo prodibant, talia non conveniebant; nam talium usu eisdem, cum maximo suffocationis periculo, imò cum multorum exitio, sæpè paucis horis enormiter accrevisse observavimus; quapropter *sola*
emol-

emollientia, vel leviter tantùm attrahéntia his imponebantur; aliquando necesse fuit, cum tardius procedebant, tumores scalpello incidere, sed hoc antequam ferè ad perfectam maturationem pervenissent, non est faciendum; sequenti digestivo usus sumus, *℞. Scord. subtilissimè pulv. ℥ij. vitel. unius ovi terebinth. Venet. mel. unguent. Apostolorum ana ℥ss. m.* Caveri debet ne ulcera nimis cito occluderentur. Videatur in annotationibus methodus experientissimi Pauli Barbette de curandis bubonibus per *emplastrum magneticum arsenicale.*

Carbun-
culorum
Curatio.

Art. 181. In carbunculis tractandis sæpe prima & secunda die imposuimus *folia brassicæ rubræ oleo raparum mundæ*, quod apud vulgares in frequentissimo usu erat. Postea statim, imò ut plurimum ab ipso principio, frequentem puliculam applicuimus, qua nihil invenimus, cum quo carbunculorum separatio & curatio citius ac melius perageretur; *℞. rad. consolid. maj. sic. herb. scord. ana ℥ij. rad. alth. serin. sem. lini tritic. ana ℥ss. coq. in q. s. aq. font. ad puliculam, deinde add. mel. terebinth. unguent. apostolor. ana ℥ij. pic. liquid. ang. Basil. ana ℥ij. vitel. unius ovi croc. ℥j. m.* interdum etiam addebantur *theriac. ℥ij.* Apud vulgus in usu erat *pix navalis cum aequali parte picis liquidæ*, cum qua sola sæpius vidimus anthraces citissimè separatos, & dolores optimè sedatos. Quod miride tractarentur, eò melius & citius curatos fuisse milites observavimus. Exanthemata mortis instantis præstigia erant, neque curationi tempus dabant, quam si admisissent, per *sudorifera & alexipharmaca* curari debuissent.

Exanthe-
mata.

Sydenhami sententia.

Art. 182. Acuti morbi ut plurimum Deum habent authorem, sicut chronici nos ipsos. Pestis vix Britanniam frequentius quàm post annorum circiter quadraginta revolutionem devastat; "jam ve-
rò ex peculiari Dei clementia plusquam quinquaginta annos immunes viximus.

Pro-
mium.

Art. 183. Pestis primo insultu rigorem ac horrorem, quemadmodum & Febrium intermittentium accessiones, ferè perpetuum habet comitem; mox vomitus enormes, dolor circa cordis regionem, [ac si torculari premerentur] Febris ardens ægros indefinenter divexant, donec aut mors aut benigna bubonis vel parotidis eruptio, quæ materiam morbificam foras ablegat, eos ab lutuosissimo discrimine liberet. Rariùs quidem accidit, ut citra ullam Febris præsentionem ingruat, ac homines de improvviso è medio tollat, maculis purpureis præsentanei interitus nuntiis, etiam dum in foro versantur erumpentibus, quod tamen nisi in Pestis admodum funestæ exordio vix contingit; fit etiam nonnunquam, ut tumores prorumpant, nec Febre nec graviore aliquo symptomate prægresso.

Pestis de-
scriptio.

Art. 184. Aeris dispositio quantumvis *λοιμωδὴ* Pestis excitandæ per se impar videtur; nec Pestis epidemica erit, nisi accedente idoneo aeris diathesi.

Aeris dia-
thesis.

Art. 185. Vel per sanguinis missionem vel per sudores Pestis expugnanda videtur; posterior methodus sæpè funesta fuit: *venæsectio* verò larga manu & repetitis vicibus celebrata, nullo tumore protuberante; nemini adhuc, (quod scimus) unquam funesta; tumore verò conspicuo instituta, semper damnoſa, ratio in propatulo est, nempe quoniam motui naturæ adversatur. Plures &
gra-

Curandi
methodus.

gravissimi scriptores *venesectionem* probant, præcipuè Botallus, sed tam largam *venesectionem* paucissimi admittunt. Alia est itaque methodus therapeutica; nempe, mutatur sanguis in lecto, & statim æger strangulis quamplurimis obruendus est, & caput obtegendum ad sudores ciendos ex tegumentorum pondere; & cum sudor promanare incipiet alvi profluvium & vomitiones ultrò sedabuntur, & tuncumat æger bolum sequentem cum Julap: cardiac. sexta quique hora; sudorique indulgeat; *℥. iheriac. androm. ʒss. elect. de ovo ʒj. pulv. gascon. gr. xij. cochinel. gr. viij. croc. gr. iv. succ. kerm. q. s. m. f.* bolus: omnique arte continuandus est sudor ad viginti quatuor horas; nec prius indusum mutandum est utcunque madidum; quodd si sudatio citius abrumpatur; illicd symptomatum sævitia recrudesceat, & omnia in pejus ruunt. In sequenti luce commune *catharticum* exhibere soleo; atque hac medendi ratione; anno a peste proximo quamplurimis Febre pestilentiali correptis sanitatem restitui, aded ut nè unusquidemi ex eo morbo mihi desideratus est; postquam eandem exercere inceperam. Vinum liberalius ingurgitatum; aliaque fortiora præservativa statis horis dietim assumpta; complures, qui aliàs salvi intactique verisimiliter permansissent, in hunc affectum conjecerunt. “ Temperantem sobriumque
 „ Socratem gravissima Pestis Atheniensium non
 „ attigit; neque ulla ferè ævo *eidem similes* at-
 „ tingit.

Vuillisi sententia.

Pestis
 causa pri-
 maria.

Art. 186. Pro castigandis hominum sceleribus Pestem primitus a Deo immissam ipsi agnoverunt ethnici; idedque pro extirpatione ejus, precibus & piamentis, æque ac medicamentis insistebatur.

Art. 187.

Art. 187. Ad prophylaxin recordandum est Hip-
pocratis præceptum; *labor, cibus, potus, somnus*
venus, omnia sint mediocriter. Plures novi, qui
[*Helmontii* verbis] vino & confidentia fortifican-
do Archeum; nec aliis antidotis usi inter infectos
sine contagii noxa versabantur.

Prophyl-
axis.

Art. 188. D. Hen. Sayer in praxi medicus felix,
plerisque aliis hanc spartam renuentibus, peste
laborantes audaciter invasebat (*Londini* anno
1640.) ut seipsum a contagio muneret, antequam
domos infectas adibat; solummodo vini generosi
haultum pleniorē ingerere, deinde perambulatione
sua peracta; idem antidoton repetere solebat,
tandem ad castrum *Vallingfordiæ* occubuit cum
duce quodam in eodem lecto discumbens. Illius
medendi methodus sic se habuit; si, priusquam
exanthemata aut bubones exterius appaterent,
vocaretur, ut plurimum vomitoria exhibuit ex in-
fusione croci metallorum cum vitriolo interdum Ro-
mano; vomitione finita, diaphoreticis statim ex-
hibitis in sudorem conjiciendos præcepit; & de-
inceps intervallis quibusdam pro refectione virium
concessis, usque ad morbi declinationem diapho-
resin continuandam; sin post stigmata apparens-
tia accerferetur, vomitione posthabita tantum su-
dorificis insistebat.

Methodus
D. Sayeri

Farrago sententiarum.

Art. 189. Si quis, (inquit *Bonetus*) qui cum
ægris conversatur; qualicunque morbo affectis,
nunquam, quamdiu intra sphaeram vicinitatis ta-
lium moratur, salivam deglutiatur, sed semper ean-
dem expuat, ab omni infectione, Deo & natura
juvantibus, erit immunis. " Observatum fuit sca-
,, biosos & lue venerea laborantes peste minus ten-
,, tari. Frustulum myrrhæ in ore detentum in lo-
,, cis contagiosis versantibus optimum præserva-
,, tivum

Præserva-
tiva varia.

„ rium censetur. Quidam medicus, sæviente pe-
 „ ste, sibi ipsi & quibusdam aliis setaceum in-
 „ troque inguine comparavit; unde morbo inta-
 „ cti tunc evaserunt. “ Observarunt *Forestus*,
 „ *Diemerbroek*, *Galli*, *Angli*, *Germani* “ omnes
 „ Smegmatopolas, Lotrices & omnes qui ex of-
 „ ficio sapone utebantur, immo qui saltem indu-
 „ sia sapone elota gerebant in peste illico mori.
 „ *Boerhaave*.

Vires Li-
monum.

Art. 190. Peritissimi [inquit *Piso*] nonnulli In-
 diae medicatri plus præsidii in *limonibus* ponunt,
 quàm in *lapide Bezoar*, aut *theriaca* contra mali-
 gnos morbos, & pestilentes Febres, atque ipsa ve-
 nena. Ego autem sine jactantia affirmo me ex nul-
 lo alio aliquo remedio simplice tot felices affectus
 in tota praxi mea observasse, quàm ex *limonibus*.

Communis Turcarum praxis [inquit *D. Har-
 ris* in tractatu de morbis infantum p. 88.] in cu-
 randa Peste fit per *succum limonum* in omne ju-
 sculum liberalius instillatum, per *frusta limonum
 saccharata* ore frequenter masticata, & per po-
 tum apud nos vulgatissimum dictum *Sherbett*,
 hoc est, per ipsum regimen frigidissimum: utpo-
 te quibus *alexipharmaea nostra calidissima* bonis
 auspiciis sunt planè incognita, aut in nullo nu-
 mero saltem habentur.

Vires
Campho-
re.

Art. 191. Ex regno vegetabili supereminet *cam-
 phora*, quæ ab omnibus practicis extollitur (in-
 quit *Ettmullerus*) undè nobile expertissimum o-
 leum pestilentielle *Heinsii*, medici Veronensis, qui
 cum hoc mira præstitit, adeo ut ipsi post more-
 tem Veronæ statua fuerit erecta: Compositum
 est ex *ol. camphoræ succini & cort. citr. ana* p. æ. quæ
 oleo invicem benè juncta constituunt hoc mirabi-
 le remedium; pro præservatione dos. gut. 5, vel 6,
 pro curatione a gut. vj. ad xv. in vehiculo idoneo
 expectando sudorem, *Sal viperarum & Rob. Sam-
 buc.* laudantur.

Art. 192.

Art. 192. In usu etiam sunt quamplurima alia remedia composita ad præcavendum & curandum gravissimum hunc morbum, ut,

Aqua prophylactica.

℞. Rad. angel. zedoar. ana ℥j. petasitid. ℥ij. sol. rut. m. iv. meliss. scabios. flor. calend. ana m. ij. nuc. jugland. immatur. concis. ℥ij. succ. pom. citr. (vel aurant. acid.) ℥ij. acet. vin. opt. ℥xij. digere per noctem & distilla lento igne ad siccitatem. Optimum alexiterium habetur.

Acetum Pestilentielle, Bat.

℞. Rad. angel. zedoar. ana ℥j. bacc. junip. ℥ij. rut. m. ij. acet. opt. ℥iij. macera, ac cola. Pro lussitu, & oris collatione grassante Peste.

Aqua theriacalis. Diemer.

℞. Rad. ostrutii, petasitid. angel. carlin. valerian. ana ℥ij. enul. campan. cort. aurant. sicc. ana ℥iij. herb. scord. absynth. ana ℥ij. card. ben. ℥iij. flor. ros. rub. ℥β. stachad. ℥iij. bacc. junip. ℥iij. cardamom. min. ℥v. cinamm. ℥j. vin. Rhenan. vel Gallic. ten. ℥xxij. aq. ros. ℥ij. vase bene obturato stent. in infusione dies x. deinde add. sol. rut. m. vj. tanacet. m. iv. rorismarin. pimpenel. ana m. iij. mancant simul in infusione adhuc per octo vel decem dies, quotidie baculo commovendo, postea affunde succ. citr. ℥ij. stent adhuc per 3. 4. dies, postea super ignem levite ebulliant, & colentur, ac in torculari fortissimè exprimantur, collatura distilletur in b. m. & servetur ad usum.

Cataplasmata Pestilentielle. Bat.

℞. Stercor. columb. ℥iv. croc. ℥β. Mithridat. theriac. Lond. sem. sinap. ana ℥j. tereb. q. s. m. Pro bubonibus rumpendis.

Item *Spiritus theriacalis camphoratus, tinctura bezoardica Batean.* Et alia innumera apud scriptores medicos,

SUDOR ANGLICUS.

Vvillisi sententia.

Morbi his-
toria.

Art. 193. Sudor anglicus cœpit anno 1585. circa initium mensis Augusti, duravitque usque ad finem Octobris; & quamvis Sennertus dicat, hoc malum deinceps 40. annos regioni huic familiare & perpetuum fuisse, tamen nostrates, & medici, & historici, qui tunc aut prope ea tempora vixerunt, eum perfecta & magna intervalla habuisse observabant; cumque 66. annorum spatio solummodo quater redierit, viz. anno 1506. 1517. 1528. 1551. vix unquam supra sex menses desævuisse, & nonnunquam spatio trimestri terminatum fuisse, cumque tempestatem valdè humidam semper præcedaneam habuisset. At verò singulis quibus increbuit annis, maximas ubique edidit mortalium strages; ut ab unoquoque ejus regno quibusdam in locis tertia pars hominum brevi desideraretur. Tanta fuit ejus malignitas, ut quamprimum urbem aliquam invaderet, singulis diebus quingentos aut sexcentos occuparet, & ex ægris primo vix centesimus evaderet.

Morbi ty-
pus.

Art. 194. Morbi typum a Sennerto compendiosè & methodicè descriptum, etiam nostris authoribus consonum, hic inferere visum est. Morbo hoc correpti statim sine bubone, carbunculo, exanthematibus, languore dissolvebantur, & animo deficiebant cum summo virium languore, inquietudine *καρδιακῇ*, capitis dolore, pulsu crebro, celeri, inæquali, cordisque palpitatione maxima; sudore verò disfluebant perpetuo & copioso, qui non finiebatur, antequam morbus solveretur, quod intra 24. horas contingebat; nam qui *sudorem* non proliciebant, neque *cardiacis* utebantur, & qui impetentiùs calorem ferebant, auramque frigidam captabant, ii omnes subitò intra 24. horas moriebantur.

tur.

CAP. I. *Sudor anglicus.* 83
tur. Postea ubi morbi hujus ratio innotuit, ut ægri
sudores elicerent, ac cardiacis se munirent; paucio-
res moriebantur.

Art. 195. Circa curationem paulò accuratius scri-
bit *Polydorus Vergilius*: post ægrotantium plurima
experimenta & observationes; a juvantibus & læ-
dentibus factas, ita usu venit; ut remedium uni-
cuique promptissimum inventum sit, quod hujus-
modi est. Si quis interdium sudore corripiatur, cum
vestitu protinus cubatum eat; si nocte, tum quie-
scat, nec se a loco moveat usque ad 24. horas exa-
ctas; interim ita se stragulis oneret; quo non pro-
vocetur Sudor, sed sua sponte molliter stillet, cibi
nihil capiat; si tam diu famen tolerare possit; ne-
que plus potionis consuetae; ac calefactæ hauriat;
quàm modicè satis sit ad sitim extinguendam; inter
hanc curationem imprimis caveat, ne manum qui-
dem aut pedem suum refrigerandi, recreandique
causa extra stragula proferat, quod facere lethale
est. Addunt alii toto isto nycthemeri spatio a somno
prorsus abstinendum fuisse. A sudatione hæc Pestil-
lenti recuperati postquam aliquamdiu sani perstitis-
sent, quandoque in eam rursus, imò interdum vi-
ce tertia, incidebant.

Cajus apud D. Freind. Hist. Med. p. 333.

Vol. II.

Art. 196. Sudor Anglicus fuit morbus tempora-
rius, magnæ Britanniae indigena. Cœpit primò an-
no 1483º in exercitu regis *Henrici septimi* quum ad
portum *Milfordiensem* appulisset, *Londini* sæviebat
a 21º Septemb. ad finem Octobris. Et exinde quin-
que aliis vicibus in insula nostra comparuit, idque
semper æstivo tempore primò in 1485º deinde in
1506º & tunc tertia vice in 1517º ubi tanto impe-
tu æstuabat, ut in instanti quasi, tribus nempe ho-
ris, mortem inferebat; inter optimates multi, &
populares plurimi moriebantur; in quibusdam op-
pidis incolarum dimidiam partem abstulit. Tum

F 2 demum

Curatio
describi-
tur.

Sudor An-
glicus.

demum in 1528o. quartò redibat, quando ægroti intra sex horas perierunt; vita ipsius regis *Henrici octavi* valdè periclitabatur; plurimi inter *Aulicos* interibant. Anno sequenti, viz. 1529. semel tantùm *Belgiam* & *Germaniam* infestabat, apud quos multi occubuerunt. Postremò anno 1551o *Angliam* ultimo invasit; *Westmonasterii* centum ac viginti in dies moriebantur. *Salopia* speciatim, ubi *Caius* author noster commoratus est, ingenti hominum clade invaluit, & tanquam *Pestis Athenis* tremenda est ejusdem descriptio, hoc oppido per septem menses deflagravit, quo tempore mille hominum trucidavit. Maxima proprietate ab illo vocatur *Febris Pestilentialis contagiosa unius dici*.

Sympt.
242,

Art. 197. Modus invasionis sic se habuit. Imprimis singularem aliquam partem affecit; symptomata concomitantia fuerunt calor internus & ardor, sitis inexplebilis, anxietas, ægritudo ventriculi ac præcordiorum (rard tamen vomitus) cephalalgia, delirium, deinde languor & somnolentia gravis, pulsus celer & vehemens, respiratio cita & laboriosa. Infantes, pauperes, & senes cæteris huic morbo minus obnoxii reperti sunt: reliquorum autem pauci a contagione liberi, & inter correptos paucissimi convaluerunt. Exules patriæ in *Galliam*, aut *Flandriam* prophylaxeos causa fuga minus sospitali freti pariter eodem fato cum contreraneis suis obierunt. Et insuper, quod dictu adhuc mirabilius est, peregrini tunc temporis in *Anglia* hospitantes contagio immunes extiterunt, cum *Angli* peregrè existentes morbo correpti sunt.

Methodus
medendi.

Art. 198. Medici hujus novi morbi adeo exitialis aspectu terrifico perculsi primò obstupuerunt, nec quid faciendum sit bene norunt: Experientia verò a juvantibus & lædentibus petita paulo maturius docti eundem debito regimini & medicamentis obtemperare didicerunt. Indicatio curativa primaria,

ria, ac præcipua fuit sudorem liberum promoveret & diutius sustentare: Sudor enim quocummodo imminutus, abruptus, vel suppressus mortem accelerabat, quocirea ægroti omni opera a frigore muniendi fuerunt, & si sudores sponte sua haud satis copiosi fluxerunt; medicamentis diaphoreticis & stragularum plurium impositione provocandi fuerunt, & vires cum cardiacis & vino sustentandæ. Morbus hic acutissimus quindecim horis ad acmen exurgebat, sed non ante hor. 24. res in vado fuit. In quibusdam necesse fuit sudationem repetere; immo in robustioribus quandoque ad duodecimam vicem. Nonnulli, qui sudoribus haud sufficienter indulserunt, in Febres mali moris inciderunt. Primis quinque horis potus omnino prohibendus erat; hora 7^{ma} morbus increvit, qua delirium superveniebat; somnus per totum morbi decursum sedulo excutiendus erat, & carnes non concedendæ.



C A P U T II.

Sive Fasciculus Morborum secundus.

I N F L A M M A T I O.

Art. 199. **I**Nflammatio in genere est tumor renitens ad tactum cum rubore, ardore, dolore urente, tensivo, pulsatili, punctorio, & gravativo, quibus semper accidit Febris plus minus acuta. Tumor vel resolvitur; vel suppuratur, vel in scirrhum abit; vel gangrænescit, & mortem infert.

Inflammatio in genere.

A N G I N A.

*Cæli Aureliani sententia.*Angina
descriptio.

Art. 200. Inflammatio faucium, *synanche* dicta, est difficultas transvorandi (cum suffocationis periculo) ob vehementiam tumoris faucium ; in morbo nascenti adest querela sine ratione, atque difficilis motus colli & gutturis, item saliva pluri-
ma, & subdolens faucium sensus cum asperitate sensibili, difficultas deglutitionis salivæ, tum spirationis, velut impedimentum tanquam obstantis crassioris humoris ; crescente malo partes affectæ rubent & tument, uti tonsillæ, & summitas gutturis ferè ad suffocationem ; dehin intumescit collum atque vultus ; humores evadunt crassiores, oculi prominentes, sanguinolenti ; demum lingua ultra dentes ad exteriora prolabitur, siccescunt fauces, gelidus torpor articulos invadit ; pulsus est celer & densus, locutio cum summo dolore, neque articulata, postremò amputata, livor vultus, recursus poti liquoris (per nares) gutturis atque pectoris stridor, & quibusdam quasi *sonitus caninus*, pulsus defectio, quibusdam oris spumatio, mors.

Curatio.

Art. 201. Lanis mundis ac mollibus, & non infectis, dulci atque calido oleo infusis protegendum est collum cum thorace ; adhibenda est phlebotomia intra diatricon. Aqua calida pro potu ordinario præbenda est.

*Boerhaavii sententia.*Angina
fine tumo-
re ferè se-
per lethali-
tas.

Art. 202. Angina duplex est : Species prima sine ullo tumoris externi internive signo, altera cum tumore aliquo ; prior in fine morborum diuturnorum, maximè post ingentes & repetitas evacuationes,

nes, contingit; pallorem faucium & siccitatem, & tenuitatem, comites habet; quare *nervos & musculos resolutos* plerumque habet; ferè semper est signum imminantis mortis. “ Anginæ gravissimæ sunt [*inquit Hippocrates prognost.*] & celerimè interimunt, quæ neque faucibus, neque in cervice quicquam conspicuum faciunt; plurimum verd doloris & *orthopnææ* inducunt. Remedia vasa vacua bono succo vitali repleantia, calefacientia & corroborantia indicantur; sed rard curatur. Quandoque etiam oritur subitò sine signis manifestis prægressis ullius morbi; vix capit medelam; & ferè semper post mortem suppuratum pulmonem demonstrant.

Art. 203. Angina cum *tumore* accidens varias occupat partes, uti linguam, ejusque musculos, palatum, tonsillas, uvulam, pharyngem, laryngemque earumque musculos, ossis hyoidis musculos, fistulam pulmonalem, œsophagum ejusque musculum, &c. quod plures harum partium inflammantur, ed sævior est morbus & periculiosior, decurrit enim consuetum inflammationis generalis iter, eisdemque facit ac patitur mutationes in resolutionem, pur, gangranam, scirrhum.

Art. 204. In specie hac inflammatoria omni arte tentanda est resolutio; 1. *Venæsectione larga* &, si opus fuerit, aliquoties repetita. 2. *Purgantibus* ore haustis, vel *clysmatibus*. 3. *Victu potuque tenuissimo*. 4. *Nitrosis subacidisque medicamentis*. 5. *Vapore tepido* assidue hausto. 4. *Acet. sambuc. rosar. calendul. ana ʒj. aq. stillat. sambuc. ʒvj. misce.* Vapor calidus hauriatur infundibuli ope in fauces. Fomentis, epithematis, epispasticis, &c. His successu carentibus, denuntiata prius acerbæ prognosi, celebranda erit *bronchotomia*, de qua operatione consulatur auctor, ut etiam de *Angina œdematosa, catarrhosa, scirrhusa, suppuratoria, gangranosa, singulatis*.

Angina
cum tu-
more.

Indicatio-
nes curati-
væ.

Laryngo-
tornia.

Art. 205. " In illa Anginæ specie, quæ *Cynanche* appellatur, ægro suffocanti *Laryngotomia* re-
stitui potest. Morbus ipse periculosior est,
quàm hæc operatio, quæ hoc tempore magis
ad praxin esset revocanda. Circumspectione ni-
hilominus hic summæ opus est, nè, si aliæ
quoque partes pulmo scilicet, pleura, gula,
&c. inflammatae, aut jam pure repletæ, irri-
tus sit labor, & calumniandi ansam præbeat.
Omnibus igitur bene consideratis operatio hoc
modo est aggredienda: reclinetur aliquantum
caput, quo in conspectu magis prodeat tra-
chea, annulique ejus cartilaginei a se invicem
magis recedant. Incidatur deinde cutis secun-
dum longitudinem laryngis usque ad foveam.
Hæc utrinque ministri digitis deducatur, quo
oculis chirurgi occurrant muscoli duo longi
sternohyoidei; cultro ligneo vel osseo a se in-
vicem parum removendi, mox, larynge sese
exhibente, sectio in ea fiat ope phlebotomi,
loco inter annulum cartilagineum tertium &
quartum medio, sedulo cavendo ne cartilagi-
nes ipsæ lædantur. Flatu prodeunte cultellum
aufer, vulnerique fistulam argenteam infigi-
to, benè prospiciendo, ne, longior justo, po-
sticam tracheæ partem attingat, unde tussis
continua. Suffocationis periculo cessante, quod
die tertio aut quarto plerumque contingit,
vel saltem contingere oportet, fistula ablata
vulnus ordinario modo secundum artem curé-
tur, nam ab aliis non differt. Chirur. Barbet.
p. 498.

Ettmulleri sententia.

Anginæ
divisio.

Art. 206. Angina est faucium & colli inflama-
tio; dividitur in *synanchen*, quando interni
faucium seu pharyngis muscoli inflammantur;
para.

parasyanchen, quando dicti externi afficiuntur; *insynanchen*, quando internæ laryngis partes sunt inflammatae; *parasyanchen*, quando dictæ externæ patiuntur. In *synanche* pulmones quoque sæpius afficiuntur, unde insignis respirandi difficultas, tanquam in *peripneumonia*, adeo ut ægri canum more ore hianste respirent. Tonsillarum inflammatio ex lymphæ vitio Febrem habet conjunctam, sed magis lentam, & omnia symptomata sunt remissiora, quàm in *Angina*; fauces rubent, & tonsillæ tumidæ insigniter prominent. Periculosus est Anginæ in *Pleuritidem* transitus. Anginosis spuma circa os apparens est lethale signum.

Tonsillarum inflammatio

Art. 207. In cura omnia ea conveniunt, quæ *Caratiō.* *pleuritide* in usu esse solent, speciatim animalium stercore, ut equinum, caninum, &c. morbum in prima herba detruncant; externè conducit cataplasma ex nido *hirund.* ʒ. nido. *hirund.* No. j. cep. sub cineribus assat. No. iij. flor. *sambuc.* p. ij. coq. in lact. & trajice per cribr. deinde add. alb. græc. ʒß. ol. stillat. ʒß. lilior. alb. q. s. m. *Venesectio* aliquoties repeti debet pro ratione circumstantiarum; omittenda est tamen in *angina maligna* in qua *sudorifera* & *specificæ* sunt usurpanda, & ipse medicus caveat sibi ab halitu ægrotantium: Convenit *vomitium* in principio anginæ malignæ, modò maturè administretur. *Purgantia* locum non habent in angina, sed *enemata* & *visicatoria*: Inter gargarismata *urina propria* valdè commendatur, item *succus sedi majoris cum spiritu vini* & *sal. armoniac.* & *stercore canino*. Præ reliquis convenit gargarisma ex decocto *raparum cum pauco sal. armoniac.* Ad rumpendum abscessum convenit gargarisma ex sem. *sinap. in hydromel. coct.*

Art. 208. In angina notha, aliàs alba dicta, Angina notha curatio. non opus est *venesectio* nisi in plethoricis; conducunt

ducunt potius in principio *sudorifera*, & post hæc *purgantia leniora cum externis resolventibus*, gargarisma ex decoct. origani rad. pyrethri, sem. sinap. cum aceto, &c. & postea succ. semper vivi cum syr. de moris.

Farrago sententiarum.

Sydenhami
methodus.

Art. 209. Angina temperamento sanguineo præditos, & rufos, præ reliquis, invadit; *venæsectio* copiosa in brachio celebranda est, mox in ranula; deinde tangantur partes inflammatæ melle rosaceo spiritu sulphur. ad summum acorem permixto, & *vesicatorium* nuchæ admoveatur. Si morbus sit diuturnior, *venæsectio* repeti debet & *enemata* injici, item *catharticum* propinari, &c. Sydenham.

Remedia
ad salivam
moven-
dam.

Art. 210. ℞. ol. amygd. dulc. flor. sulphur. ana ℥j. chrystall. tartar. sacchar. cand. ana ℥ij. ol. n. m. gut. iv. syr. de alth. ℥iij. m. f. linctus. Atque hunc præ aliis omnibus laudat Dr. Harris in observ. morb. grav. Ad salivam copiosissimè educendam nihil pulv. sequent. (inquit author) præstantius efficaciusve novi. ℞. chrystal. mineral. sacchar. chrystal. ana p. æ. misce; teneatur in ore ̄j. donec saliva abundaverit, tunc expuatur; horæ post quadrantem vel dimidium repetatur; mirum quantum hinc salivæ, &c. Musgrave. Succus corticis viridis nucum cum melle depuratus commendatur a Galeno.

Remedia
varia.

Art. 211. " Venæsectionem in ranula omnes
,, ferè extollunt, quidam in vena jugulari; phle-
,, botomia verò in pede alterutris præferri debet
,, ob majorem revulsionem. Angina nulla tuta
,, est, quanto minus tumoris, tanto magis peri-
,, culi; securissima est, si rubor maximè foras
,, vertatur. Internè antipleuritica ferè omnia pro-
,, sunt, privatim oleum lini nunquam satis laudan-
,, dum.

CAP. II. *Pleuritis & Peripneumonia, &c.* 91
 „ dum. Externè gargarisma anginosum, gargaris-
 „ ma ad pituitam, cataplasma anginosum, vapor
 ad anginam, &c. Fulleri. Item gargarisma se-
 quens in angina notha, *℞. auric. judaic. ℥iss.*
rad. pyrethr. ℥ij. herb. hyssop. p. ij. ficuum ping.
scis. N. iv. coq. in aq. font. q. s. ad ℥ij. sub fi-
nem addendo mellis ℥iv. colatur. add. pulv. subri-
lissi. alb. græc. ℥ij. sp. vin. rectificat. ℥ij. sp. cochlear.
℥ls. misce.

PLEURITIS & PERIPNEUMONIA vera & notha.

Sydenhami sententia.

Art. 212. Temperamento sanguineo præditos Pleuriti-
dis deseri-
ptio.
 præ reliquis Pleuritis aggreditur cum rigore, hor-
 rore, deinde calore, siti, &c. Elapsis paucis horis
 (licèt aliquando multò seriùs) æger vehementi
 dolore punctorio in latere circa costas corripitur,
 qui nunc versùs omoplatas, nunc versùs spinam,
 nunc ex adverso versùs anteriora pectoris se pro-
 pagat; tussì etiam crebra affligitur: in initio ma-
 teria pauca & tenuis ejicitur sanguineis intermixta
 particulis, postea copiosior & magis concocta san-
 guine etiam permixta; aliquando ad expectoratio-
 nem copiosiore non provenit; febris pari passu
 incedit cum tussì, sputo sanguinis, dolore; & pro-
 ratione liberioris expectorationis sensim imminui-
 tur; alvus nunc nimis astricta, nunc soluta.

Art. 213. Est ubi *venesectione* omissa æger ne Medendi
methodus.
 tussire quidem valeat, sed immani dyspnœa labo-
 rans suffocatur; interdum ad apostema res redit,
 quod *empyema* dicitur; per accidens (viz. ex usu
 medicamentorum calidorum) aliis febribus Pleu-
 ritis interdum supervenit ex precipitatione mate-
 riæ febrilis in Pleuram. *Venesectio* repetenda est
 ad 3^{am} 4^{amve} vicem, si sit indicatio; in adultis

VIX

vix sanatur minori quam 40. circiter unciarum sanguinis impenſa. Æger è lecto quotidie eximatur ad horas aliquot, prout vires ſuaſerint, quod multum conſert ad curationem.

*Peripneumoniae
noſta
deſcriptio.*

Art. 214. Peripneumonix noſtæ inſultu primo nunc incaleſcit nunc friget æger, ex motu quolibet vertiginofus eſt, rubent & inflammantur genæ oculique, tuſſit, & inter tuſſiendum admodum dolet caput, ad vomitum proclivis eſt, urina turbida eſt, & intenſè rubet, ſanguis pleuriticoꝝ ſimilis; adeſt anhelatio, & dolor totius thoracis, & pulmonum coarctatio. Ab *aſthmate ſiccò* planè diſtinguitur, quod in iſto nuſquam comparent febris indicia, in hac maniſeſtè ſe produnt, licèt minora longè & magis obſcura, quàm in *Peripneumonia vera*.

Cura.

Art. 215. Curatio *venæſeſtione*, *remediis peſtoralibus* & *dieta refrigerante* perficitur. “*Miſtura expeſtorans Fulleri, vel ſyr. e Peto Batcano*,” hîc quandoque locum habere poteſt.

Cælii Aureliani ſententia.

*Peripneumoniam
veteris
deſcriptio.*

Art. 216. Peripneumoniam (uti pleroſque alios morbos) optimè deſcripſit *Cælius Aurelianus*. Adeſt, inquit, febris acuta, gravedo thoracis, & ſenſus laborantium quadam difficultate laterum atque mediarum mammarum, decubitus ſupinus atque paulò erectior, ſupra latus jacendi difficultas, vultus ruſor tanquam florens, oculorum ſplendor; ſequitur anhelitus celeritas, tuſſicula ſanguinolenta ac biliola vel ſumofa-jactans ſputa, pleuriticoꝝ fulviora vel ſpumofiora, ſpiratio difficilis, deſiderium frigidi atque plurimi aeris hauſtu rapiendi, frigidi potus appetitio, os ſiccum, lingua aſpera; ac primùm ſubalbida, dehinc rubra, pulſus vehemens & celer, anxietas, jacta-

jaetatio, vigiliæ juges, ingemens atque turbulentus summus; aucto morbo spiritus difficillimè trahitur cum sibilatu; sequitur colli ac vultus inflatio, oculorum immobilitas, visus nubilosus, mentis alienatio, articulorum frigidus torpor cum livore, lingua crassior, sudor superiorum partium, pulsus latens aut formicans; postremo pectoris resonans stridor. (En accurata morbi descriptio, *erubescant* moderni.) " In Peripneumonia hæc adsunt
 „ (*inquit Hippocrates de humoribus*) febris ve-
 „ hemens, crebra & calida respiratio, anxietu-
 „ do, virium prostratio & corporis jaetatio dolo-
 „ resque ad omoplatam, claviculam & mammas,
 „ pondusque in pectore, atque delirium.

Hippocratis descriptio Peripneumoniam.

Art. 217. Adhibenda est *phlebotomia*; potui ordinario danda est *aqua calida*, item cibus sordibilis & tenuis; conducunt eclegmata ex *lini semine*, *sanugr. nucelis* & *melle decoct.* & *ovorum vitellis confect.* Curatio.

Boerhaavii sententia.

Art. 218. Pleuritis aggreditur nullam non partem integumentorum interni thoracis, pleuræ, scilicet vel mediastini; ideoque dolor punctorius in quamlibet partem thoracis incidere potest, sed frequentius latera obsidere solet, atque hoc febre conjuncta *veram* efficit *pleuritim*; si verò aliis intercostales muscoli & his superiora laborant, *spuria* appellatur. Differentia inter veram & spuriam Pleuritim.

Art. 219. In Pleuritide vera sanguis mitti debet copiosè quàm maturè per magnum vulnus, repetique debet pro ratione symptomatum urgentium; crusta alba ablens *sanguinem mittendi finem* definit. Externè conveniunt *fotus*, *linimenta*, &c. Internè *diluentia*, *resolventia*, *refrigerantia*, *dolorem lenientia*; omnia calidè & magna copia sorbenda sunt. Interdum locus inflammatus ad *suppurationem* vergit, quod scitur ex pertinacia doloris, Pleuritis vera Curatio.

loris, febris, &c. ultra quartum diem; *abscessum* jam fieri cognoscitur ex horrore sæpè recurrente, remissione doloris, anhelatione, decubitu in unum tantum (i. e. in affectum) latus tolerabili. Rupto abscessu pus stillat in cava pectoris, & incrementum capit ex ulcere depluente, unde *Empyema*, de quo postea. Interdum vero locus affectus evadit *scirrhus* cum pulmonis & pleuræ adhæsiōe, undè *asthma* & *tussicula sicca*, malum immedicabile, nisi quod forsitan aliquid levaminis a labore, & equitatione multa possit recipere. Interdum loca inflammata *gangrænesunt*; unde mors cita subsequitur; *gangranam* inceptam esse scitur ex delirio, livido thoracis colore, sputo subbilioso, doloris sine ratione remissione, &c.

Peripneumonia typus & cura.

Art. 220. Peripneumonia est inflammatio pulmonis totius vel unius lobi; prior immedicabilis merito censetur ob magnitudinem morbi, altera medelam quandoque admittit; eodem modo ac iisdem remediis tractanda est ac *Pleuritis*, eundemque ut plurimum habet eventum. Si non resolvatur, *abscessum vomitæ*ve format intra quatuordecim dies, quod fieri ostenditur ex horripilationibus, doloris remissione, pulsus debilitate, manentibus adhuc dyspnœa, siti, febricula vespertina, &c. Exinde sequitur interdum suffocatio ex subita eruptione puris in asperam arteriam; interdum evacuatur ingenti sputo purulento; vel in thoracis cavitatem delabitur, undè *empyema*, *phthisis*, &c. postremò materies purulenta interdum intra pulmonales venulas resorbetur, & cruori miscetur, & in loca quædam alia deponitur, in hepâr, lienem, cerebrum, &c. hinc fiunt *abscessus peripneumonici* ad aures, crura, vel hypochondria, ubi si citò evanescant, redeunte peripneumonia, casus est lethalis.

Peripneumonia. *Art. 221.* Peripneumonia notha oriri solet ex pitui-

piquita lenta in toto sanguine nata, & senilium ^{monia no-}
pulmones inficiente, donec in hunc morbum eat; ^{tha typus.}
senes, pituitosi, frigidi, catarrhosi, & gravedi-
ne laborantes huic morbo sunt obnoxiores: pri-
mò fallaci lenitate opprimit inopinantes, quip-
pe levi fatigatione, debilitate, prostrato ferè o-
mni animi motu, anhelitu, oppressione pectoris
incipiens; adeo leves motus excitat; ut vix ca-
loris, febrisve indicia moneant periculi: mox va-
gæ horripilationes, leviuscule febris insultus ad-
sunt; unde subito crescente anhelitu, & debilita-
te, mors; cujus in urina & pulsu vix ullum ad-
fuit præsagium.

Art. 222. Curatur sanguinis missione, clysmati- ^{Curatio:}
bis, victu tenui, diluentibus, abstergentibus, &
lenissimè aperientibus assiduo propinatis. “ Brevi-
ter & raptim hæc pauca decerpsi, sed de his
affectibus præ omnibus quocunque scriptoribus
consulendus est auctor præclarissimus, & ad il-
lius mentem consequendam unice incumbendum
est, & summa impendenda est opera.

Etmulleri sententia.

Art. 223. Observatum semper fuit in Pleuriti- ^{Pleuritis:}
de correptis, quodd non solum Pleura, sed pulmo-
nis medietas simul in isto latere inflammata fue-
rit. Interdum quoque cum pulmone inflammatur
mediastinum, duplicatura nempe Pleuræ sub ster-
no, quæ nomine caret.

Art. 224. Pleuritis notha est dolor lateris puth- <sup>Pleuritis
notha.</sup>
torius, sed sine febre aut tussi; ægri ut pluri-
mum in latus oppositum potius quàm morbosum
decumbere, queunt; contrarium observatur in
Pleuritide vera.

Art. 225. Si statim intra triduum sputum cru- ^{Prognosis:}
entum appareat brevem morbum indicat, sin ve-
rò seriùs longum. (ex Hippocrate) Pleuritis in,

tra

¶ a 14. dies superne non repurgati *Empyemici* fiunt (*inquitt Hippocrates*) & tales, si in 40. diebus repurgentur a die ruptionis, liberantur, alioquin in *tabem* incidunt; in his affectibus sputorum potius habenda est ratio quam urinæ; *Pleuritis* in principio leviter apparens & usque ad 5^{um} diem sic procedens, 6^{to} verò die exacerbata plerumque est lethalis.

Curatio.

Art. 226. In *Pleuritide benigna venæsectio* si non juvet, non noceat, in *maligna* tamen vix locum habet, sed semper erit nociva. Ex omnibus auxiliis *sudorifera* primarium obtinent locum, & præ reliquis *antimonium diaphoret.* “Antimonium diaphoreticum summè commendatur in *Pleuritide* tum vera tum spuria; egregiè discutit humores congestos, acorem absorbet, dolores demulcet, expectorationem promovet, indicationibus ferè omnibus satisfacit, *Vvedelius*. Antimonium diaphoreticum aeri aliquamdiu expositum vim emeticam acquirere nemo non novit, ideoque usus tempore lavari jubeo.” Nobilissimum pectorale habemus in *liquiritia & passulis*; saccharata non convèniunt; *papaver Rhæas ejusque flores*, seu optimum specificum, in toto morbi decursu locum habent; omnia calidè sunt bibenda; *succus taraxaci seu dentis leonis vel decoctum ejus*, ut & *eryngii*, laudantur, item *chæsol.* Succus *raphani* recens express. expectorationem mirabiliter promover. Ad dolorem lateris externè commendatur *stercus gallin. cum ol. cham.* “ut & sequens cataplasma, ℞. alb. porri in sartagine cum q. s. ol. cham. frixi ℥ij. fursur. frument. m. j. sacum vin. alb. ℥ij. vel q. s. m. convenit etiam infus. seq. intus sumptum; ℞. Stercor. equi non castrat. ℥vj. vin. alb. ℔iij. aq. flor. spin. alb. ℔iij. infund. clausè & calidè per hor. dimid. deinde coletur cum expressione forti, colatura cum alb. ovor. s. a. clarificetur,

CAP. II. *vera & notha.* 97
„ tur, & add. aq. theriacal. stillat. ℥iv. syr. bal-
sam. ℥iij. m.

Baglivii sententia.

Art. 227. Durities pulsus est signum ferè in- Signum
pathogno-
monicum
Pleuritidis
fallibile omnium Pleuritidum, quamvis reliqua
signa non adsint; durus enim pulsus omnium in-
flammationum partes nerveas vel membraneas ob-
sidentium est comes indivulsus. “ Pleuritis vera
,, (inquit Chesneau) cognoscenda est imprimis a
,, pulsu duro. Nonnulli affirmant pulsum esse ser-
,, ratilem, sed ingenuè fateor me nunquam serra-
,, tilitatem illam deprehendere potuisse; ideoque
,, parvipendo tanquam rem fictitiam & imagina-
,, riam, contentus duritie pulsus, quæ sufficit ad
,, Pleuritidem dignoscendam. “ Pleuritides fre- Pleuriti-
des occul-
tæ.
quenter sunt *occultæ*, quia indolentes, unde quan-
doque errores in praxi; fac itaque ægrum in dex-
trum vel sinistrum latus decumbere, decumbenti
impera, ut fortiter respiret & tussiat, & tunc
pete ab illo, an dolorem aut gravedinem persen-
tiat, quod si affirmet, res manifesta est; hoc mo-
do plures *Pleuritides* deteximus magno ægrotan-
tium commodo.

Art. 228. Omnis prognosis a bona vel mala re- Prognosis.
spiratione maximè petenda est. Perperam agitur
cum *Pleuriticis*, qui nihil expuunt, nisi copiosè
effluant urinæ. Omnes Pleuriticos sanatos vidi-
mus, quibus in interiora auris dolor & exinde sup-
puratio supervenerunt. Crusta alba non apparens
in superficie missi sanguinis est pessimum signum.
Pleuritides recidivantes omnes ferè sunt lethales
(*ex Hippocrate.*)

Art. 229. Quando in Pleuritide viget indicatio Regulæ
de venæ
sectione,
&c.
dissolvendi, *camphora* præ reliquis opus absolvit,
(præsertim in *Pleuritide epidemica & maligna.*)
Si sputum antea suppressum superveniat, & sit
G flavoru-

flavorubescens nunquam imperato *venesectionem*; nam post *venesectionem* sputum denud supprime-
tur & æger morietur. Quocunque die, secun-
do scilicet, aut 4^{to} 5^{to} 7^{mo} &c. ante vel post
missionem sanguinis spirandi difficultas, & dif-
ficultas pariter excreandi sputi pleuritico superve-
niant: statim duo *vesicantia* tibiis admovenda
sunt, juxta illud *Hippocratis*; in *pulmonicis*
quicunque tumores fiunt ad crura optimi sunt;
&c. Post apposita vesicantia observavi expectora-
tionem statim promoveri, spirandi difficultatem
imminui, & alvi fluxum, si adesset, feliciter
fieri, & ægrum sanari.

Vuillisi sententia.

Horum
affectuum
complica-
tio.

Art. 230. Opinari ducor *Peripneumoniam*, &
Pleuritidem affectus esse modò singulares & sepa-
ratos, modò connatos & primitus coexistentes,
& modò invicem successivos aut succeedaneos es-
se. *Peripneumoniam* non tantùm *Pleuritidi*, sed
frequenter etiã *angina*, & aliis interdum affe-
ctibus succedit.

Pleuriti-
dis even-
tus.

Art. 231. De Pleuritico expectatur, vel ut mor-
bus statim solvatur, partim crebra & libera *ve-
nasectione*, & partim *sudore critico* die 4^{to}, vel
8^{to} exorto, vel ut, his non rite succedentibus,
diutius protrahatur; & tunc sæpissime huic morbo
Peripneumonia aut *Empyema* vel *utrique affectus*
superveniant, periculi pleni, qui ægrum e medio
ut plurimùm tollunt, aut in *phthisin* ægrè sana-
bilem aut exitialem præcipitant.

Cucurbi-
tæ.

Art. 232. *Riverius* & *Zacutus Lusitanus* exem-
pla notabilia adducunt curationis Pleuritidis per
cucurbitas cum scarificatione loco dolenti adhibi-
tas. Pro usu externo in linimentis utiliter adda-
tur *album græcum*.

Farrago sententiarum.

Art. 233. Densa & exercitationi assueta corpora (inquit *Hippocrates in coac.*) citius ex *Pleuritide & Peripneumonia* intereunt, quam quæ sine exercitatione degunt. *Pleuritides sicca* (inquit idem) & in quibus nihil spuitur; gravissimæ; metuendæ quoque in quibus dolores ad superiora tendunt. A *Pleuritide Peripneumonia* malum; a *Peripneumonia Phrenitis* malum. *Hippocr. aphor.* sanguis missus est remedium magni & recentis doloris; at si ve levior, si ve vetustior casus est, vel supervacuum vel serum id auxilium est, confugiendumque est ad *cucurbitulas* eum scarificatione. *Celsus.*

Ad pib.
gnosin
pertinen-
cia.

Art. 234. *Pleuritides*; ultra acutam febrem, sunt *polypose concretiones* in pulmonibus, ut ex cadaveribus, & extracto sanguine patet: *Malpighius.*

Polypi.

Art. 235. Adverti debet *Pleuram* *Pleuriticorum* & *Pulmonem* *Peripneumonicorum* post mortem sectorum semper exhibuisse spectandam magnam copiam *polyporum*: *Polypus* autem est sanguis diutius stagnans dilapsa parte rubra; & raro *pleura* sola absque pulmone inflammatur.

Polypi.

Art. 236. Dolorem externè optimè leniunt linimenta ex ol. amygd. dulc. sp. sal. armoniac. & camphora. *Pitcarn. in MSS.* "Item linimentum, seq. anodyn. ʒj. balsam. Locatel. ʒij. ol. amygd. dulc. ʒj. ol. mac. per express. ung. e flor. durant. ana ʒij. m. f. liniment.

Linimentum.

Art. 237. Quibus plurimus ex sputo strepitus in pectore sonat; & vultus demissus est; oculisque aurigine suffusus, & caligine obductus, in his mors expectanda est, ex *Hippocrate*, & authoris experientia. Vix datur præstantius remedium in fine morbi, quam *syrupus* vel *decoctum nicotiana*, *Barbette*.

Prognosti.
con singu-
lare.

Syrupus
de Peto.

Cineres
pro usu
exceino.

Art. 238. Lucius monitu *Æsculapii* a Pleuritide curatus fuit applicatione epithematis ex cineribus ab ara desumptis & vino committis. *Le Clerc.*

Remedia
varia.

Art. 239. Vires & usus remediorum sequentium artis Apollinæ gnaris satis innotescunt. *Aq. omnium florum, balsam. sulph. anisatum, ens veneris, decoctum coccineum, decoctum pleuriticum, emplastr. pleuriticum, fons lateralis, haustus pleuriticus, loboch. pleuritic. loboch. viride, oximel asthmaticum, pulvis pleuriticus, sacculus lateralis, unguentum pleurit.*

E M P Y E M A.

Boerhaavii sententia.

Empyema
quid.

Art. 240. Empyema est collectio puris in thoracis cavo, ut plurimum ex rupto Pleuritico vel peripneumonico *abscessu*; cognoscitur a tempore ineptæ inflammationis *xx.* dierum sine purgatione, a tussi sicca, gravitate ad diaphragma, decubitu in unum latus, strepitu puris ad motus, Febre lenta, genis rubentibus, oculis cavis, digitis in extremitate calidis, unguibus recurvis, & abdominis tumore.

Curat.

Art. 241. Ad curationem quod attinet, cognita vomicæ pulmonis, pleuræ, diaphragmatis, mediastini, vel pericardii disruptione, omni ope nitendum, ut pus evacuetur per os, vel per urinas, si natura has nonstraverit vias, vel denique per thoracis aperturam ope instrumenti idonei in latere affecto, inter costam 4 & 5, vel 5 & 6 ab inferioribus numero ducto, pus lentè & per vices educendo; ex indole puriseducti, & reliquis ægrotantis circumstantiis, prognosis de vita vel morte pronuntianda erit; si *Empyema* fuerit vetus, vires collapsæ, capilli cadentes, alvi fluxus colliquativus, corpus tabidum &c. *paracentesis* facta mortem accelerare solet.

Vvilli-

Vuillisi sententia.

Art. 242. Empyema est collectio puris intra cavitatem thoracis qua respirationis organa opprimuntur; illuc verò pus istud confluere solet, vel ex *pleuritide*, vel *peripneumonia* (& quandoque forsitan ex *angina*) suppuratis & disruptis; post morbos prædictos *Empyematis* secuturi major erit suspicio, si post unam vel alteram septimanam sine sputo copioso, rigores, & febris, & spirituum languores, superveniant, & dein post 14, vel 20. dies *Empyematis* planè facti signa erunt respiratio difficilis, pectoris gravitas, materiæ fluctuatio, & molestiæ sensus e corporis situ mutato, sitis & febricula ferè constans, genarum rubor, totius inquietudo & vigiliæ. De *paracentesi* vide locum, & de eventu ejusdem p. 201. Vide etiam *Mayerne*, p. 178.

Signa Em-
pyematis*Estmulleri sententia.*

Art. 243. Cognoscitur, quando factum sit *Empyema*, quòd remittat febris, quin etiam fluctuatio quædam puris hinc inde percipitur; rumpitur autem *vomica* circa diem 20. 30. aut 40. dum verò rumpitur, rigor fit, & febris intensior supervenit, adest tussis continua, quasi ex profundo, quia diaphragma gravatur ex incumbente pure, parum excernitur, febris mitior evadit, & magis lenta, respiratio est difficilis, & sentitur pectoris gravitas si corpus inclinant penè suffocantur, sentiunt frequentissimè *evaporationes* ex pectoris cavo ad os ascendentes instar *aquæ calidæ*; ulteriori progressu percipiunt in ore *saporem tetrum* & quasi *putridum*, & pulsus intermittit.

Diagnos.

Art. 244. Apertio thoracis fit inter 5^{am} & 6^{am} costam (a supremis numerando;) maturè fiat.

Cura
per aper-

placem
thoracis
& aliter.

Vide *Scultesum*. Quod ad remedia attinet, exhibenda sunt grumolum sanguinem *dissolventia* & *absorbentia*, & tunc præstat a *diureticis* incipere, in fine autem aliquod *sudoriferum* subnectere. Si molliatur aliquid natura, semper medicus sit ejus minister; V. G. quando urina purulenta redditur, dentur *diuretica*; in diarrhœa purulenta, *laxantia*; si ad sputum vergat; *expectorantia*, immò *vomitaria*, *nicotiana* est egregia; *fonticuli* etiam a quibusdam inter costas inutuntur, interne *balsamica*, *vulneraria*, decocta e *lignis*, *gelatina C. C. hedera terrestris* valde commendatur, Vide *vomica pulmonis*. (541. &c.)

PHRENITIS & PARAPHRENITIS.

Vuillisii sententia .

Phreni-
tis quid?

Art. 245. Phrenitis est desipientia continua, scilicet principum cerebri facultatum depravatio ab inflammatione meningum orta cum febre synocha. Huic morbo affinis Paraphrenitis dictus est diaphragmatis inflammatio.

Phreni-
tis causa.

Art. 246. Phrenesin potius feбри succedere, & quia sanguis effervescentiscrementa sua adusta capiti transfert, produci, *Hippocrates* olim, & nunc quisquam vel e plebe observat; in quantum, scilicet, febricitantis urina a turbida & crassa, in tenuem & aquosam mutata Phrenesin imminetem indicat; ejus idcirco affectus causa exinde colligitur esse *materia febrilis* in cerebrum metastasis.

Quales
morbis re-
vera sunt
Phrenitis
& Para-
phrenitis.

Art. 247. Ex dissectionibus patet Phrenesin non a meningum inflammatione oriri, neque Paraphrenesin diaphragmatis; sed Phrenitis definiri potest; *totius animæ sensitivæ sive spirituum animalium, quoad totam eorum hypostasim, phlogosis sive inflammatio*; & prout incendium vel a cerebro tantum,

tum, vel ab hoc simul & cerebello, incipit, vul-
gò in *Phrenitida* & *Paraphrenitida* distinguitur,
quod tantundem est ac functiones animales spon-
taneas ferè tantum & potissimum, aut unà cum
his vitales lædi.

“ *Phrenitis* (inquit *Lommius*) his signis inno-
,, tescit; febris urget acuta, atque continua, con-
,, tinuusque mentis error, modò his, modò a-
,, liis animæ vitalis actionibus; expeditus in o-
,, mnem audaciam homo est, & vicissim tum
,, vigiliis, tum somno difficili, turbulentoque im-
,, peditur, sic ut interrupta quiete protinus cum
,, impetu e cubili profiliat, vociferetur, ferociat,
,, ac modò ploret, modò cantet, verbaque sine
,, sensu, sine ordine proferat, interrogatus ab a-
,, lio omnia aliena respondeat; oculi sunt mobi-
,, les; flammæ, cruenti, squalidi, quos æger
,, crebrius perfricat, modò siccos, modò lachrymis
,, perfusos; lingua aspera & nigra, dentes stri-
,, dent; sæpèque cruor e naribus aliquis fertur,
,, & interdum posteriora capitis dolent; idem
,, manibus tremit, digitisque floecos vellit, &
,, festucas e stragulis legit; urina est tenuis flam-
,, mea, interdum etiam (quod pessimum) te-
,, nuis albaque est.

Signa diag-
nostica,

Art. 248. *Phrenitis*, aut brevi tempore in sa-
lutem, aut mortem, cum febre terminatur; aut
diu protracta & post febrem superstes, demum
vel sanatur, vel in alios morbos, nempe, *lethar-*
gum, aut *maniam*, aut *melancholiam* transit, vel
demum in *desipientiam perpetuam*, fracto, scili-
cet, (quod ajunt) cerebro.

Prognost.

Art. 249. Si *Phrenitis* in principio febris acci-
dat, *venæsectio* locum habet, & *enemata* sunt præ-
cipui usus, cataplasmata pedibus admoventur debent
ex *sol. rut. cham. verben. rad. brion. flor. papav. er-*
rat. cum sapone; vel eorum loco *columbæ* vel *pul-*
li dum calent descissi; pro siti restinguenda bi-

Curatio;

bat *Palmaris* potum divinum; scilicet *aquam fontan.* cum *succo limon.* & *sacchar.* vel emulsiones; *hypnotica* sunt cautè usurpanda; in hoc affectu *placenta rosacea* vel *flores papaveris cum aceto & nuc. moschat.* capiti & temporibus cum fructu applicari potest.

Boerhaavii sententia.

Vera vel symptomatica. *Art. 250.* Phrenitis est vel *vera*, ubi cerebrum vel potius illius meningis utraq̃ue primariò inflammatione afficiuntur cum delirio & febre acuta conjuncta; vel *symptomática* ex metastasi materiæ febrilis in cerebrum.

Eventus. *Art. 251.* Phrenitis *vera* 3º, 4º, vel 7º die necat; vel abit in *maniam*, *lethargum*, *coma*, *catrochen*; A *peripneumonia & ileo* lethalis; a *variolis* admodum mala.

Indicationes curativæ. *Art. 252.* Hæmorrhagiæ quandoque morbum solvunt. In Phrenitide vera prodest *venæsectio* larga. "Immo in hoc affectu (inquit *Dolæus*) artem, teriotomiam in temporibus institutam commendamus." Indicantur *diluentia* ex decoctis, *antiphlogisticis & nitrosis* affatim exhibitis, *laxantia & clysmata*, *capitis rasura*, *epispastica*, *cucurbitæ* in partibus inferioribus.

Sectio vena jugularis. *Art. 253.* "Certè in Phrenitide (inquit *D. Freind*) quæ febribus supervenit, sectionem *venæ jugularis* quàm maximè efficacem esse expertus sum, cum alia remedia minùs commodè responderint: neque efficacem tantummodo, sed & adèd tutam, ut valdè mirer aliquid de efficiendi difficultate, nedum periculo apud scriptores inveniri; nam hæc vena, uti nullo ferè labore secatur, ita & secta facillimè omnium sanescit. (Frequentissimè etiam in aliis capitis morbis gravioribus in praxi mea *jugularem* secui.)

Art. 254.

CAP. II. *Phrenitis & Paraphrenitis.* 105

Art. 254. Paraphrenitis est morbus *Pleuritidi* similis, ubi diaphragma vel saltem ejusdem margo verè inflammatur, & longè frequentior est, quàm vulgè creditur; cognoscitur ex febre continua; dolore inflammatorio in inspiratione maximè urgente; hinc respiratio sublimis, celeris, suffocativa, delirium perpetuum, convulsio, furor, gangræna, (symptomata omnia atrociora quàm in *Pleuritide*); & licet totum malum cognitum sit, insuperabile tamen.

Paraphrenitis quid.

Etmulleri sententia.

Art. 255. Phrenitis moderno usu vocabuli, est delirium intensissimum ex membranarum cerebri inflammatione ortum cum febre peracuta, veteribus *Sphacelismus* seu *Sphacelus cerebri*; est malum ut plurimum lethale, 3º, 4º, vel 7º, die intereunt; Lethalem phrenitidem denuntiant dyspnoea, facies cadaverosa, sudor synepticus, lingua & manus tremulae; stridor dentium, stillicidium narium, &c. si in principio morbi acuti de dolore in bulbis oculorum conqueruntur ægri, funestissimum est signum, mox enim *delirium* & *convulsiones* aderunt, quod sæpius observavi; convulsiones superveniunt, quando inflammatio cerebri incipit abire in gangrænam.

Phrenitis affectus.

Plerumq; lethalis.

Art. 256. Cura nil habet peculiare præ cura in febre acuta cum delirio; *Tinctura papav. rhæad.* effervescentiam sanguinis compefcit; item *camphora* & *nitrum*; quando ab alio morbo pendeat, curato morbo primario delirium cessat; ideoque *sudorifera* & *alexipharmaca*, sunt propinanda, ut *tinctura bezoardica*, &c. In febre ardente decoctum *tamarind. epithemata* etiam plantis pedum conducunt.

Cura.

Art. 257. " *Blandiora acida & cinnabarina* *Acida*,
„ cum *emulsionibus* inter interna remedia omne &c.
" ferunt

„ fuerunt punctum in phrenitide ex præcepto *Vval-*
dschmidii. “

INFLAMMATIO VENTRICULI.

Ettmulleri sententia.

Inflam-
 matio Ven-
 triculi.

Art. 258. Inflammatio stomachi est affectus peri-
 culosus, & si quis alius, peracutus; adest febris
 ardens, & aliqualis tumor in præcordiis, circa Ven-
 triculi regionem dolor insignis sub costis nothis,
 cum gravi æstu ibidem, siti inexplebili, corporis
 iactatione & vigiliis; superveniunt deliria, vomit-
 us, & non raro convulsiones lethales, raro eva-
 dunt; 3^o, vel 4^o die finiri solet; interdum, sed ra-
 ro, ad suppurationem tendit, & *abscessus* rumpitur,
 vel in Ventriculi vel abdominis cavo, malum ferè
 semper incurabile.

Differen-
 tia inter
 Ventricu-
 li & He-
 patitis in-
 flamma-
 tionem.

Art. 259. Distinguendum est inter *Ventriculi* in-
 flammationem & *Hepatitis*; in priore ardor & do-
 lor magis in profundo sunt, in hepate inflamma-
 tio magis circumscripta est, & mitiora urgent sym-
 ptomata. (268.)

Curatio.

Art. 260. Curatio eadem est ac in aliis inflamma-
 tionibus, viz. per *venæsectionem*, &c. *Sudorifera*
 primatum obtinent. Externè convenit cataplasma
 ex *stercore columbino*, *fermento*, &c. ad suppura-
 tionem promovendam ad imitationem *Sennersi*,
Vid. Boerh.

INFLAMMATIO INTESTINORUM.

Ettmulleri sententia.

Inflam-
 matio in
 testinorū.

Art. 261. Accidit in herniis, ileo, & ab aliis cau-
 sis. In loco inflammato tumor rotundus tactui
 [quandoquē] percipi solet; adest vehemens dolor
 pulsatorius, fixus, distendens, &c. alvus occlusa,
 febris,

CAP. II. *Inflammatio Mesenterii.* 107

febris, vomitus, languor, &c. frequentius in *ileum lethalem* terminatur. Commendatur *omentum ver. pecinum*. Vide *Ileum* [666.]

Art. 262. Consulatur *Boerhaave* instar omnium Boerhaave
v6.
scriptorum de *Intestinorum inflammatione*.

INFLAMMATIO MESENTERII.

Estmulleri sententia.

Art. 263. Inflammationes & tumores Mesenterii sepius sunt fons & origo chronicorum & admodum latentium morborum, & fomes mirabilium turbarum ægros & medicos vexantium. Dolores adsunt nunc circa dorsum & lumbos, nunc in abdomine & circa umbilicum, tormina inferentes, lenti tamen omnes & diuturni, subinde cum febricula erratica; dolores subinde per intervalla recurrunt. Inflam-
matio Me-
senterii.

Art. 264. Quando apostema suppuratum rom. Abscessus;
patitur, horror insignis, interdum rigor quatit ægrum, cum superveniente æstu non raro insigni, quem puris præsertim per alvum excretio successivè comitatur.

Art. 265. Corpus sensim emaciatur; respiratio evadit difficilior; & subinde aliquid molesti, quod ipsi ægri satis explicare nequeunt, in profundo abdominis circa & infra umbilicum perferre affirmant, flatulentia ægros vexare solent. Sæpe multis annis affligunt hujusmodi tumores, in *scirrhus* & *strumosis* abeuntes. Diagnos.

Art. 266. Curantur hæc pathemata Mesenterii, Curatio
cùm diuturniores sunt, ut alii chronici affectus, *cachectici* & *hypochondriaci*; tractandi sunt tamen cautè & sine violentia. Convenit externè *empl. de cicuta cum ammoniaco*, *de ranis cum mercurio*, &c. Internè *deobstruentia*, *millepedes*, *remedia ad strumas*, &c. Apertio venarum hæmorrhoidalium
per

INFLAMMATIO PANCREATIS.

Etmulleri sententia .

*Inflam-
matio Pan-
creatis .*

Art. 267. Inflammatio Pancreatis est affectus perquam occultus ; vigilias , lipothymias , aliaque gravia symptomata inferens , in *abscessu* plerumque terminans . Interdum superveniente salutari fluxu cruento curantur hi morbi .

INFLAMMATIO HEPATIS.

Etmulleri sententia .

Hepatitis :

Art. 268. Inflammatio Hepatis & ejusdem abscessus vocatur aliàs Hepatitis . In genere percipitur in omni Hepatis inflammatione dolor obscurus & tensivus ac gravativus in dextro hypochondrio & ejus profundo , qui sub suppuratione punctorius plus minus evadere solet ; adest febris lenta plus minus verò acuta pro ratione gradus inflammationis ; ægri ferè supini jacent , præsertim si diaphragma afficiatur , & tussis arida affligit . In genere in *pleuritide vera* omnia symptomata sunt acerbiora , in *hepatitide remissiora* . Periculosum est malum , & quod sæpius ad mortem deducit ægros ; aut discutitur , aut successivè suppuratur , aut in *scirrhum* degenerat ; *abscessus* nunc per alvum , nunc per urinam , interdum per tussim expurgatur ; *singultus* est pessimum signum . (259 .)

Curatio .

Art. 269. Convenit *venæsectio* in pede , profunt *sudorifera* , & *antipleuritica* , *antihecticum* Poterii , *sperma ceti* , *nitrata* , *saturnina* , *camphorata* & circa finem *diuretica* : externè *epithemata* pe-

CAP. III. *De affectibus Capitis &c.* 109
netrancia & discutientia, postremò *suppurantia*;
rupto abscessu vulneraria & balsamica internè.

Art. 270. Omnibus inflammationibus internis
suppuratis & malè curatis supervenire solet *phthi-* Phthi-
sequi soles
sis. De *hepatitide* præ omnibus consulatur *Boer-*
haave.

INFLAMMATIO LIENIS.

Etmulleri sententia.

Art. 271. In inflammatione *Lienis* eadem ferè Inflamma-
tio Lienis,
sunt symptomata in sinistro hypochondrio, ac in
inflammatione *hepatis* in dextro; ideoque diagno-
sis, prognosis & cura ferè eadem sunt.



C A P U T III.

Sive Fasciculus Morborum tertius.

DE AFFECTIBUS CAPITIS & Nervorum in genere.

Art. 272. **C**larissimus noster Sydenhamus a quo-
dam interrogatus, quamobrem non Procep-
tium.
de morbis Capitis, æque ac de aliis, scripserat?
summa modestia ac candore respondere dicitur,
quoniam illos nondum intellexi. Et equidem agno-
scendum est scientiam nostram in hac regione val-
dè mancā ac imperfectā esse; utcunque tamen
in hunc oceanum propemodum ignotum descen-
dendum est, & a juvantium & lædentium contem-
platione, quoquomodo possumus, cursus natura
& experientia ducibus dirigendus est.

Chey.

Cheynei de natura fibra epitome .

Origo
morbo-
rum chro-
nicorum :

Art. 273. Diuturnorum morborum origines in genere sunt tres . 1^o. *Humorum lentor sive tenacitas* . 2^o. *Eorundem acor & acrimonia* . 3^o. *Deperdita aut saltem imminuta fibrarum tensio sive elasticitas* . Omnes Nervorum morbi ab infimo oscitatione nempe & pandiculatione ad usque summum , nempe apoplecticam dispositionem , varii tantum videntur gradus unius ejusdemque morbi , *debilitatis scilicet , aut relaxationis defectusque elastica facultatis partium solidarum* , quorum causæ sunt , eaque comitantur *lentor & acrimonia humorum* .

Natura
morbo-
rum Ner-
vinorum :

Art. 274. Morborum Nervinorum tria sunt genera . Primum est eorum , quorum symptoma præcipuum est *facultatis sentiendi debilitas temporaria aut perpetua , vel totalis ejusdem cessatio* , quam sequitur motus voluntarii suspensio ; hujusmodi morbi ab humorum lentorum & viscosorum copia nimia tanquam causa principali oriri videntur . Multi sunt hujus generis morbi ab usque gravi apoplexia , qua omnium simul nervorum origo comprimitur , omniumque vibratio , ne ad animæ sentientis sedem propagetur , intercipitur ; ad sensuum ingenique hebetudinem & stuporem . Huc etiam aliquatedus referenda sunt *hypochondriacorum & hystericarum deliquia & paroxysmi* . Secundum est eorum , quorum præcipuum symptoma est *motus voluntarius aut impeditus aut abolitus* ; tales sunt morbi generis paralytici , a paralyti universali usque ad segnitiem ; & inexpeditum inhabilemque artuum motum , membrorumque frigiditatem ; atque hi fibrarum & nervorum & præcipue muscularium debilitati , imbecillitati , aut tono amisso deberi videntur . Tertium denique eorum est , quorum præcipua symptomata sunt

CAP. III. *¶* nervorum in genere. iii

sunt *spasmi*, *contractiones*, & *convulsiones musculorum*: tales sunt morbi convulsivi dicti ab epilepsia, & convulsione, hypochondriacis & hystericiis paroxysmis, usque ad oscitatum, & pandiculationem: & hi in universum aciori stimulo debentur, quorum origo est falsa quædam & erodens acrimonia fluidorum, acida præterea & stimulans aura, vapor, aut obstructa perspiratio: Hæc Nervinorum morborum per genera sua distributio maximè naturalis; & latissimè patens videtur. Fibrarum infirmitati indivulsus comes adhæret, & pro ejus gradu minor majorve est omnium functionum animalium *languor & debilitas*.

Art. 275. Ex prædictis patet tres indicationes sive intentiones curativas oriri; scilicet, prima est *di-*
Indicati-
ones Cura-
tive.
luere, *attenuare*, *corumque lentorem tollere*, & *can-*
nales obstructos aperire & meabiles efficere. Secunda
 est *humorum acrimoniam tollere*, *molecularum nexus*
dissolvere & spicula frangere. Ultima denique &
 præcipua intentio est *solidis partibus tonum suum &*
vim elasticam reddere. Huic enim ultimæ intentio-
 ni assequendæ minimè allaborandum est, antequam
 duabus prioribus felicem operam tamdiu dederimus
 quamdiu id postulare videtur morbi indoles. Quam-
 diu enim humorum lentor aut acrimonia manet;
 frustra, aut si succedat, magno ægri damno fibræ
 corrugantur, & intenduntur, & profectò hoc mo-
 nitum est maximi momenti. Præmissis universali-
 bus, primæ intentioni satisfaciunt quæcunque par-
 ticularum pondere, agilitate, aut quavis proprie-
 tate, succis crassis, viscidis, lentis, incidendis,
 attenuandis & fluidis reddendis idonea inveniun-
 tur: Talia sunt *calomelas*, *æthiops mineralis*, *cin-*
ab. antimonii & nativ. antimonium diaphoreticum
bezoardicum minerale & Joviale, sal Jovis, succi an-
tiscorbutici, vina & cerevisiæ medicat. decoct. & li-
gn. &c. Inter ea primum locum tribuo *cinnab. anti-*
monii, quæ scilicet ex omnibus una ventriculo mi-
nimè

nimè molesta est, nec ita facilè torminibus intestina exerceat, aut catharsin ciet, præcipuè recens & artificiosè elaborata. Ipse ego maximas ejus vires sæpè miratus sum, cùm, nullo alio medicamento simul adhibito, laudum ejus vel minima pars communis esse posset.

Ad finem secunda intentione propositum assequendum mirabiles profectò sunt vires medicamentorum *sulphureorum*; eidem etiam proposito conducunt medicamenta *absorbentia* & *Alcalina dicta, gummosa* & *volatilia*: diligenter interim cavendum est, ne *volatilia* intempestivè nimia copia ingerantur: tunc enim humoribus haud satis dilutis, eos nimia vi agitant & ardorem febrilem excitant. In *gummosis* insignis est incidendi & attenuandi vis, *saponi* æmula; medicamentorum autem smegmaticorum vires in obstructionibus referendis, & ictero speciatim domando satis notæ sunt. Sed cùm eximia calefaciendi vi polleant, nunquam adhibenda sunt antequam humores satis diluti fuerint. Ultimæ denique intentioni, quæ est fibras laxatas constringere, remissas intendere & corrugare, sequentia accommodata sunt, *cortex Peruv. cortex Eleutherii, viscus arboreus, cinnam. calam. arom. cort. aurant. amara quæcunque, catechu, rhabarbarum torrefactum, styptica, e ferro data, aquæ chalybeatæ*; reliquis vero omnibus præstat *cortex Peruvianus*, ut à multiplici experientia per multos annos didici in omnibus laxæ fibræ morbis. *Tincturam Burgundicam* præscribere soleo.

C E P H A L A L G I A.

Celsi sententia.

Defectio morbi.

Art. 276. In Capite interdum acutus & pestifer morbus est, quem κεφαλαλγία, Græci vocant, cujus

cujus notæ sunt horror validus, Nervorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, vomitus, sic ut vox supprimatur; vel sanguinis ex naribus eurus, sic ut corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis, maximè circa tempora, vel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas; sed neque gravis, neque periculosa, per hominis ætatem est.

Art. 277. In dolore, qui acutus est, & qui su- Curatio.
pra consuetudinem intenditur, convenit *venese-*
sectio, sed nisi intolerabilis sit, supervacuum erit
venam secare; satiusque est abstinere a cibo, si
fieri potest, etiam a potione; si non potest, aquam
bibere; si postero die dolor remanet, alvum du-
cere, *sternutamenta* evocare, nihil assumere, nisi
aquam; sæpè enim dies unus aut alter totum do-
lorem hæc ratione discutit,

Vuillisi sententia.

Art. 278. Si dolor capitis inveteratus & ferè con- Prognosis.
tinuus fuerit, ut jure suspicemur eum a tumore
phlegmonode, *erysipelate*, *scirrbo*, *abscessu*, aut ver-
mibus oriri, curationis spes exigua aut nulla su-
perest. Si dolor capitis sit immanis, atque vetri-
ginem, vomitionem, aliosque affectus aut convul-
sivos aut soporosos adjunctos habuerit, frequenter
in *apoplexiam* lethalem, aut *epilepsiam*, *paraly-*
sin, *cæcitatem*, *surditatem*, &c. Quum caput
„ parte aliqua (*inquit* Lommius) aut circumcir-
„ ca dolet, si pus, vel aqua vel sanguis naribus,
„ ore, aut auribus exit, scire licet malum solvi.

Art. 279. Ad curationem hujus morbi detractio Curatio.
sanguinis e venis sedalibus *hirudinum* suctu lo-
cum habet, item *aquæ minerales cathartica*, *cre-*
mor tartari in sero lactis solutus, *vesicatoria*, *o-*
piata, *infusum Coffee*, *sol. salvia*, *rorismarini*,
&c. instar *Theæ* epotum. *Millepedes* quoque eu-

H randis

Post mor-
billos, aut
variolas.

randis Cephalalgiis pertinacibus opem sæpe egregiam præstant. Dolor capitis post morbillos aut variolas totidem horis a passu accedens, præmissis universalibus, *antiscorbuticis* & *chalybeatis* curatione.

Estmulleri sententia.

Cephalal-
gia calida.

Frigida.

Per com-
sensum.

Habitu-
lis.

Scorbuti-
ca.

Biliofa &
Pituitosa.

Curatio.

Art. 280. Cephalalgia est vel calida, prout sanguis magis fervet, tunc sensus caloris præsertim circa frontem percipitur; vel frigida, cum nihil tale occurrit, sed potius frigus sentitur, aut saltem adest gravedo capitis. Ex omni Cephalalgia per consensum frequentissima est ista, quæ fit ex *stomacho*. Cephalalgia *habitualis* inveterata est difficilis curatu, terminare solet in *vertigine*, *apoplexia*, *epilepsia*, *paralyti*, *cacitate*, *surditate*, &c. Ex omnibus dolor capitis *scorbuticus* est contumacissimus.

Art. 281. " Cephalalgia (*juxta* Dolæum) re-
" tæ dividitur in *biliosam* & *pituitosam*; in prio-
" ri casu dolor est valdè acutus cum insigni ar-
" dore; particulæ biliosæ acres vel salino-sulphu-
" reæ in sanguine abundant; ideoque adhibenda
" est *venæsectio*, leniter *purgantia*, aliæque ad tem-
" periem sanguinis alterandam, temperandamque
" facientia. In cephalalgia *pituitosa* materia pec-
" cans est crassa ac tenax, indeque dolor grava-
" tivus, adest stupor mentis, segnities; hæc spe-
" cies *cathartica* fortiora postulat; proficua sunt
" decocta *lignorum*, *salia volatilia*, *cinnabarina*,
" *cephalica*, potus herbæ *Theæ*; si malum a sto-
" macho debilitato trahat suum ortum, tunc
" conveniunt *corroborantia*, *stomachica*, *acidula*
" *spadenses*, &c. Ad Curam Cephalalgiae in gene-
" re apprimè conducit dosis *pil. cathartic. cum mer-*
" *cur. dulc.* ℞. & *laudan.* gr. j. hor. somn. & ali-
" quoties repetita, item decoctum e *lignis cum ro-*
" *rema*.

, remarin. *folia volatilia*, *cinnabarina nativ.* *sut.*
 , *cinata*, *camphorata*, *potio Theæ* [*Coffee.*]
 In contumaci capitis dolore empl. de *ranis cum*
mercurio capiti raso applicari potest.

Art. 282. *Hemicrania* (cum dolet dimidium ca- Hemi-cr
 put) est gravissima species *Cephalalgia*; præmis- nia.
 sis universalibus experimentum est singulare cata-
 plasma factum ex *rad. cucumeris asinini* vel *brion.*
cum verben. & *absynth.* &c. *Hemicranii*s deplora-
 tissimis (inquit *Turner*) laborantes *Arteriotomia*,
 [vid. Art. 323.] aliis omnibus incassum tentatis,
 feliciter liberavit; idemque ab aliis præstitum no-
 vi; pag. 365. vol. 1. Si dolor capitis sit in modum
hemicrania (inquit *Chefneau*) & parvum locum
 occupet, etiamsi adsit febris continua, nihil appli-
 catione *ranunculi* præstantius inveni; universali-
 bus præmissis, dolorem ad miraculum tollit; ad
 hunc modum utor; detersis capillis, si sit locus pi-
 losus, parti dolenti imponatur quodvis emplastr.
 adhæsivum cum foramine in medio ad amplitudi-
 nem denarii; ut in applicatione *Pyrotici* solet fie-
 ri; deinde supra foramen applicentur *folia ranun-*
culi contusa, multo succo madentia; in tenero lo-
 co & depilato duarum horarum spatio cutem aper-
 rit, in capite verd, ubi pili nascuntur, non faci-
 le aperit, sed parte in tumorem elevata dolorem
 sedat. Hoc unum advertendum, ut circa oculos
 ponatur parva quantitate propter palpebrarum &
 partium circumjacentium inflationes, quas gignit,
 stupendas, nullius tamen periculi.

Baglivii sententia.

Art. 283. Sunt qui ob nimium sensum, sive fi-
 brarum ariditatem, capitis dolore laborant; in quo
 casu, quoniam dolor solidi vitio potius quam flui-
 di oritur, ad *narcotica* libenter veniendum; nam
 tutè applicari possunt, quoniam non aliud de-

Dolor ca-
 pitis ob
 nimium
 fibrarum
 sensum.

bent efficere, quàm obtundere nimium fibrarum sensum: ter aut quater observavi dolores capitis pertinacissimos, & serè ad maniam accedentes, irritis aliis, solo pulv. de Guttes. ad ℥j. dato, feliciter sessisse,

Farrago sententiarum.

Euporism.

Art. 284. "Acerrimi dolores capitis euporismo, sanari possunt nempe *strophio* aqua frigida madido collum circumdante, & cum a nativo calore incalescit linteum pro novo permutandum, unde dolor quasi excantatus desinit, & rediens eodem stratagemate elusus fugatur; [sed temerarium est experimentum.]

Arterio-
mania.

Art. 285. In hoc malo *Parisis* nihil frequentius, quàm sectio arteriæ temporalis; aliquando chirurgus transversim secat; idque feliciter quàm ubi punctum incidit, sic enim magis coeunt divisæ arteriæ partes. *Trophimus. Serrier. M. Homberg* memorat exemplum Cephalalgiae pertinacis ac inveteratæ per combustionem accidentalem curatæ.

Remedia.

Art. 268. Camphora in spiritu quolibet cephalico, & naribus attracta Cephalalgiam sedat, *Greenfield.*

Varia;

Art. 287. Succus *hederae terrestris* naribus attractus, cephalalgiam penitus aufert, *Raii* hist. plant. videatur locus, p. 567.

In Cepha-
lalgia ha-
bituali

Art. 288. In cephalalgia habituali & pertinaci pulvis *mari syriaci* est serè specificum; dos. ℥ss. ut ab amico medico accepi,

VIGILIE NIMIÆ,
seu Pervigilium.*Inter legendum & ex Observatione.*

Art. 289. Interdum est morbus solitarius sine ^{Vigiliis} alia evidente ægritudine; ita tamen ut nonnulli ^{nimia.} istud sine molestia singulari ferant: alii vero mox languorem & appetitum prostratum inde percipiunt; ab alio morbo fere semper pendet.

Art. 290. Quod caret alterna requie durabile ^{Prognosis.} non est.

Art. 291. Melancholici maniaci & similes præ aliis, molestissima patiuntur pervigilia; ita ut quidam melancholicus per quatuordecim menses fuerit vigil & insomnis; & tales, utut per longum tempus in continuis sint vigiliis, hoc malum tamen sine insigni virium debilitate perferunt. ^{Quibus potissimum accidant.}

Art. 292. In senum Vigiliis non *anodyna* sed ^{Secum vigiliis.} *consortantia* & *aromatica*, *analeptica* ex vino dulci, &c. sunt optima.

Art. 293. Somnus naturalis est status corporis; in quo imminutus est spirituum influxus in organa externa; nempe respectu motus eorum in vigiliis; non tamen penitus abolitus est. In somno omnes secretiones, excepto sudore vel insensibili perspiratione, minuantur. Somnus moderatus ad sanitatem plurimum confert; coctiones perficiendo, & vires redintegrando. ^{Somnus quid & ejus comamoda.}

MORBI SOPOROSI.

Inter legendum & ex Observatione.

Art. 294. Comæ seu cataphora; lethargus & ^{Morbi soporosi} ~~et~~ sunt affectus soporosi secundum magis & minus potius quam essentialiter a se invicem discre-

pantes; in hoc conveniunt, quod *sudorem morbosum* inducant; fiunt ut plurimum ab una eademque causa, nimirum pituita in cerebro collecta,

Coma. *Art. 295.* Coma est somnus profundus, a quo tamen æger excitatur, & oculos aperit, & responderet, iterumque mox profundè obdormit.

Lethargus. *Art. 296.* Lethargus comati similis est, sed cum febre & delirio conjunctus; lethargici (inquit *Aurelianus*) leviter sunt excitandi suis nominibus exclamatis; etenim jugiter titillatu, vel impressione fortis ac punctationibus hoc facere, nihil aliud erit, quàm strictionem asperare ob inquietudinem vexationis; blando articulorum fricamento utendum est; linguæ asperitatem vel ariditatem *spongia infusa aqua calida* humectemus, &c.

Carus. *Art. 297.* Carus est somnus adhuc profundior sine febre, ex quo æger excitatus oculos vix aperit, & non respondet; attamen vellicatus sentit integrā manente respiratione; est proximus ad *apoplexiam* gradus.

Curatio horum affectuum. *Art. 298.* Ex his affectibus, eorum cura, qui a febre pendent, & sunt ejusdem symptomata, in capite de febribus recensetur; & reliqui, qui febre carent, tanquam leves *apoplexiæ* gradus spectari possunt. Ubi morbi soporosi aliis morbis, febribus, &c. superveniunt, non temerè secunda est *vena*, sed *purgatio* instituenda, & quidem in his casibus medicus magni nominis *D. Radcliff. resin. Jalap.* usus est exhibere successu mirabili. In caro, lethargo, aliisque soporosis morbis *acetum naribus insufflatum* plus excitat quàm spiritus quilibet volatilissimus Alkalinus.

Coma vigil. *Art. 299.* Coma vigil est, quando adest quoad externa sensuum organa somnolentia summa, quoad interna perpetuæ vigiliæ; æger clausis oculis permanet, & somnum capere videtur, attamen dormire nequit, variis imaginibus & deliramentis impeditur; raro est morbus *solitarius*, sed potius *sym-*

toma

propterea febricitantium ; signum esse solet imminētis *Phrenitidis*.

V E R T I G O.

Vuillisii sententia.

Art. 300. Vertigo est affectio, in qua objecta ^{Vertigo.} visibilia, circumrotari videntur, sentiuntque affectu perturbationem seu confusionem spirituum animalium in cerebro, ut nervos non ritè influant ; quare facultates visivæ & locomotivæ sæpè aliquatenus vacillant, ut laborantes corruant, & non raro a tenebris obfuscentur.

Art. 301. Quoad morbi hujus sedem notabile discrimen occurrit ; frequenter enim *anterioris* constituta est, & vix omnino *caduca* est, & therapiam admittit ; quandoque autem *posterioris* orta longè periculosior existit, & non raro in *apoplexiam* vel *paralysin*, aut in morbum *convulsivum* transit. ^{Prognosis.}

Art. 302. Pro Vertiginoso post alia incassum ^{Curatio singularis.} tentata hunc in modum præscripsi ; *℞. pulv. rad. pæon. mar. ℥ij. flor. ejusd. ℥j. sterc. pavonis albisc. lbß. sacchar. albisc. ℥ij. dol. circiter coch. j. bis in die superbibendo haurit, decoct. salviæ aut rorismarini, Coffee tinctura imprægnati ; vix credibile est quantum ab hoc remedio juvamen recepit, post mensem sanus evasit.*

Etmulleri sententia.

Art. 303. Vertigo a vertendo ; omnia enim in hoc affectu circumrotari videntur ; attamen non semper adest talis circumgyratio ; sufficit enim motus tremulus & undulatorius. Tres sunt gradus, 1^o. *vertigo simplex*, quando sit saltim circumgyratio subito evanescens. 2^o. *Vertigo tenebrosa* seu *scotomia*, quando oculi caligine obscurantur, aut ap-

Tres gradus hujus morbi.

pareant coram oculis varii colores. 30. *Vertigo caduca*, quando æger protinus concidat, atque hæc ad *epilepsiam* quam proximè accedit. (375.)

Eventus.

Art. 304. Dum res externæ gyrari videntur, hoc fit in oculo non in cerebro, non enim in cerebro videmus. [de *Ætiologia* hujus morbi ex tunica retinæ dimotione videatur *Bellini*] *Vertigo* gravior & diuturnior ut plurimum in senibus *apoplexiam*, in junioribus *epilepsiam* prænuntiat; modo *anteriorem*, modò *posteriorem* capitis parterem affligit; illa est curabilior, hæc periculosior.

Curatio.

Art. 305. *Vertigo* frequenter fit per *consensum* a vicio stomachi, vel primarum viarum; in hoc casu convenit *vomitium*; remedia *stomachica specifica*, *antepileptica*, &c. Pro cathartico extractum *hellebori nigri* & *mercurius dulcis*; convenit *venasectio* in plethoricis; *sternutatoria* sunt præcipuè vitanda. Præmissis ergo præmittendis, ad *stomachica* & *specifica* deveniendum est, *semen sinapi* omni manè comestum est egregium, item *aromatica*, *confectio alkerm.* *cinnab.* *antimon.* *radix pæon.* *flores lilior.* *convul.* *salvia*, *rosmarinus*, *stercus pavonis* est specificum nobile; *cinnab. nativ.* *spiritus* & *salia volat.* *succinat.* &c. laudantur.

Mayernii sententia.

Methodus
medendi.

Art. 306. Methodus medendi in vertigine hoc modo se habet; si adsit plethora, sanguis mittendus est; post *venasectionem*, (si necessaria sit) præsentibus nausea vel appetitu prostrato, vel aliis affectibus ventriculi indicibus *emeticum* propinandum est; deinde *purgatio* per sedem instituenda, & postea *specifica* exhibenda. *Calamus aromaticus* quocunque modo sumptus ad vertiginem valet, imò pro secreto habetur. Medicus quidam Germanus multos curavit pil. sequent. per plures dies exhibit. [si rectè conjecturam faciam vide locum p. 43.] 24. *sacchar. Saturni*

q. v.

*q. v. tereb. Cypr. q. f. f. pil. dosis una gr. iv. vel v. pendens. D. Glisson Cantabrigiensis medicinz professor, gravi vertigine per tres septimanas conflictatus, irritis aliis remediis, vertici raso apposuit empl. ex flor. sulph. & alb. ovorum, a quo sanatus est, ut ipse retulit D. Bate. Pyroticum vel setaceum applicetur posteriori collo; cauterium bregmati post omnia. Electuarium epileptis. Ba-
tean. elect. Peruv. epileptic. Eulleri.*

A P O P L E X I A .

Art. 307. " Apoplexia est repentina suspensio *Definitio.*
„ omnis sensationis, & privatio motus totius cor-
„ poris, excepto cordis & pectoris, quæ frequen-
„ tius motu solito fortiori ac violentiori agun-
„ tur. "

Cælii Aureliani sententia.

Art. 308. Apoplexia ita dicitur, quod tanquam *Apople-*
ex lethali percussu repentinum faciat casum. Signa *xia signa*
præfagientia aliquando nulla; interdum verò gra- *præfagien-*
vedo, vel dolor capitis, aut vertigo, aut aurium *tia.*
tinnitus, in solitos usus difficilis motus, vultus
mœstitudo, saltus membrorum, præcipuè labro-
rum, tremula locutio, oblivio mox dictorum, vul-
tus plenitudo; sed hæc symptomata sunt etiam com-
munia in epilepsiam vel maniam venturis. " Tor-
„ pores & stupores (inquit Hippocrates eoac.) præ-
„ ter consuetudinem advenientes, futuram apople-
„ xiam vel paralysem denuntiant. "

Art. 309. In paroxysmo ægri voce privantur, *paroxys-*
mente capti repente cadunt, immoti, respiratio- *mus.*
ne & pulsu tantum superstitibus, color plumbeus,
atque involuntaria illacrymatio; crescente morbo,
vultus adductio, ita ut longior nota videatur ima-

go, præcordiorum prominentia, & totius corporis frigidus torpor, pectoris stridor, & superiorum partium sudores frigidi.

Boerhaavii sententia.

Causæ
frequen-
tiores.

Art. 310. Causæ Apoplexiæ frequentiores sunt, 1^o. Polyposæ sanguinis concretiones. 2^o. Spissitudo inflammatoria cruoris. 3^o. Crassa, glutinosa, pituitosa, iners totius sanguinis natura. 4^o. Simplex plethora vasorum a quacunque causa. 5^o. Tumores intra cranium nati (quibus addi possunt sanguinis vel feri *extravasationes ex contusionibus* vel *concussionibus* vi externa impressis, & innumeræ aliæ *causæ latentes*.)

Divisio
Apoplexiæ

Art. 311. Divisio apoplexiæ in *sanguineam* & *pituitosam* est utilis, sed non perfecta divisio, quum & *serosa*, & *atrabilaria*, & *polyposa* sit, & *alia*.

Prognosis.

Art. 312. Lenis Apoplexia solvitur superveniente sudore multo calido, æquabili, urina multa, crassa; hæmorrhoidum, menium vel alvi fluxu, vel febre magna. Paulò gravior solet mutari in *paralyfin* alicujus partis musculosæ; totius lateris unius, unde *hemiplegia*; vel omnium partium infra caput; unde *paraplegia*, quæ rard curatur, semperque memoriæ, judicii, motuumque læsiones relinquit. Exquisita apoplexia in mortem citò finitur, rard septimum diem excurrentes.

Curatio
Variæ.

Art. 313. Curatio varianda est pro ratione causarum; si a causa frigida, pituitosa oriatur, conandum est statim, ut pressio lentoris glutinosi a capite avertatur per derivationes in alia & opposita loca, & per *evacuationes universales*; in utrum veniunt *vesicantia*, *caustica*, *frictiones*, *ligaturæ*, *apophlegmatismi*, *sternutatoria*, acerrimi usurpandi *stimuli* quiconque, *vomitória*, *purgantia valida*, *clysmata acuta*; ut sequens, 24. *Pul. colacynth.*

cynth. ℥ss. *fol. tabac.* ℥ss. *coq. in aq. font. q. s.*
ad ℥x. admisce sal. gem. ℥ij. f. enema. In usu ta-
 men horum omnium augetur sæpe malum mate-
 rie magis mota & impacta, viribus tamen mox
 projiciendis per evacuantia: hinc in conciliandâ
 dissolutione semper *evacuationi* & *avulsioni* stu-
 dendum, quantum res pati queat; inde regula
 (*Hippocratis*) *venesectio*, ni juvet, occidit (&
Celsi occidit vel liberat.) Si verò a causa calida
 oriatur, & morbus inflammatorius videatur, tum
 illud mittatur sanguis magna copia ex *venis ju-*
gularibus, & repetatur pro re nata, undè, si mor-
 bus sit sanabilis, levamen accipiet; diarrhœa o-
 mni arte obtineatur; *diluentia*, *attenuantia*, &
diuretica ingerantur; detineatur æger, quantum
 fieri potest, e lecto, saltem a decubitu declivi,
 De reliquis lector ipse consulat auctorem.

Etmulleri sententia.

Art. 314. Signa Apoplexiæ aliquando probabi-
 liter futuræ sunt dolor capitis, vertigo, tumor
 carotidum, memoriæ debilitas, spontaneæ oculo-
 rum illacrymationes, scotomiæ, incubus, vocis
 tarditas & hesitantia, oris distortionem, dentium
 stridores in somno, stupor frequens brachii aut pe-
 dis, aut etiam refrigeratio extrematum partium.

Hujus af-
 fectus pro-
 dromi.

Art. 315. In hoc affectu omnes functiones
 animales subito cessant, homo quasi fulmine percus-
 sus & attonitus in terram jacet, sine motu (hinc
 dicitur morbus *attonitus* & *sideratus*) respiratione
 ipsa plus minus imminuta cum vel sine stertore,
 pulsu adhuc nonnihil vegeto, & perquam duro,
 nisi in casu admodum periculoso, ubi deficit; color
 faciei & oculorum ut plurimum rubet, facies tumi-
 da; æger profunde dormit, & nequit suscitari;
 interdum resolvitur vesicæ & ani sphincter; super-
 venit tandem spuma circa os.

Paroxis-
 mus.

Art. 316.

Hemiplegia.

Art. 316. Hemiplegia seu hemiplexia est quando solummodo dimidium capitis & reliqui corporis afficitur (*more Apoplexia.*)

Apoplexiæ causæ.

Art. 317. Apoplexiæ causæ proximæ sunt vel impeditus spirituum animalium motus in cerebro, vel impeditus sanguinis circulus per cerebrum ; venus nimia potissimum in senibus ad Apoplexiam multum disponit, ut & animi affectus graviores, ira, &c. Contusiones & concussiones capitis, scabies retropulsa, vapores mercuriales, gas seu halitus carbonum.

Et morbus hæreditarius.

Art. 318. Apoplexia est morbus admodum hæreditarius ; omnes, qui Apoplexia moriuntur, suffocati intereunt, unde quo *liberior est respiratio*, eo major est spes salutis, & contra ; spuma circa os est ferè semper signum lethale.

Curatio.

Art. 319. *Barbette* in curanda Apoplexia *inunctionem mercurialem* commendat ; metus est de vomitu exhibendo, ne suffocatio acceleretur, quod non paucos medicos deterret. In Apoplexia *sanguinea* venæsectio est necessaria, in *pituitosa* omissenda, quoniam nociva est, sed potius exhibendum est *vomitorium antimoniale* ; æger non debet in lecto decumbere, sed erectus sedere ; *enemata acriora* sunt injicienda parata ex *lavendulæ, majoran. nicotian. rad. pyreth. irid. nostr. vin. benedict. sal. gem. pulp. colocynth. in petia ligat.* &c. In ipso paroxysmo non neglectis universalibus conducunt *salia volatilia* ; *sudorifera*, speciatim *aurum diaphoret.* *Poterii*, *cinnabarina*, *species diamb.* *confect.* *alkerm.* *sudorifera ex lignis* declinante paroxysmo aliquandiu continuata sunt maximè proficua.

Prophylaxis.

Art. 320. Pro præservatione, præmissis ritè universalibus præ reliquis multum laudatur frequens *salvia* usus quocunque modo ; in *cubebis*, *cardamomo*, *sem. sinap.* & *eruca* singulares latent vires maximè in senibus in forma pulv. vel aliter in

vehiculo appropriato assumptis. " Item fonta-
culi inter scapulares hodierno usu compro-
bantur. "

Colei sententia.

Art. 321. Auctor putat acerbum frigus & gelu
diutinum anno 1683. numerum *apoplecticorum* an- Causa A.
poplexiam
singularem.
nis succedentibus adauxisse.

Art. 322. Potio infusionis *rorismarini*, *salviae*,
beton. lilior. convul. &c. instar *theae*, item *Cof-*
fee, & fumisuctio *nicotianae* ad præcavendam A-
poplexiam laudantur; *balsama odorifera*, Apo-
plectica dicta, & usus *ptarmicorum* inordinatus
damnantur. Sanguinem detrahit manu maximè De larga
sanguinis
missione.
liberali ad uncias scilicet, 30. 40. 50. imò 60.
hancque praxin non modò ex propria experientia
stabilire satagit, sed etiam auctoritate celeberrimi
D. *Gibbons*, neque in junioribus tantùm,
verùm etiam in ætate provectioribus injungit;
& instantiam profert cujusdam annum 77um a-
gentis, a quo sanguinis inter 20. & 30. uncias
detraxit, & tantundem alia vice intra ejusdem
septimanæ spatium ob *vertiginem* aliqualem su-
perstitem,

Catherwoodii sententia.

Art. 323. Auctor pro virili conatur, & nul- Arteriotom-
ia.
lum non movet lapidem *arteriotomiam* introdu-
cere tanquam *phlebotomia* longè præstantiorem in
hoc morbo curando; locum designat in arteria
temporali, operationemque neque difficilem esse,
neque periculosam asserit; accuratè digitis deti-
nenda est arteria, nè subvolutet, & vulnus inflig-
endum est non punctura, sed per incisionem
cum dextra mucronis lanceolæ elevatione; detra-
cta sufficiente sanguinis quantitate, premendum
est

est vulneris orificium in os temporale cum digito maximo, quo *ibrombens*, si accidat, citò dissipabitur, & seicè momento temporis fluxus sistetur.

Qui com-
modo ad-
hibeatur
istà pra-
xis, dubi-
tatur.

Art. 324. " Verum enimverò mihi videtur au-
thor noster meras umbras consecrari, ut *Hercu-*
" *les* *Stamincus* appareat, novam crepat metho-
" dum; sed quomodo stabilitur hæc praxis? Inter
" paucas, quas adducit hoc affectu laborantium,
" historias; unicam tantùm per *arteriotomiam* cu-
" rati affert, sed de his non libet morari. Utrum-
" que verò res se habeat, minimè futurum viderar
" (ut rectè admonet D. *Freind*) ut nostri unquam
" homines huic medicinæ generi alluescant.

Farrago sententiarum.

Inter legendum & ex observatione.

Varias
mortis
causas de-
textis ana-
tomia de-
functorum.

Art. 325. In paroxismo Apoplectico intume-
scunt venæ jugulares necnon pulmonum, quæ non
rard rumpuntur in Apoplexia demortuis: In defun-
ctorum cadaveribus sæpissime repertum est *serum*
viscidum in cerebri ventriculis; aliquando *sanguis*
ingens copia in sinibus, aliquando *tumores* ad
pugni magnitudinem juxta conarium inter cere-
brum & cerebellum; talis (observante *Drelincur-*
tio) semestri spatio primò *cacitatem*, dein *surdita-*
tem, subinde sensuum omnium *abolitionem*, & po-
stremò *necem* intulit. In cerebro Apoplexia mortui
(inquit *Cheselden*) observavi universa vasa sangui-
fera plurimum distenta; ventriculos ipsamque cere-
bri substantiam lymphâ supra modum abundantes,
& duram meningem magnoperè incrassatam, &c.
Vomitoria (inquit *Dolæus*) experientia teste, quic-
quid reclamet *Sylvius*, divinam afferunt opem.
" Nullum est potentius remedium *vino emetico* in
" omni soporoso affectu, dos. ʒ β. vel ʒij. per os,
" ʒij.

„ *℞iij.* vel *iv.* in enemate. Si injecta enemata præ-
 „ ter rationem moram faciunt, sollicitanda est de-
 „ jectio acribus suppositoriis, speciatim incidatur
 „ frustulum *saponis Venet.* in formam *Glandis*. “
Venassectionem in omni *Apoplexia*; & in omni æta-
 te, & in summa quidem senectute admittimus;
 timidis, loco hujus, *hirudines* vel *cucurbitulas* con-
 cedimus.

Art. 326. *Rhodus* observavit; quod in omnibus affectibus *comatosi*, præcipuè *lethargo*, & *Apoplexia*, pulsus dum ex parvo fiebat magnus, & sensim in magnitudinem crescebat, ægrotantes brevi moriebantur; pulsus etenim in hoc affectu est ut plurimum fortis & plenus, quod multos decipit.

Pulsus fortis sæpe decipit inexpectatos.

Art. 327. *Apoplexia* demortui ante triduum non sunt sepeliendi; quia omnes humores intra illud spatium moventur, & nonnulli ante illud tempus revixisse observati sunt. *Barbette*, Linimentum sequens ut specificum in *lethargo* & *Apoplexia* habetur; *℥. ol. succin. spic. castor. ana ℥ij. flor. hyperic. succ. rut. express. ana ℥iij. m.* illinatur cervix, &c. Item summum & ferè unicum remedium in *Apoplexia* sunt *cucurbitæ* capiti impostæ. *Riverius*, *Zacutus Lusitanus*, &c. Cùm morbi vis maxima est, admoveatur *cauterium æstuale* inter primam & secundam nuchæ vertebram.

Nota bene.

Art. 328. Remedia sequentia interdum pro re nata in usum adduci possunt; *antimonium diaphoret.*, *antihæclicum Poterii*, *aurum fulminans*, *aurum Mosaicum*, *cataplasma suppedale*, *cataplasma de hæcicibus*, *claterium*, *elect. antiapopleclicum*, *emplastr. cephalicum*, *elixir. pæon.* *Mynsicht.* *enema acre*, *enema apopleclicum*, *ens veneris.* *flores salis armoniac. martiati*, *gargarisma ad pituitam*, *infusum cephalicum*, *pil. volat. sternutatoria omnia* (*flores Bezoin.* aliis *ptarmicis* adjecti illa multo efficaciora reddunt) *pulv. ad guttetam*, *tinctura epileptica*, *vinum benedictum*, &c.

Remedia varia.

HEMIPLEGIA, PARAPLEGIA, SEU
Paraplexia.*Ettmulleri sententia.*

Ratio nov. *Art. 329.* Paraplegia seu paraplexia & apoplexia particularis, in altero tantum latere hemiplegia nominantur. Interdum afficitur totum corpus, excepto capite, ex obstructione spinalis medullæ; frequentius est morbus *secundarius*, interdum verò *primarius*: sensus vel motus vel alteruterque vel totaliter, abolentur, vel multum imminuuntur.

Paraplegia ab apoplexia differt. *Art. 330.* Paraplegiæ, quæ *apoplexiam*, *epilepsiam*, aliosque morbos immediatè sequuntur, vulgò *paralysis* vocantur, sed *paralysis* est longè alius affectus, ut infra manifestum erit. (332.)

Curatio. *Art. 331.* Vomitus in omni paraplexia convenit & purgatio ad primarum viarum emundationem, *venesectio* convenit in plethoricis; proximo loco sudorifera valde conducunt, cum specificis interspersis, decoctum *sassafr.* cum *roremarino* & *bacc. juniperi*; aliquando datur *aurum fulminans* ad gr. iij. vel iv. de reliquis internis medicamentis vide *apoplexiam* & *paralysin*; balnea ex *formicis* revera singulare quid obtinent in *paraplegiis* curandis.

PARALYSIS & PARESIS.

Ettmulleri sententia.

Paralysis & Paresis. *Art. 332.* Paralysis est gravior, & paresis levior affectus; paralysis propriè est resolutio & relaxatio ligamentorum & membranarum motui inservientium, non ab obstructis nervis proveniens, sed a mera membranacearum & nervearum partium

tium resolutione, & ſic a *paraplegia* diſtinguitur, quæ ab obſtructione nervorum exoritur; hæc ſequitur *apoplexiam*, *epilepſiam*, *convulſiones*, *vertigines*, &c. qui affectus in ſe mutui ſunt permutabiles, & plerumque deſinunt in *paraplegiam*; Illa verò ſequitur alios morbos longè diverſos; viz. *ſcorbutum*; *malum hypochondriacum*, *colicam*, & frequentior eſt in regionibus ubi vino & ſpiritibus indulgent; aut oritur etiam ſubinde a cauſis externis, ex fumis metallicis, &c.

Art. 333. Paralyſis cæteris paribus faciliùs curatur quàm *paraplegia*, quæ plerumque omnem medici operam eludit; motus ſaltem amiſſus, ſuperſtite ſenſu reſtituitur; *tremor* ſupervenienſ eſt bonum ſignum recuperandi motum. “*Atrophia*,” verò aut *frigidity* peſſimè ominatur. “

*Curatio
difficilis.*

Art. 334. *Purgatio* lenis tantum inſtitui debet cum *mercurio dulci* & *extracto bellebore*, ſpecie *diaturb.* cum *rhubarbaro*, *pit. ſætid.* &c. & poſtea *sudorifera*, remedia *apoplectica*, & *epileptica*, *viperina*, *succinata*, *lumbricalia*, *ex milleped.*, & *formicis parata*, *antimonialia*, *martialia*, *bezoardica*, *aurum diaphoreticum*, *antiſcorbutica*, & *ſpecifica* in ſero lactis cocta quando a dolore *colico* ortum ducit; & externe pro abdomine illinendo *galbanetum Paracelſi*. *Galbanetum Sennerti* eſt præſtantius medicamentum. Vid. *Pharm. Baſean.* In genere *urticatio* membri reſoluti eſt maximi uſus, expertus loquor. *Thermæ naturales*, balnea ex *formicis parata*, *unguentum martiatum*, *nervinum*, *paralyticum*, &c.

Curatio.

Vuillſii ſententia.

Art. 335. Paralyſis eſt partium nervoſarum a debita diſtentione reſolutio, ſive relaxatio; cujus ratione motus & ſenſus, nempe aut alter tantum,

*Deſinitio
paralyſeos*

tum, aut simul uterque, in toto corpore, vel in quibusdam partibus, debito more exerceri nequit.

Unde provenit.

Art. 336. Mentis hebetudo, oblivio & stupiditas, frequenter in paralyfin mutantur. Paralyfis aliis affectibus frequentius supervenit, quales præcipui sunt *earus, apoplexia, scorbutus, convulsio, colica, arthritis, &c.*

Difficile curatur.

Art. 337. Paralyfis ab apoplexia, caro, convulsione, colica, aliisque cerebri, aut systematis nervosi affectibus superveniens, si non brevi tempore in melius alteretur, aut medicamentis cedat, plerumque insanabilis perstat; hominibus provectæ ætatis, caeochymicis, valde scorbuticis, aut intemperatis accidens, etsi affectus haud immanis fuerit, difficile tamen curatur.

Curatio.

Art. 338. *Phlebotomia* passim non omnibus convenit; & si hanc vetamus, non tamen obeandem cum veteribus rationem, supponendo paralyfin esse morbum frigidum; præmissis universalibus, viz. *vomitório & catharsi, cerevisia medicata* parari potest ex *salvia baton. stachad. lign. sassaf. cortic. Vvinter. &c.* Quidam paralytici sunt frigidi, alii calidiores ex constitutione, idedque remedia debent esse diversi generis, ut in iplo *scorbuto* evenire solet. Remedia in hoc affectu insigniora sunt *viperina, pulv. rad. serpent. virgin. gum. guaiac. tinct. succin. sp. C. C. succinat. pulv. ars comp. chalybeata, antiscorbutica omnia, præcipue succi antiscorbutici cum aqua raphan. aurantii, &c.* Externè *fotus, linimenta, cucurbitulae, vesicatoria, urticationes*, item immissio membri resoluti in *grana hordei* post cerevisiam subductam, vel intra *ventrem* vel *thoracem bestiae recens macerata*, aut denique *balneum artificiale vel naturale*. His non succurrentibus proveniendum erit ad remedia magna, viz. *diaphoretica, salvantia, vomitoria fortiora, &c. sudorifica* usitatoria sunt *decoctum guaiac. spiritus*
 & oleum

CAP. III.

Paralysis.

131.

℞ oleum ejusdem, mistura simplex, flores ℞
 spiritus salis armoniac. aurum diaphoreticum, sal.
 viper. bezoar. min. tinct. antimon. &c. Nullum
 datur præstantius remedium quam *thermæ nostræ*
Bathonienſes; quosdam tamen deterius reddunt.
 “ Pro pauperibus & nimis procul a *Báthonia* de-
 „ gentibus *Thermæ artificiales* ad imitationem na-
 „ turalium ad hunc modum fieri possunt: ℥.
 „ calc. viv. ℥iij. coq. paulisper. in aq. commun.
 „ cong. xx. vel xxx. pro semicupio.

Inter legendum ℞ ex observatione:

Art. 339. A spirituum inopia fit paralysis; ut Causa par-
alytica.
 in senectute valetudinaria; post immodica san-
 guinis; liquoris genitalis; &c. dispendia, è san-
 guine enim effecto pauci spiritus in cerebro pro-
 creantur.

Art. 340. Crédibile est papillas cutaneas esse tá- Papillas
cutaneas
tactus or-
ganum.
 ctus organum, idedque hic ratio reddi potest,
 cur superſtite motu sensus potest aboleri, viz.
 quia motus per nervos fit; sensus per papillas ha-
 ſce.

Art. 341. Ad membra paralytica plurimùm va- Remedi-
um ex for-
micis &
ex sem-
linap.
 lent fomentationes quotidianæ ex *formicis* & ea-
 rum *cubilibus* in aq. font. coct. interdum præſen-
 taneam opem & firmum constansque robur parti-
 bus affectis afferunt; eodem tempore usurpetur o-
 leum sequens, ℥. sem. *ſinap. parum contuſ. q.v. ſp.*
lavend. q. ſut madesiat; infunde frigidè per horas
 24. deinde oleum prælo exprimatur; cum quo inunge
 cervicis vertebraſ & ſpinam dorsi & etiam partes affe-
 ctas. Nihil potentius est in affectibus paralyticis
 (inquit *Cheſneau* experientia teſte) ad diſcutien-
 dum humorem aliquem in vertebraſ lumborum
 vel in muſculis concretum, quàm *oleum philoſo-*
phorum, ℞ *oleum terebinthina*, quod ſecundò e-
 xit poſt ſpiritum aureique eſt coloris. Si mem-

brum paralyticum extenuetur, vix aut ne vix quidem restituitur.

Vires re-
sebinthi-
ne & Chip

Art. 342. D. Harris in observationibus de morbis gravioribus asserit *terebinthinam e Chio* in hoc affectu vires planè admirandas obtinere; atque hunc in modum præscribit, *℥. tereb. e Chio ℥iij. solve in vitel. ov. immiscendo syr. de stachad. ℥j. ag, lact. alex. ℥iv. m. f. haust. singulis auroris capiend. ad quartam vicem. Addit præterea se dedisse tereb. venet. ℥vj. vel ℥j. in haust. similiter dissolut. non modò in paralyfi, verùm & in arthritide, & in rheumatism. cum optimo successu,*

Paralyfis
Laryngis.

Art. 343. Larynx, spharynx, & gula quandoque Paralyfin patiuntur. Paralyfis laryngis prohibet deglutitionem liquidorum, non verò solidorum, quoniam epiglottis non perfectè claudet rimulam laryngis. Paralyfis pharyngis prohibet deglutitionem solidorum, non verò liquidorum. Paralyfis gulæ omnimodam deglutitionem tollit. Interdum deglutitio læditur ex contractura spasmodica gulæ, quod hypochondriacis & scorbuticis est familiare.

Curatio,

Art. 344. Epispastica sunt applicanda; antispasmodica & antiparalytica internè & externè usurpanda sunt; gargarismata & linctus in loquela amissa convenientia hîc locum habent; speciatim *succus salivæ cum nuc. moscat. castoreo* frequenter & diu in ore detentus. "Cataplasmate sequent, in praxi nostra quandoque usus sum; *℥. pulp. raparum coct. ℥iv. herb. rus. contus. m. ij. sem. sinap. ℥j. pulp. alb. grec. euphorb. ℥ij. sulph. viv. ℥iij. ol. succin. gr. 100. ung. nervin. q. s. m. f. cataplasma gulæ applicandum.*

Paralyfis
linguæ.

Art. 345. In paralyfi linguæ solus succus *salviæ* obmutescentiam solvit; sequente gargarismate felici cum successu in praxi aliquando usus sum; *℥. Fol. salviæ rorismarin. ana m. j. hyssop. pulg. ana m. ℥. sem. stat. hid. agr. sinap. ana ℥ss. coq.*

coq. in q. f. aq. font. ab ℥ij. Colaturæ add. *sultæ*
salvia depurat. ℥ij. *oxymel. scillit. aq. regin. Hun-*
gar. ana ℥j. *syr. stachad.* ℥iij. m. tenëat coch. ij.
 in ore aliquandiu & deinde expuat, idque fiat fre-
 quenter in die.

Farrago sententiarum.

Art. 346. Solent, qui per omnia membra reso- Celsi ob-
servantia.
 luti sunt, celeriter rapi; at si correpti non sunt,
 diutius quidem vivunt, sed raro tamen ad sanitä-
 tem perveniunt, & plerumque miserum spiritum
 trahunt, memoria quoque amissa. *Celsus.*

Art. 347. Cura hujus mali a curatione *luis ve-* Curanda
est, ut
lues venä-
rea.
neræ non abludit multum, adeoque *mercurialia*,
sudorifera, *decoct. e lign. &c.* profunt. Externe
inunctiones, *spirituosa & penetrantia* non in par-
 te affecta, sed spina dorli; ut *unguentum nervi-*
num, *martiatum*, *ol. tereb. sal. volat. &c.* Item
 maximo cum emolumento sequens emplastrum spi-
 næ dorli admoveatur; ℥. *Empl. de ranis cum qua-*
druplo mercurio ℥j. *camphor.* ℥ß. malaxetur cum
ol. succin. & fiat emplastr. *Vvaldschmid.*

Art. 348. Tinctura antiepileptica *Pitcarnii*, in Tinctura
Pitcarnii.
 cap. de *epilepsia* (385.) tradita purgantibus orba
 ab authore laudatur.

Art. 349. Virtutes & usus remedium sequen- Remedia
alia varia
 tium lector ipse expendat: *Cataplasma de rapis*,
cinnabaris antimonii, *emplastrum de pyrethro*,
enema apoplectic. *enema terebinth.* *fotus spirituo-*
sus, *galbanetum Scnneri*, *gutta Goddardiana*,
infusum cephalicum, *linimentum paralyticum*, *o-*
leum lumbricorum (per distillationem mira præ-
 stat) *pulvis ad gutteturam*, *spiritus sanguinis*, *suc-*
ci scorbutici, *tinctura cantharidum*, *tinctura epi-*
leptica, *unguentum ad atrophiam*, *unguentum*
salino-volatile.

C A T A L E P S I S.

Cataplexis *Art. 350.* Cataplexis seu catoche, Latinis & Arabibus congelatio dicta, est affectus in quo ægri manent rigidi in eodem statu, quo pressi fuerunt: interdum tamen nonnihil audiunt, vident, recordantur, & post narrant; si quid ori ingeratur deglutiunt, impulsu incedunt. Milites in obsidione Metensi hastam in manibus tenuerunt, equites turmam sequebantur, non minus quam non congelati. Est morbus raro occurrens at satis acutus, intra 3. aut 4. ad summum dies jugulans; quandoque fit metastasis in *epilepsiam*, *apoplexiam*, vel *melancholiam*: in genere paucissimi restituuntur; nemo liberatur, cui secundò catochus supervenit.

Raro occurrit & rarissime curatur.

Etmulleri sententia.

Morbi descriptio. *Art. 351.* Cataplexis seu catoche, est affectus rarissimus, & summè mirabilis; in quo cessat omnis sensus internus, & externus, & motus, ita ut ægrorum membra rigida sint, & instar statuarum in sua positura; impulsa tamen moventur, sed tamen denuò in ista per motum acquisita figura fixa permanent. Vulgò pro *ecstasis* habentur. "In hoc affectu (inquit *Doleus*) alvi ac urinx fit suppressio; respiratio tamen integra & illæsa manet, & sanguinis circulatio: ægri verò immoti manent, instar *Marpessie cantis*."

Curatio. *Art. 352.* "Quoad curam, in genere ab omnibus practicis tam veteribus quam neotericis, hunc morbum ejusdem farinx medicamentis, quibus *apoplexiam* curari lectori patebit; unde jure merito *apoplexia inversa* nuncupatur. Remedia omnia prosunt, quæ viscidum quodcunque incidere vel attenuare, & pro ratione oc-

,, casio.

CAP. III. *Stupor seu torpor, &c.* 135
 „ casionis evacuare valent; excellunt *salia volati-*
 „ *lia*; conveniunt vomitoria *antimonialia*, *epispa-*
 „ *stica*, *antispassmodica*, *antiparalytica*; &c.

Boerhaavii sententia.

Art. 353. Hujus morbi causa proxima est im- Causa
proxima.
 mobilitas sensorii communis, prout primo mo-
 mento insultus se habebat. Ergo sanguinis cere-
 brosi, glandularum cerebri, emissariorum ejus ab-
 soluta est quies, ut in initio. Omnes quidem in
 eo morbo functiones cerebri læduntur, & illæ,
 quæ inde pendent; soli muscoli sic manent tensi,
 ut in initio erant; cæterum respiratio & pulsus
 supersunt, at plerumque leves. Dissecta cadavera
 demonstraverunt arterias venasque cerebri valde
 turgentes fortiter impacto denso cruore; in morte
 plerumque finitur.

Art. 354. Solvitur interdum *larga narium hæ-* Curatio:
morrhagia; ideoque curatio tentatur hæmorrhagiæ
 ex naribus prolectu hæmorrhoidalis, menstruivæ
 fluxus prolectu; sternutatoriis, vomitivis; vesica-
 toriis; fonticulis (interscapularibus); setaceis;
 victu humectante.

S T U P O R S E U T O R P O R ,
 & obdormitio membrorum.

Art. 355. “ Stupor vel torpor in genere est Stupor seu
Torpor.
 „ sensus tactus vel motus, vel utriusque imbecil-
 „ litas, quæ quidem plerumque est aliqualis pa-
 „ ralytis scorbutica inchoata; saltem istius morbi
 „ plerumque est prodromus. Si plura simul oc-
 „ cupet membra *hemiplegiam* aut *apoplexiam* mi-
 „ natur. Stupor in facie *torturam oris* porten-
 „ dit.

Art. 356. “ Huc quoque pertinet affectus a qui- Obdormi-
tio.
 „ busdam *obdormitio* membri unius, vel plurium

„ vocatus . Hæc obdormitio videtur esse affectus
 „ ex torpore & dolore aliquali simul mixtus ,
 „ qualis causa externa plerumque excitatur ,
 „ compressione scilicet membri vel nervorum in
 „ eo , unde influxus spirituum animalium inhi-
 „ tur , qui postea laxatis nervis copiosè & subito
 „ in illud recurrunt , & subitam alterationem fa-
 „ ciunt , quam dolor ille vel molestia sequitur .

Historia
 singularis.

Art. 357. “ Novi quendam ferè sexagenarium,
 „ qui colicâ nervosa diuturna laborasset , nimirum
 „ triginta plus minus annos per menses aliquot
 „ illum quotannis affligente , in hunc affectum
 „ tandem incidentem silente ferè colica aut sal-
 „ tem leviter ac impotenter dolente , nempe in
 „ stuporem , & torporem & obdormitionem bra-
 „ chiorum & crurum , præcipuèque manuum &
 „ tarforum , & musculorum ocularium . Huic im-
 „ peravi rhabarb. ℥j. vel ℥ss. alternis vel tertiis
 „ diebus hora aliqua antemeridiana masticare ;
 „ opobalsami purissim. gr. xx. vel xxx. in sacchar.
 „ crystall. instillat. semel vel bis in die deglutire ,
 „ cerevisiam & spiritus arduentes omnimodis pror-
 „ sus interdixi . Porro bis tantum in die victum
 „ capere consului ; jentaculum scilicet & cœnam
 „ idque ad intervallum novem ad minimum hora-
 „ rum omisso prandio ; Aquam Spadensem inter
 „ cœnandum ad sitim potare loco cerevisiæ tenuis,
 „ vel aq. commun. atque ex hac methodo , dum
 „ hæc scribo , melius se habere videtur . Vires
 „ Pissellai Indici nondum expertus est .

T R E M O R.

Estmulleri sententia.

Art. 358. Tremor est malum morbis *convulsivis* Tremor.
vis affine, in quo cum motu naturali & voluntario simul aliquid *convulsivi* concurrebat; est affectus seipsum oculis prodens. Tremor supervenit animi passionibus gravioribus, speciatim, iracundiæ, & crapulæ, sed hic est *accidentalis* & *transitorius*; metalli fossores & metalli fabri subinde tremunt; nimia Venus ad tremorem disponit; senio confecti serè semper tremore plus minùs afficiuntur.

Art. 359. Tremor interdum periculosus est quòd Prognosis
nam facile degenerat in alios graviore affectus nervinos, in *paralysin*, *apoplexiam*, *lethargum*, *spasmus*, &c. in senibus est incurabilis. Tremor qui supervenit mulieribus post partum ex retentis quibuscunque in utero est periculosus affectus; subinde enim *epilepsias* lethales infert.

Art. 360. Tremori succurrunt omnia ea, quæ in *paralyticis*, *apoplecticis* & *convulsivis* morbis conveniunt, & quæ *nervina* dicuntur privatim *cerevilia salviata*, proximo loco *stachas Arabica*, & *rosmarin. melissa*, *majorana*, *radix*, & *semen pæon. bacc. juniperi. rob. ejusdem*, decoctum & lignis, aromata, *castoreum*, *stercus pavonis*, *cinnabarini*, &c. Quoad externa eadem sunt ac in *convulsione tonica*, quibus addi potest usus *thermarum* (*psychrolusia.*)

C O N V U L S I O.

Art. 361. Convulsio sive contractura est *ner-* Convulsio
ejusque
divisio.
vorum musculorumque versus suam originem, involuntaria & perpetua retractio, & ita distinguitur

tur a *motibus convulsivis*, qui suas habent inter-
polationes: Estque vel *universalis*, *tetanus* dictus,
qui dividitur in *emprosthotonum* & *opisthotonum*;
vel *particularis*, quæ membrum quoddam vel ar-
ticulum privatim respicit, hujus speciei est *spas-
mus cynicus*.

Schmirzii sententia.

Spasmus
cynicus.

Tortura
oris.

Curatio:

Art. 362. Spasmus cynicus, qui est distortio u-
trumque latus oris oblidens [sin verò alterutrum
tantum latus convellatur, *tortura oris* dicitur.
Ettmuller.] a rictus canum ira percitorum & ad
mordendum sese comparantium similitudinem ap-
pellatur. Ex se turpe est malum & difficile cura-
tu, exitialium morborum, ut *apoplexia*, aut *epi-
lepsia*, non raro est prodromus. *Ligatura*, qua,
tanquam capistro, facies ad figuram naturalem re-
ducatur. Medicamenta *antiparalytica* & *antispas-
modica* sunt usurpanda. " Pro homine quodam
,, octogenario sequens linimentum præscripsi, non
,, neglectis interim appropriatis internis, quorum
,, nunc oblitus sum; & præter spem omnem cu-
,, ratus est. *℞. sapon. Venet. ℥ij. camphor. ℥ij. ol.
,, mac. per express. aq. regin. Hungar. ana ℥ss. sp.
,, sal. armoniac. gr. xxx. ol. junip. gr. xl. ol. castor.
,, ℥ss. misce.* "

Cælii Aureliani sententia.

Aureliani
descriptio.

Art. 363. Interdum buccas adducit in postero-
rem partem tanquam ridentibus; nunc palpebras
& nares collum etiam atque humores rapit, &
ita patientes facit commoveri tanquam onus hu-
meris bajulantes transferendi ponderis causa (sed
hæc species videtur esse *emprosthotonus*.)

Alium

Aliundè.

Art. 364. " In huiusmodi spasms particularibus Curatio
 „ post *evacuationes* (si indicentur) factas , exhi-
 „ benda sunt remedia *antiscorbutica* , & *antispas-*
 „ *modica* ; Inter hæc eminent expressiones *mille-*
 „ *pedum* , *castoreum* , *elixir pæonia* & *decoctum*
 „ *guaiaci* , & ultimò ad *topica* deveniendum est ;
 „ pars affecta , in artuum *contracturis* , si fieri pos-
 „ sit , in *intima bovis* aut *vervecis* recens cæsi im-
 „ mittatur , & ibi tamdiu detineatur , quamdiu
 „ animal calet ; commendantur balnea præcipuè
 „ *sulphurea* , & *balsamum galbani terebinthinæ* ,
 „ a Sennerto ,

Ettmulleri sententia.

Art. 365. Convulsio *tonica* est convulsio propriè Convulsio
tonica.
 dicta , viz. quando pars convulsa rigida manet ,
 ac metus est nè omninò contracta permaneat . In
India orientali epidemicum malum est varii ge-
 neris convulsio , de quo eleganter scribit Bontius .

Art. 366. Inter universalia *clysmata* sunt valde Curatio.
 proficua ; remedia interna sunt *carminativa* , *ce-*
phalica , *antiepilectica* , in pertinaciori malo de-
 coctum *e lignis* ; Externè *linimenta spirituoſa* &
penetrantia , speciatim *lumbrici vivi* applicati ,
ol. & *sp. lumbricorum camphorat.* *ol. succin.* cum
petrol. galbancrum Paracelsi cum *ol. euphorb.* *ol. te-*
rebinth.

Aliundè.

Art. 367. Spasmi sive motus convulsivi sunt Spasmi si-
ve motus
convulsi-
vi.
 contractiones musculorum non constantes , sed
 cum interjecta aliqua quiete alternatim cessan-
 tes & celeriter redeuntes ab involuntario & irre-
 gula-

gulari spirituum animalium influxu. Tales cernuntur in *epilepsia*, in *passionibus hystericis* & *hypochondriacis*, aliquando in *scorbuto*, in *febris malignis* malè judicatis, in *capitis vulneribus* & *contusionibus* *gravioribus*, &c. sed hi affectus seorsim tractantur. Motus convulsivi sive spasmi ab atroxia spirituum in summitatibus vel originibus nervorum inordinatè descendentium oriuntur. *Tensio convulsiva* solidarum partium est una ex primariis causis, quæ *aquilbrium* destruunt inter solidas & fluidas. Jour. des Scav.

Unde lethales.

Art. 368. Lethalis evadit convulsio ex eo solum, quod suffocationem inducat convulsis musculis respirationi dicatis.

S I N G U L T U S.

Etmulleri sententia.

Singultus: Art. 369. Singultus est motus diaphragmatis convulsivus. *Sternutatio* singultui superveniens illum solvit, quoniam est motus spasmodicus ei contrarius. Interdum est malum diuturnum per plures dies, menses, annos, affligens; aliquando penitus incurabilis, in quo casu occultum quoddam conformationis vitium, os ventriculi aut diaphragma, aut nervos afficiens, ferè subesse solet.

Cura:

Art. 370. Quoad curam (est morbus primarius vel secundarius, si posterior habenda est ratio morbi a quo pendet, in genere *antispaasmodica* & *stomachica* sunt adhibenda) *Laudanum cum cardiacis*, *zinzib. condit. stomachica*, *carminativa*, præmisso vomitorio, vel purgatione cum *calomel.* &c. Externè cataplasma ad singultum *Mynsicht*, quod componitur ex fermento acris cum pulv. ment. & aliis aromat. cum ol. castor. &c. malaxat. Quidam cum spongia aut pane calido applicant ventriculo fori humidum factum ex aceto cum castorea, pipe.

pipere & *sinapi cocto*. Internè pelliculæ internæ *ventriculi gallinæ exsiccatæ & pulverisatæ*. Ubi *pertinacior perdurat* [in morbo *primario*] ad *septimanas aliquot* in corpore robusto semper *provocandus est vomitus*.

Art. 371. Virgo hoc morbo laborans per longum tempus post permulta remedia incassum tentata, solo *spiritu æruginis* ab empirico exhibitio curata fuit. *Bonetus*.

Spiritus æruginis.

Remedia varia.

Art. 372. Eruditus medicus usum remediorum sequentium probè calleat, *aurum Mosaicum*, *cataplasma stomachi*, *sotus spirituosus*, *sotus stomachicus*. Et præ reliquis *julap. moscatum*, quo nondum hætenus novi præstantius remedium [inquit *Fuller.*] aliquando enim divinitus succurrit, & singultum superat. Hanc veritatem testatur praxis nostra. *Diascordium* larga dosi ad *ʒij.* in febribus, *Sydenham.* [imò ad *ʒiij.* dari potest.]

S T E R N U T A T I O.

Art. 373. Sternutatio est motus convulsivus musculorum expirationi inservientium & diaphragmatis; nobis invitis accidit plerumque ex acrimonia humoris e glandulis narium sponte erumpere; vel *ptarmicis* excitatur; imò aliquando ab aere frigido vel radiis solaribus.

Sternutatio.

Art. 374. Sternutatio nimia est morbus de genere *convulsivorum*; ideoque in genere eandem curam postulat; *lenientia* & *mucilaginoso* naribus attractenda sunt; eadem ferè curam admittit, ac singultus. [370.]

Cura.

EPILEPSIA.

Etmulleri sententia.

Epilepsia. *Art. 375.* Paroxyismi epileptici sunt motus convulsivi, in quibus universum corpus, aut plura membra diversimodè contrahuntur; vibrantur, aut agitantur. Tres sunt gradus hujus affectus; primus parum differt a tertio gradu *vertiginis* (303.)

Tres sunt
gradus.

In secundo gradu adsunt agitationes & gestulationes variae, sensibus externis ac internis perstantibus, aut in delirium abreptis, saltant, canunt; rident; flent, ridicula narrant; vociferant, pectora percutiunt, post paroxysmum interdum omnium recordantur; interdum nihil sciunt. In tertio gradu omnis tam sensus, quàm rationis usus perit, ad humum prosteruntur, dentibus strident, corpus insigniter attollunt, spuma per os ejicitur, labia & linguam mordent, &c. quibus remittentibus ægri tanquam sopore oppressi jacent, ad se redeuntēs nihil horum sciunt, tantum de torpore, & gravedine quadam capitis; & artuum lassitudine conqueruntur; qui secundo gradu laborant, vulgè *pro obsessis a demone* habentur.

Prognosis. *Art. 376.* Imprimis *lunæ motibus* auscultat epilepsia; maximè ea quæ est *per essentiam*. Epilepsia *habitualis* interdum sine periculo vitæ ad plures annos durat; utut sæpius recurrens ægros plus minus paralyticos, delirantes, aut stupidos reddat. In junioribus aliquando circa pubertatem terminatur; post 25^{um} annum superveniens serè usque ad mortem durat, teste *Hippocrate*, sed hoc non est omninò verum. In junioribus spes est circa pubertatis tempus.

Curatio. *Art. 377.* Cura iuchoanda est cum vomitorio, maximè si morbus sit *per consensum*, *mercurius dulcis* permiscendus est cum purgantibus, quæ etiam

etiam debent esse mitiora ; laudantur *absorbentia*, *martialia*, *acidule*, *decoct. e lignis*, *fonticuli* ; si *venesectio* celebretur, sit in talo. Inter specifica *antiepileptica* numerantur sequentia, *Radix pæon. mar. flor. lilior. convul. tilie, sem. rutæ, viscus quercinum* ; vel potius *corylinum*, *lignum buxi*, *sp. ceras. nigr. aq. epileptic. Langii sp. sang. human. secundin. human. cranium humanum*, *dens hippopotami*, *castoreum* ; *stercus pavonis*, *camphora*, *sal. & ol. succini*.

Art. 378. Ad excitandum ægrum e paroxysmo infletur *sumus nicotianæ* (vel *avium pennarum*) in faucibus ; suffitus *succini* etiam multum confert ; conveniunt *ligaturæ* communicationem spasmodicam inhibentes, si, scilicet, ab extremitatibus *convulsiones* inchoentur.

Quid agendum a paroxysmo

Vuillisi sententia.

Art. 379. Insultus epilepticus universalis ac immanior tantum *convulsio* esse videtur, cujus accessio ut plurimum ex improvise aggreditur, ægroque nihil tale cogitantes opprimit, atque istu oculi citius, sensu & intellectu orbos, in terram præcipitat; quippe non tam cadunt, quam cum impetu quodam prosternuntur ; prostratis supervenit stridor dentium cum spuma oris, sæpè etiam capitis concussio ; brachia & crura, necnon cervix & dorsum, aut statim rigida fiunt, aut variis flexionibus distorquentur ; plerisque præcordia & hypochondria & venter intumescunt, post aliquod tempus ad se redeunt, superstite dolore capitis & hebetudine.

Paroxysmi descriptio.

Art. 380. Est morbus curationis difficillimæ, aliquando tamen medicamentorum ope profligatur, aliquando sua sponte terminatur, viz. circa pubertatis tempus, aliter in mortem definit, vel in alium morbum commutatur, scilicet, *paralyin*,

Curatio.

lysin, *stupidatem*, aut *melancholiam* [incurabilia.] *Alphonsus Ferrius* plurimos epilepticos simplici *guaiac.* decocto bis in die ad ℥vj. vel viij. præscripto ejusque decocto secundo vice potus ordinarii (prout in *lue venerea* assolet) assumpto securasse affirmat : si tali decocto *radix pæon. aliaque specifica* addita fuerint, forsitan efficacius esset semedium.

Chesnevii sententia.

Nota bene.

Art. 381. Quod palpitatio est cordi, talis omnino est Epilepsia cerebro; nam cum in eisdem usus habeat utrumque principium suam *systolem* & *diastolem*, harum ratione, ambo ab iisdem causis, simili symptomata affici par est. Ideo Epilepsia, si ve tanquam morbus si ve tanquam symptoma spectetur, dicenda est cerebri, aut alterius cujusque partis alteratio, quæ apta nata sit gignendæ materiæ, ichoris, aut vaporis simili, qualitatibus cerebro proprietate specifica insensibilis, cujus ocurso totum concutitur motu *palpitationis* simili cum læsione functionum, nervola in consensum trahens, quæ suo modo etiam *palpitant* (quemadmodum *arterie palpitante corde*) quosque cerebrum noxia excusserit.

Coercitio membrorum.

Art. 382. Non possum probare, quod omnes ferè consulunt, *membra scilicet coercenda esse tempore paroxysmi*, existimantes ex illa convulsivi motus cohibitione levare musculos; sed tantum abest: cum enim cohibitio hæc sit violenta, impediaturque musculi contractionem ad terminum suum pervenire: quod longius est ab illo ed major fit fibrarum musculi contentio.

Barbetti sententia.

Art. 383. Si Epilepsia oriatur ex cerebri *idiopathia*, semper adest gravitas, & atrox dolor capitis, item sensuum debilitas, stupor, faciei pallor, & insomnia turbulenta; si ex *sympathia* ventriculi, ii in præcordiis & circa orificium ventriculi dolorem, corrosionem vel distentionem sentiunt, præsertim jejuni, & difficillimè inediam tolerant; paroxysmum semper antecedunt nausea, dolor, & palpitatio cordis animique deliquium; solvitur autem paroxysmus cum vomitu biliosorum aut pituitosorum acidorumve humorum: Si ex *utero*, circa lumbos & pubem dolores, & simul capitis acerbi cruciatus percipiuntur.

Ratio habenda est
causæ unde
de oria-
tur.

Art. 341. In hoc morbo curando omnibus ferè *Curatio.*
antecellunt *flores salis armoniaci* & *ejusdem spiritus*, qui est valde volatilis & penetrantissimus, item prodest *cinnab. nativ.* præmissis universalibus, haustus sequens bis in die exhibitus puellam ab hoc malo liberavit; *℞. Sapon. Hispan. albiss. ʒʒ. coque ex lact. vaccin. ʒiij. bibatur tepidè.*

Pitcarnii sententia.

Art. 385. In Epilepsia vel paralyti post vomitum repetitum & vesicantia, detur tinctura antiepileptica sequens (junioribus verò exhiberi debet *mercurius* & juscum eum *lumbricis terrestribus*) *℞. Rad. valerian. sylv. dictamn. alb. ana ʒvj. castor. sterc. columb. ana ʒʒ. visc. quercin. ʒvj. cinnam. sumit. rorismarin. ana ʒʒ. fol. sen. ʒij. jalap. turpeth. ana ʒʒ. Infunde frigidè per dies x. in vin. alb. Gallic. ʒviiij. colaturæ add. pulv. cran. humani unguis ana ʒij. sacchar. ʒiv. cui immisce ritè ol. succin. Div. & spir. castor. ʒij. dos. ʒiv. Expedit hanc tincturam pur-*
K gan-

Pitcarnii
tinctura.

gantibus orbam exhibere in paralyticis declinante morbo ; expedit etiam ægros, post membra affecta ad ignem liberaliter & strenuè perfricta ; aquis frigidis immergere.

Harrisii sententia.

Pulvis specificus. Art. 386. *℥. Lumbric. terrest. preparat. ℥j. cran. human. preparat. ℥ij. cardamom. min. ℥ij. m. f. pulv. in chart. xij. distribuend. sumebat Epileptica unam bis in die in coch. julap. cephalic. sequent. superbibebatque ejusdem coch. iij. ℥. Aq. ceras. nigror. flor. tilia ana ℥ss. pæon. comp. ℥ij. tinctur. castor. ℥ij. syr. pæon. comp. ℥ij. m. f. julap. sed quia tantum pulveris nauseabundi quantitatem ventriculus fastidiebat, pauld post sing. doses elix. propriet. dulc. gutt. xxx. sacchar. tantillo instillat. insuper mox deglutiebat : atque hac methodo curata est puella Epileptica postquam plurima alia in cassum tentata.*

Farrago sententiarum.

Art. 387. Epilepticus, remediis aliis minus proficientibus, *super mare naviget ad nauseam & vomitum excitandum*, idque aliquoties repetat : & deinde deambulet, horis tribus quatuorve, quotidie, per integram septimanam, vel diutius, in sulco immediatè post aratrum humum versans, in agello annis aliquot feriato. Dicet aliquis authorem pro certo insomniis ludificari ; quanquam hoc credat, experiri licet, nec fortasse facti poeniteat.

Art. 388. Ultra omnia ad morbum caducum curandum, & penitus eradicandum valet *dieta lactea* ab aliis quibuscunque obsoniis & potulentis omnino abstinentibus ; ut ex insigni historia Medici, Noviomagi non multò pridem degentis, isto modo

modo curati docemur . Vid. *Cheynei* Tractat. de Arthritide , p. 103. &c.

Art. 389. Causa proxima omnis Epilepsiæ exquisitæ semper est nimia cerebri in nervos motores, nulla in sentientes actio . *Boerhaave* : *Melancholici* fiunt aliquando Epileptici & contrâ .

Epilepsia (inquit *Hippocrates*) *pituitosis* quidem contingit ; minimè vero *biliosis* . Crato *cinnabarim nativam* tanquam Epilepsiæ magnetem com-

Remedia
varia .

mendat ; hoc modo exhibitam ; *℞. Cinnab. nativ. opt. subtilissimè trit. ʒß. coral. rub. præparat. margar. præpar. ana ʒij. croc. opt. ʒj. sol. auri N. xv. f. pulv. subtilissimus ; dos. ʒj. cum julap. cephalic. succus rutæ* multum laudatur ad epilepsiam : ideoque ejusdem *extractum* iisdem pollet viribus , & commodius sumi potest . Electuarium Peruvianum Epilepticum *Fulleri* est præstantissimum & certissimum Anti-epilepticum , uti experientia me docuit (inquit *Fuller.*) Post debitas *evacuationes* adultis dosis sit ʒj. manè & vespèris per 3. vel 4. menses & postea per triduum vel quatrimum ante novilunium & plenilunium . Morbos Epilepticos , hystericos ; & choream sancti Viti penitus eradicat . In morbis hujusmodi convulsivis ægrotis prædictum electuarium frequenter exhibui &

Alia me.
dicamen-
ta .

[libenter agnosco] rardè frustrata fuit spes mea . Eximiæ vires *radicis valerianæ sylvestris* a Fabio Columna prædicatæ , & a Riverio memoratæ ; experientia M. Marchant denudè confirmatæ sunt : *Memoir. de l'Acad. Vol. x. p. 430.* Cortex *Peruvianus* (inquit *Colebath.* in Dissertatione de Viscis) non certius febri intermittenti , quàm viscus arboreus Epilepsiæ , choreæ Sancti Viti , & morbis universis convulsivis , etiam asthmati convulsivo [& si hæc , tussis convulsivæ] medetur . Dosis in substantia adultis ad ʒß. vel ultra forma boli sexta quaque hora superbibendo haust. infus. furtis ejusdem plantæ . Si singulis unciis pulveris

Viscus
Arboreus .

vilci addatur drachma *asæ fatidæ*, medicamen-
tum efficacius evadet. " Operæ pretium esset pro-
cul dubio, vires *humoris mucilaginosi baccarum*
in his affectibus tentare: Valde enim probabi-
le est vim eandem, si non superiorem eo inef-
se; & forsân esset medicamentum minus nau-
seabundum. " Præter jam dicta medicamenta
sequentia etiâ quandoque præscribentis intentio-
ni quadrare possunt, viz. *aurum fulminans*, *au-
rum Mosaic. pulvis ad gutteturam*, *sp. C. C. succinat.*
elect. cephalic. elect. epileptic. tinclur. epileptic. &
*insusum cephalic. Fulleri. Elect. epileptic. & emul-
sio pæon. Batean. &c.*

CHOREA SANCTI VITI.

Chorea *Art. 390.* Chorea sancti Viti a sacello sancti Vi-
S. Viti. ti nomen accipit, quo loco verno tempore juve-
nes utriusque sexus saltandi gratia convenire sole-
bant & saltare more enthusiastico; atque ibidem
interdum hoc morbo correpti erant.

Sydenhami sententia.

Ejusdem *Art. 391.* Chorea sancti Viti est *convulsionis*
descriptio. quædam species; pueros puellasve a decimo æta-
tis anno ad pubertatem invadit, prodit se claudi-
catione, vel instabilitate alterutrius eruris, quod
æger post se trahit faruorum more; manum ejus-
dem lateris, vel pectori vel alii alicui parti appli-
catam nequit continere in eodem situ horæ mo-
mento, sed in alium situm & locum convulsione
distorquebitur, quicquid æger contra nitatur. An-
tequam poculum ad os possit adducere, mille ge-
sticulationes, circulatorum instar, exhibebit: non
enim recta linea ori admovet, sed deducta a
spasmo manu, huc illuc aliquamdiu versat, donec
tandem fortè fortuna labris propiùs apponens li-
quorem

quorem de repente in os injicit, & avidè haurit, dedita tanquam opera, ut spectantibus risum moveret.

Art. 392. Ad curam ritè instituendam vena est ^{Cusa.} secunda, & postridie exhibe portionem purgativam communem, & vesperti haust. paregoric. postea sanguis iterum extrahatur, & ad catharsin, uti prius, æger revertatur, & ad tertiam, quartamve vicem si vires setant! diebus purgatione vacuis sequentia exhibeantur; ℞. *Conserv. absynth. Rom. flaved. aurant. ana* ℥j. *anthos* ℥ss. *theriac. Androm. vet. nuc. moscat. condit. ana* ℥iij. *zinzib. condit.* ℥j. *syr. e succo citr. q. s. f. elect.* de quo capiat quant. NM. manè & hora 5. pomerid. superbibendo vin. sequent. coeh. v. ℞. *rad. pæon. enul. campan. imperator. angelic. ana* ℥j. *fol. rut. salv. beton. chamædr. marrhub. alb. summit. centaur. min. ana m. j. base. junip.* ℥vj. *cort. aurant. ij.* infunde frigide in vin. canarin. ℔vj. coletur usus tempore. ℞. *Aq. rut. ℥iv. epileptic. Langii, brion. comp. ana* ℥j. *syr. pæon.* ℥vj. m. f. julap. cap. coeh. iv. sing. nocte hora decubitus instillando spiritus C. G. gt. viij. applicetur plantis pedum emplast. e caranna.

Art. 393. Ob recidivæ metum perturbenda est vena, & purgandus æger aliquoties ea ipsa anni sequentis tempestate (vel paulò ante) qua morbus invasit. Ad recidivam præcavendam.

Art. 394. " Ipse vidi puellas duas hoc morbo Curatio singularis
 „ affectas diutius saltitantes, tanquam lyra agi-
 „ tatas, cum mentis quadam alienatione pro tem-
 „ pore; has curavi eum *expressione millepedum* &
 „ *cortice Peruviano*, præmissis *venæsectione* & *le-*
 „ *ni cathartico*. Exemplum hujus affectus singu-
 „ lare habet *Solenander, consil. med. p. 310. Ele-*
 „ *guarium Peru. epileptic. Fuller.* vim habet egre-
 „ giam ad hunc morbum domandum. Pater præ-
 „ dictarum puellarum, qui clericus erat, filias

150 *Fascinatio, Hypochondriaca, &c.* CAP. III.
 „ suas *incantamentis, vel veneficarum malis arti-*
 „ bus revera affici persuasum habuit, nec ab ista
 „ opinione abduci potuit. Rem verò longè aliter
 „ se habere ex eventu luculenter patuit; antedi-
 „ cta enim remedia *obsessionem* istam protinùs com-
 „ minuerunt, quæ *precibus & lacrymis* respuerat
 „ obtemperare.

F A S C I N A T I O .

Fascina-
tio.

Art. 395. “ De Fascinatione in praxi mea nihil
 „ experientia didici, quodcunque & quocunque
 „ de ea vulgò perhibentur, neque credo ullos
 „ morbos a veneficiis suscitari: ideoque de medi-
 „ camentis & curatione eorum sollicitum esse
 „ non est necessarium. In prodigiosis verò qui-
 „ busdam morbis, symptomatum inusitatorum
 „ caterva stipatis, medicamenta *vermifuga*, item,
 „ illa quæ *epilepsie vel suffocationi uteri* meden-
 „ tur, vel *status discutientia*, utpote etiam quæ
 „ naturaliter repugnant dispositionibus illis in cor-
 „ pore, quibus diabolus ad præstigias suas abuti
 „ possit, (uti credunt Theologi) semper locum
 „ habent,

Curatio.

HYPOCHONDRIACA & HYSTERICA affectio.

Sydenhami sententia.

Hypochō-
driaca &
hysterica
affectio.

Art. 396. Hypochondriaca & hysterica affe-
 ctio est morbus frequentissimus; paucissimæ qui-
 dem scēminæ vel viri sedentarii ab illo penitùs
 immunes sunt; symptomata, aliorum pænè om-
 nium morborum æmulatur; quæcumque enim
 corporis partem insederit, symptomata qualia ei
 parti competunt, statim producit. In capite *apo-*
plexiam facit, quæ similiter hemiplegia solvitur.
 Spasmos

Spasmos horrendos gignit *epilepsia* similes, paroxysmum hystericum propriè dictum faciens, vulgò *uteri strangulatum*. *Cephalalgiam* intolerabilem excitat, *clavus hystericus* nominatur, dolorem transverso pollice possis contegere. *Palpitationem cordis* præcipuè *chlorosi* laborantibus concitat. Aliquando [sed rariùs] pulmones obsidet, & *tussim* excitat ferè continuam sine expectoratione. *Dolores colicos* & *iliacam passionem* nonnunquam æmulatur, & interdum *ictero* paroxysmus solvitur; hoc genus in foeminis laxiori corporis habitu præditis locum habet; de salute plerumque desperant. Paroxysmum *nephriticum* aliquando mentitur. In ventriculo *vomitum*, in intestinis *diarrhæam* efficit, sine dolore tamen. Partes externas non raro occupat dolore; præcipuè in dorso, & aliquando tumore maximè cruribus & tibiis: tumores ab *Hydropicis* discriminantur, in quod majores sint tempore matutino, & vestigium digiti impressi non retineant. *Dentes* etiã interdum afficit. Dolorem in dorso certo certius perferunt, quotquot hoc affectu tanguuntur. Externarum partium *refrigeratio* his omnibus quasi viam sternit, & plerumque non nisi finito paroxysmo dispellitur. Adsunt in ferè omnibus spirituum dejectiones & subsidentia, risus & lacrymæ sine ulla *προφάσει*. Et postremò [quod tristissimum est] magis *animo* ægrotant quàm *corpore* hoc modo afflicti. Urina limpida & magna quantitate excernitur, quod signum est *pathognomonicum*. Ptyalismus nonnunquam eo gradu laborantes afficit, ut mercurio delibutos facillè crederes. *Flatus nidosus*, nunc *acido* eructant, atrocissima *animi pathemata* in sinu foveant.

Art. 397. Causæ *procatarticae* sunt vel vehementiores corporis motus, vel etiam multò sæpiùs violentæ quædam *animi commotiones* a re-

pentino aliquo sive iræ, sive doloris, & similium passionum insultu. Causa efficiens est *ἀνάστα* spirituum animalium. “Secundum mentem quorundam pathemata, vapores vulgò dicta altero, retro, tanquam causa immediata, fundamenti, viz. *nimis titillante, vel molestiore quadam ineffabili sensatione* præter modum partes illinc irritante, vel hinc vellicante; unde secretiones evadunt valdè impares & malè comparatæ.”

Indicatio
curativa.

Art. 398. Præcipua indicatio curativa sanguinis corroboracionem indigitat; ideoque post debitas *revacuaciones* (ubi indicantur) *chalibeatis, amaris, corroborantibus & volatilibus* cura perficienda est. Chalybeata scæminis quandoque magnas tum animi tum corporis perturbationes inducunt; in hoc casu exhibe *laudan. liquid.* guttas aliquot sing. nocte in *aq. aliqua hysterica. Aquæ minerales* omnes chalybis præparaciones longè superant. *Limatura ferri cruda* in robustis corporibus cum majori fructu exhibentur, quàm quævis præparatio. Aqua communis impregnata *ferreis clavibus & calceis equinis*, &c. medicamentosa evadit æquè ac *aquæ minerales*. Inter bibendum *aquas ferreas*, si aliquod symptoma gravius acciderit, quod potationi aquarum referri potest, tunc ab iis abstinendum, donec symptoma istud evanuerit: in earum usu ad sex septimanas ad minimum perseverandum est; *zingiber conlitum, & semina cauri saccharata* ad ventriculum calefaciendum sunt subinde sumenda, dum *aquas* bibunt. *Theriaca Andromach. & vinum Hispanicum* multùm laudantur. *Cortex Peruvianus* in hoc morbo eximias vires obtinet, præsertim scæminis, quæ spasmodicis afficiuntur, ut & *dieta lactea* in *colica hysterica*. *Equitatio* usus est eximii. In paroxysmo ad foetida confugiendum est, quæ spiritus in ordines compellunt; quæcunque scætent huic intentioni inserviunt. In doloribus vehementioribus,

CAP. III. *Hyſterica affectio.* 153
ribus , vomitionibus , & diarrhœis ad laudatum
tanquam ad ſacram anchoram confugiendum eſt .

Vvillifii ſententia .

Art. 399. Hyſtericæ affectionis ſigna ſunt motus in imo ventre , ibidemque velut *globi* cujuſdam aſcenſus ; dein rugitus , aut vomendi nixus , hypochondriorum diſtentionis & murmur cum flatuum eructatione , respiratio inæqualis ac ut plurimum impedita , præſociatio in gutture , vertigo , oculorum inverſio aut rotatio , ſæpè riſus aut fletus , fabulatio abſurda , quandoque *ἀσπνία* & *ἀνιμνία* cum pulſu obſcuro aut nullo , aſpectu cadaveroſo , interdum motus convulſivi in facie & artubus , & nonnunquam in toto corpore .

Art. 400. Symptomata hujus morbi in viris ſunt, quæ ſequuntur , cardialgia , flatuum ingens proventus , rugitus ac crebra vomitio , in ſiniſtro hypochondrio diſtentionis , ac ſubtus *ventriculum* pulſatio immanis ſentitur , borborygmi & murmura . In *thorace* conſtrictio & anguſtia , respiratio difficilis , cordis tremor & palpitatio , ſpirituum deliquia . In *capite* dolores atrociſſimi , ſcptomix , vertigines , vigilix pertinaces , cogitationum æſtus & fluctuatio , animi incertitudo , phantasia perurbata , rei cujuſque formido & ſuſpicio , morborum , quibus immunes ſunt , poſſeſſio imaginaria , melancholia & mania , dolores vagi , ſpaſmi , ſtupores , ſudores nocturni , febres erraticæ , &c. ſputatio ſerè continua . *Higlmorus* ſupponit præcipuam hujus morbi cauſam eſſe in vitioſa ventriculi conſtitutione .

Art. 401. Ad therapiam quod attinet , quoniam quamplurima ſymptomata ſunt convulſiva , ideo conſtat remedia *antiſpaſmodica* potiſſimum indicari . In paroxyſmo *ſarida* internè atque externe

Paroxyſmi hyſterici deſcriptio.

Symptomata in viris.

Curatio.

ternè valdè profunt; nonnullis convenit in medio paroxysmo *aq. frigida* haustum, in qua *camphora* deflagavit, propinare. Extra paroxysmum *evacuationibus* necessariis factis, medicamenta vulgè *digestiva*, quæ ventriculi tonum ac fermentum spectant, locum habent: talia sunt *tinctura sacra*, *elixir propriet.* *pulv. ari. comp.* *sal. absynth.* *cremor. tartar.* *vitriolat.* *vitriolum Martis*, &c. "Inter *digestiva* & *chalybeata* pro certo emittuntur virtutes *entis Veneris*; uterque tamen an sit reverà *anodynum*, ut a quibusdam perhibetur, dubius hæreo; nondum enim satis commertum habui. "Externè *fotus stomachici*; postremò ex medicamentis *chalybeatis* maximum juvamen sperandum est. Potus assiduus *coffee* aut *thea* paratus nonnullis emolumento fuit; *acidula* ferè semper eum fructu sumuntur. *Pil. nostr. hyster.* in paroxysmo & extra; *℥. Facul. bryon. ase fœtid. castor. ana ℥i. sal. coral. succin. Jovis ana ℥ss. galban. in aq. bryon. comp. solut. q. s. f. massa.*

Purcelli sententia.

Hic affectus est morbo sum legio,

Art. 402. *Hysterica passio* (inquit *Galenus*) unum quidem est nomen, varia tamen & innumera accidentia sub se comprehendit. Inter alia symptomata hoc morbo occurrentia perquam notabilis est sensus *frigoris*, quem percipiunt ægræ per dorsum assurgentem & mox per universum corpus diffusum; sequitur *cephalalgia*, & nonnunquam cordis palpitatio, & animi deliquium, & deinde brevi sensim ad se redeunt: in aliis præterlapso frigore succedit insignis calor, qui pleraque symptomata antedicta eum aliquot novis accersit; interdum in initio paroxysmi frigus est vix perceptibile, & tunc symptomata graviora non nisi post accessum caloris tragœdiam agunt. Propter

propter

pter diaphragmatis & musculorum respirationi inservientium violentum ac perpetuum spasmus sceminae hystericæ quandoque diutissimè procumbunt instar mortuarum sine (sensibili) respiratione, immò interdum per integrum diem & diutius. Probè animadvertendum est hunc morbum ire & redire, & suos habere paroxysmos, etiamsi non certis ac statis periodis recurrentes, sicut febrium intermittentium.

Art. 403. Causa primaria hujus affectus sunt *Causæ* *cruditates & coctiones vitiosæ*, quæ plerumque ante adventum paroxysmi in ventriculo gravedinem ac perturbationem, in intestinis murmura ac borborygmos pariunt, unde producit spirituum *ἀναξία*, quæ est *causa proxima* reliquorum symptomatum; *causæ remotiores* ex errore aliquo circa sex res non naturales suboriuntur.

Art. 404. Ad therapiam ritè instituendam accurate distinguendum est medico de constitutione patientis, an sit sanguinea & biliosa, vel pituitosa ac melancholica, & etiam de cruditatis peculiari genio, utrum sanguinis crassum nimis viscidam & glutinosam redit, aut nimis laxam & ebullitionibus proclivem. Affectionum Hystericarum cura huic fundamento maximè innititur: ex his etenim inter se planè discrepantibus oriuntur indicationes longè a se invicem diversæ. Sensatio frigoris in dorso, item pulsus debilis & tardus sanguinis lentorem arguunt: pulsus celerior, calor ingens frigus excipiens, odor moschi, zibeth, ambræ, paroxysmum accersens, &c. statum sanguinis esse laxiorem & fermentiscibilem indicant.

Art. 205. E paroxysmo excitandæ sunt, *Curatio* *bus volatilia & fætida* admovendo, *plantas pedum titillando* (experimentum est *Dolai*) & in graviore casu *apoplectico* scilicet, *punctionibus*, *scarificationibus*, *vesicantibus*, *ustionibus*, *sartagine*

*Methodus
therapeutica.*

gine calefacta, &c. sunt suscitandæ. Iis, quarum sanguis est viscosus & nimis tenax, convenit *venæsectio*, & postmodum vel die sequenti *emeticum*, vel, si minus congruum judicatur, *catharticum*; his ita præmissis, ad *attenuantia* & *aperitiva* accedendum est; & hic apprimè conducunt juscula ovin. vel gallin. cum *radicibus* & *herbis aperitivis*, & *rubigine ferri* (in nodul. ligat.) incoct. (vel, si ob ferrum incoctum ventriculus nauseat, forsitan non erit minùs efficax, si singulis auroris post medicamentum aliquod *chalybeatum* assumptum superhauriatur catillus istiusmodi juseuli.) Potus quotidianus sit *vinum Gallicum* aqua dilutum cum gut. xxv. vel xxx. sp. sequent; *℥. Sal volat. oleos.* ℥iij. *sp. lavend.* ℥j. m. In hoc affectu nullum remedium efficacius datur quàm *radix bellebori* vel ejus *extractum*. Constat ex solo usu *elect. chalybeat.* seq. (*℥. Cort. Peruvian. pulveris.* ℥ss. *coral. rub. ocul. cancr. præp. ana* ℥iij. *ferr. rubiginos.* ℥iij. *sal. absinth.* ℥ij. *cum q. s. syr. absynth. f. electuarium*) Fœminas quamplurimas *Hystericas* curatas esse. In altera crasi, ubi sanguis est nimis laxus & ebulliens, indicantur remedia *calorem temperantia*; *venæsectio*, *emulsiones*, *cortex Peruvianus*, *aq. Tunbrigenses*, *Bathonienses*, *jusculum cancrorum fluviatilium*, &c. Accuratam sanè horum affectuum historiam symptomatum ætiologiam nobis dedit laudatus auctor in tractatu suo eleganti *de hysteria*, idiomate vernaculo conscripto.

Estmulleri sententia.

Malum Hypochondriaci symptoma præcipua.

Art. 406. Malum Hypochondriacum est affectus ex multis symptomatibus diversimodè complicatus, a cruditate acida plus minùs viscida in primis viis natus; cujus eminentior gradus vocari solet *scorbutus*. Inter signa primaria sequen-

tia

tia sunt eminentiora , viz. cum adsunt pathemata stomachi non ritè digerentis cum symptomatibus circa abdomen , cum torminibus & flatibus intestinorum , alvi obstructione , corporis perturbatione , &c. Sed non omnia in omnibus ; ordinario motiones , & plus minùs dolores , murmuraciones , distentiones , & aliæ abdominis affectiones , cum præcordiorum angustia , & respirationis difficultate , flatibus & scotomatibus , vel vertiginosa affectione rationem formalem constituunt . Est affectus quidem complicatissimus ; tres ferè gradus paroxysmi statuuntur , viz. primò dum *respiratio est libera* . 2o. Quando *hæc impedita* , & *pulsus ferè cessat* . 3o. Quando etiam *convulsiones* superveniunt .

Art. 407. Emplastrum e *galbano* cum aliquot *Curatio* granis *zibethi* , umbilico apponi debet ; *zibethum* enim umbilico illitum suffocationes Hystericas insigniter alleviat , modo non nares nimium feriat . *Enemata* conducunt ex *carminantibus cum ol. succini Œ salibus volatilibus* , item ex *urina sani* ; ut & *clysmata terebinthinata* . Mistræ ex *salibus volat.* cum *castor.* & *opiat*is optimè paroxysmum sedant ; conducunt etiam *trochisci de myrrh.* *stercus equinum maris* est remedium nulli cedens , *succus ejus cum vino* , vel *decoctum* propinatum expectando sudorem est incomparabile in vel extra paroxysmum ; *fuligo furni splendens* est medicamentum pro pauperibus , item *flores sulph. cum N. M. Œ theriaca* in vino solut. cum additione *castor.* In graviore malo exhibere soleo potionem seq. deterrimi quidem saporis , sed præsentanei effectus ; ʒi. *Aq. menthe flor. sambuc. matricar. ana* ʒj. *essent. castor.* ʒss. ad ʒiij. *sal. volat. C. C.* gr. xij. *succin.* gr. viij. *laudan. hyster.* ʒss. *syr. e cort. aurant.* ʒss. m. capiatur expectando sudorem . In specie *sclarea* (*horminum hortense*) vel ejus *decoctum* est experi-

men-

mentum singulare paucis notum in suffocatione uterina.

Louveri sententia.

Boulimia. *Art. 408.* Melancholia Hypochondriaca affecti humore salino in ventriculo deposito magna *boulimia* sæpissime tentantur, & quamdiu appetitus iste durat, ab omni dolore corporis immunes sunt, humore verò isto acri & ferino, metastasi quasi facta, in alias corporis partes deposito, cruciatus & spasmus ciuntur, interea etiam ut ventriculi appetitus omnis & digestio propter defectum ejus penitus flaccescat, quod Hypochondriacis ferè omnibus solenne est, atque malæ sanguinis diathesi, potius quàm lienis vitio, proximè imputari debet: De corde p. (147.)

Farrago sententiarum.

Prudentia
opus
est in me-
dico.

Art. 409. Morbi longi, teste Platone in *Ti-
mao*, blandissimè tractari expetunt, non vehe-
mentioribus irritari. “Mens ipsa ægroti frequen-
,, tissimè aded insigniter afficitur in hoc morbo,
,, ut sæpius cogatur medicus aliquid admittere,
,, quod jubent *consuetudo, opinio vulgi, supersti-
,, tio præjudiciaria*, quod tamen sana ratio e con-
,, tra verat.”

**Diagno-
sticon sin-
gulare.**

Art. 410. Mulieres hystericæ sensum quen-
dam *frigoris in vertice capitis* pati solent, estque
hoc præcipuum hysteriæ diagnosticon. *Bagli-
vius.*

**Bezoarti-
cum Jo-
viale.**

Art. 411. *Bezoarticum Joviale* est præstantissi-
mum remedium & infallibile in affectibus hyste-
ricis, ut pluries mirati sumus. *Idem.*

**Emetico-
rum effi-
cacia.**

Art. 412. In affectionibus hypochondriacis vo-
mitus est ante omnia provocandus; sic enim fo-
mes subtrahitur morbo, & reverà est basis cu-
ræ,

CAP. III. *Et Hysterica affectio. Memoria læsa.* 159
rz. Pitcarn. in MS. In hoc consentientem habemus doctissimum D. *Vwoodvard*, mihi amicissimum.

Art. 413. Remedia sequentia quamplurimis indicationibus satisfaciunt, si quis cognoverit uti. Remedia
Varia.
Aurum Mosaicum, cerevisia hysteric. Fulleri. Chalybs sine accid. Batean. Decoctum nigrum (Art. 48.) elect. hysteric. elect. Peruv. epileptic. & enem. hysteric. Fulleri. Ens Vener. flor. sal. armoniac. martiat. Infusum amarum sequens ℥. cort. Peruv. crassè pulv. ℥ij. tart. alb. ℥ij. Rad. serpent. virgin. ℥iss. infund. frigiddè in vin. rub. ℔ij. coletur usus tempore. Infus. chalybeat. amar. (Art. 48.) Mistura ephraëtica, julap. camphorat. mistura hysteric. spirituos. & pil. hysteric. Fulleri. Pulvis ad guttetur, pulv. hysteric. Bat. sal. Jovis, tinctur. epileptic. Fuller. sp. C. C. succinat. tartarum vitriolatum, vitriolum Martis &c.

M E M O R I A L Æ S A.

Art. 414. Inter omnes animæ humanæ facultates ne una quidem tanta difficultate & molestia philosophorum animos exereuit ac *Memoriæ ætiologia*. Memoria
ætiologia. Non pauci sunt, qui opinantur istam facultatem constitui ex repositorio variarum idearum, sensibus oblata occasione primitus collectarum & cerebro cum signaturis quibusdam ordinatè depositarum, unde ad usus futuros tanquam ex promtuariorum ad libitum evocantur: sed duæ admodum graves obtrudunt difficultates, nimirum, in tanta rerum accumulatione quomodo fieri potest, ut aliæ aliis minus oblitterentur & confundantur; & quo artificio mens ipsa ex adeo grandi idearum multitudine illas præcisè expèrgefacerè & compellare potest cæteris silentibus, quas singularis usque usus pro varia rerum exigentia exquisitè postulat. Exclamandum sit necesse est *Plasmatio nostra*

stra mira est, & mirabile opificium corporis nostri! Prodigiosa fuerunt in omni ævo quorundam hominum memoria, v. g. Seneca. Portii Latronis, Cyri Regis; nostratum quoque Reynoldi Episcopi, Vvallisi &c.

Sennerti sententia.

Memoria
læsa.

Art. 415. Memoriae læsæ exempla notabilia apud authores passim occurrunt. *Christophorus a Vega* refert *Franciscanum* quendam ex acuta febre ita memoriam amisisse, ut, etsi prius peritus esset *theologus*, postea nec *litteras* agnosceret, & neque *nomina rerum*, quæ sibi assidue in usu erant, memoria teneret.

Intemperies cere-
bri.

Art. 416. Si intemperies cerebri sit frigida & humida, somnus est longus & profundus; si humida tantum, est longus sed non profundus; si frigida tantum, moderatè somnolenti sunt; si frigida & sicca, non sunt somnolenti. Si absque causa externa memoria subito lædatur; imminentis *apoplexiæ*, *epilepsiæ*, aut *paralyseos* est indicium, si homini alias salvo id accidat. Difficulter curatur, quæ a *malignis morbis*, *venenis*, aut *phlizeris* ortum habet.

Curatio.

Art. 417. Anacardium tanquam specificum decantatur, & revera interdum egregios edit effectus, sed ejus usus periculo haud vacat. (vid. locum, item *Rati hist. plant.*) Abstinendum est a carne porcina, anatina, anserina, & piscibus, præsertim mollioribus, lacte, caseo, leguminibus, brassica, lactuca, papavere, fructibus horæis, & quæ vaporosa sunt, crassæ substantiæ, & coctu difficilia; vinum moderatè sumatur, aer sit tenuis, cerevisia pura, corpus exerceatur moderatis laboribus, somnus non mox a cibis ineatur, vitetur diurnus, nocturnus sit moderatus; fugiat mœstitiam & animi solitudinem, & ad lætitiā dispo-

disponatur, a venere ablineat. Hoc in casu in-
sum revocantur hæc & similia; *Rad. pæon. mar.*
zedoar. valerian. maj. flores lilie, lilior. conval.
primul. veris, rad. calam. aromat. sem. sinap. sp.
diamb. sine odoratis, sp. lavendul. castor. ambra
grisea, ol. cinnamomi, &c.

Estmulleri sententia.

Art. 418. Tantum saltem scimus, quantum me- Tantum
scimus
quantum
memoria
tenemus
moria comprehendimus, & cum judicio pondera-
mus, & applicamus. Certum est cerebrum esse
memoriæ subjectum radicale, quomodo autem fiat,
nescio. Venus nimia memoriam debilitat, maxi-
mè in senibus.

Art. 419. *Cubea* N. iij. manè jejuno stoma- Curatio;
cho comestæ insigniter acuunt ingenium & me-
moriæ; *ambra* est omnium optima medicina in
firmandis viribus animalibus, & roboranda me-
moria, omnibusque mentis actionibus, aded ut
nihil æquè fulciat senes labascentes; elegantissi-
ma est tinctura cephalica ex granis *chermes* &
ambra cum spiritu lilior. conval. &c. Sed notan-
dum est quod ex crebriori usu, *ambra* plus noceat
quàm prodest præmaturam *stupiditatem* inferens;
profunt *masticatoria*, & *capitis lotiones*, *thea*,
salvia, *rosmarinus*, &c.

Art. 420. " In praxi nostra tabellas sequentes,
,, præmissis ritè universalibus, hoc affectu labo- Vires m-
dicis cast
summa-
rias,
,, ranti cum fructu maximo, multis abhinc annis
,, exhibui; ℥. *Rad. cassumuniar. subtilissimè*
,, *pulverisat. ʒi. spec. diamb. sine odoratis ʒij.*
,, *sacchar. albiss. duplo pondere f. tabellæ frequen-*
,, *ter in die maximè vesperi & manè comedend.*

ANIMI MORBI.

Animi
morbi.

Art. 421. Qui laborant animi pathemate corripi potissimum solent morbis *ventriculi*, ut inter cæteros observare licet in mœrentibus, qui conqueruntur primo de languore ventriculi, mox verò de *inappetentia*, oris amaritie, & siti circa horas matutinas, cruditatibus acidis & nidorosis, flatibus & tensionibus hypochondriorum, aliisque læsæ chyloleos malis.

Morbus
durante
passione
vix cura-
bilis.

Art. 322. Si quis morbus durante animi passione ægrum corripuerit, solet interdum tamdiu durare quamdiu ipsa animi passio, & potius in alienæ speciei morbum mutabitur, quàm ægrotantem liberum relinquet.

Quomodo
tractandi
sunt.

Art. 423. Morbi ab animi pathemate pendentes blandè ac leniter tractandi sunt, a nimia remedium copia & vehementia quam maximè abstinendum.

Symptoma
anoma-
lia ab a-
nimi pas-
sionibus.

Art. 424. Quomodo morbus aliquis remediis debite præscriptis cedere nolit, insolitisque quibusdam modis, atque a sui natura valde motis progreditur, suspicandum erit de *occultis animi passionibus*. Inter solatia ægrotorum animo laborantium magnam vim obtinet *musica* (inquit *Baglivius*.)

MANIA & MELANCHOLIA.

Mania &
melan-
cholia.

Art. 425. “ Mania cum melancholia talem habet affinitatem, ut non rarè mania in melancholiam transeat, & initia melancholice frequenter maniacum quid habent, ut observavit *Donæus*; ideoque in eodem capite tractandi sunt hi duo affectus.

Calii

Cælii Aureliani sententia.

Art. 426. In melancholia adest animi anxietas atque difficultas; mœstitia cum silentio & odio conviventium; nunc vivendi, nunc moriendi cupiditas cum suspicionibus velut insidiarum sibi paratarum; item inanes fletus; atque murmura vacua, & rursus hilaritas magis post cibum cum inflatione præcordiorum, capitis gravedo, color luridus cum nigrore; aut sublividus; corporis tenuitas, virum debilitas, indigestio cum ructationibus odoris tetri; intestinorum tormina, vomitus humorum diversicolorum, & similium per podicem egestio. "Qui gravius laborant; sese vel pecudes esse vel testaceos, vel etiam vita defunctos credunt; quare alii gallinacei cantum, voce imitantur; alii occurrentibus cedunt; veriti ne (testacei cum sint) diffringantur, alii cibum pertinacissime recusant, amissam esse viam tam rati.

Melancholia descriptio accurata.

Riverii sententia.

Art. 427. Melancholia est delirium sine febre cum timore & mœstitia; & sic distinguitur a *mania*, quæ est cum furore & audacia. Ex varia melancholici humoris dispositione maxima deliriorum varietas emergit; unde alii putant se esse reges, vates, alii grana tritici, alii vitreos, ceram, alii se esse canes, feles, gallos, &c. existimant, indeque voces horum animalium imitantur, &c.

Mania & melancholia quomodo distinguuntur.

Art. 428. Varia sunt deliria in variis ægrotantibus pro majori vel minori causæ vehementia: alii enim feroci iracundia rapiuntur, & obvios quosque invadunt; & proprias vestes dilacerant, sibi que ipsis interdum violentas manus inferunt. Alii vero mitiores & pacatiores sunt, nullamque

Varia sunt deliria pro varietate conflictionum.

astantibus noxam inferunt, sed tantum varios sermones & ridiculos proferunt; interdum canunt & rident, & symptomata patiuntur, quæ in melancholia & stultitia solent contingere. Melancholia errabunda *mense Februario* homines potissimum infestat; ægri ne horam in uno loco manere possunt, sed continuò vagantur, quò vadant nescientes.

Lycanthropia.

Art. 429. "Admirandam melancholiæ, vel manix speciem apud *Oribasium*, descriptam legimus, quam *λυκανθρωπία* vocat. Hujusmodi delirio affecti foras noctu vagantur, lupos quodammodo æmulantes, aspectu pallidi, luridi, os oculosque valde siccum, crura contusionum æque vulnerum plena; circa defunctorum monumenta ad instar *Demoniaci Evangelici*, plerumque versantur. Vide *Freind, Histor. Medic.* p. 18.

Difficile curatur.

Art. 430. Humor melancholicus *flagellum*, *crux* aut *opprobrium* medicorum appellatur, quoniam vim remediorum eludit, solvitur interdum melancholia per fluxum *hemorrhoidum* vel per *scabiem*; aliove morbos *cutaneos*. Remedia in affectus hypochondriaci curatione proposita hic locum habent; *℞. Aq. nymph. ℥ij. sal. prunel. ℥j. camphor. ℥j. misce*, & cum linteis complicatis admoveatur tepidè sincipiti in maniacis; utilissimum quoque est *epithema ex sacchar. Saturn. & aq. spermat. ranarum*,

Quibus remediis curanda est.

Vuillisii sententia,

Melancholici cogitabundi.

Art. 431. Melancholici in cogitando ferè continuò occupantur, & inter cogitandum res pauciores quàm antea solebant, animo comprehendunt, ita quidem ut sæpe dies & noctes idem objectum animo volutent, de rebus aliis, quæ interdum sunt longè majoris momenti, nihil solliciti; & etiam

iam

iam objecta ferè omnia iis deformia & velut sub larva apparent.

Art. 432. Hæc tria fere omnibus maniacis accidunt, viz. 1^o. eorum *phantasia*, sive *imaginatio* nes cogitationum impetuofarum æstu perpetuè occupantur; ita ut varia sibi obmurmurent, aut clamando & ejulando proferant. 2^o. *Notiones* sive *conceptus*, aut incongrui sunt, aut sub specie falsa sive erronea repræsentantur. 3^o. Illorum delirio *audacia* & *furor* adjunguntur, contrà ac in *melancholicis*.

Quomodo
se habeant
maniaci!

Art. 433. Helleborus ab *Hippocrate* ita crebrò *Curatio* præscribitur; quoniam tunc temporis alia *cathartica* saltem in frequenti usu; vix innotuere; jam verò longè præstat *lenioribus* & *mitioribus* humores subducere. *Emetica* sequentia sunt. maximè utilia; ʒj. *Sulp. antimon.* a gr. vij. ad x. *crem. tart.* ʒß. m. ʒj. *Mercuri vitæ* gr. vj. vel vij. *tart. vitriolat.* ʒß. m. ʒj. *Extract. hellebor. nigr. calomel. ana* ʒj. f. pil. cathartic.

Etmulleri sententia:

Art. 434. *Affectus Melancholicus* seu *Melancholia* differt a delirio *Melancholico*; prior est quando homo est nonnihil mœstus & morosus, faciliè subinde irascitur, ipsi nihil arridet, cogitabundus est; ubi verò taliter affectis supervenit *phantasma* constituit *delirium Melancholicum*, in quò ægri sunt timidi, anxiosi; & quasi in angustiis constituti videntur; adeoque quæcunque vident vel audiunt; sibi pejora & periculosiora persuadent, & licet interdum rident, & læti videntur; quando putant se esse divites, &c. nihilominus non est revera hilaritas, non verum gaudium; sed potius apparens, & cum risu *Sardonico* conjunctum; transitorium; & faciliè succedit novus mœror, & præcordiorum anxietas, sine causa iterum rident, & parum aut nihil omnino dormiunt, sed cum terrore evigilant.

Differen-
tia melan-
cholia a
delirio
melancholico.

Fundamē-
tum me-
lancholiz.

Art. 435. Mores animi sequuntur temperamen-
tum corporis . Fundamentum Melancholiz sem-
per circa hypochondria consistet , utut remotior
causa interna subinde aliunde oriatur , in quo pun-
cto lien & uterus incusari solent .

Origo ma-
li explicā-
da est .

Art. 436. In Melancholicis imprimis *acidum visiosum* in primis viis abundat , hinc frequenter
sunt voraces . Explicanda est mali origo , an ex
tristitia & animi affectibus , vel ex sanguine Me-
lancholico , in priori casu *pulsus* est valde obseu-
rus , inæqualis & perè deficiens & vermicularis .

Curatio
melancholiz

Art. 437. In vomitoriis consistit radix curæ
Melancholiz , & *antimonialia vomitoria* exhiben-
da sunt in larga dosi . Melancholici & Maniaci
odio suum habent medicum , etiam curati licet .
Alvus servanda est lubrica cum extracto *hellebori*
& *mercurio dulci* , quod est *alterativum* æquè ac
laxativum , ut etiam est *sapis lazuli* ; in usum
revocanda sunt remedia *antischorbutica* , *martiata* ,
acidula ; *saccharum Saturni* specificum habetur ;
sinctura coral. confect. *alkerm.* *ambra* , *fumaria* ,
anagallis , *hypericum* , *crocus* , *camphora* , *vinum*
generosum , &c. laudantur . Emplast. ex *tacamahac.*
capiti raso applicetur . In delirio Melancholico o-
pium nullum sortitur effectum ; licet dupla aut tri-
pla dosi propinetur , ægri *agrypni* manent , & se-
rociores serè evadunt ,

Mania
definitio
&c.

Art. 438. Mania sive insania est delirium sine
febre cum insigni furore & audacia , exuta quasi
omni ratione ; ægri pertinacissimè vigilant , inter-
dum per aliquot menses . Tres circumstantiæ sunt
maximè notandæ , nempe , *furor insignis* , *robur*
stupendum , & *frigoris tolerantia* planè mirabilis .

Curatio
mania .

Art. 439. Radix curationis consistit in validis
vomitoriis sæpè repetitis , convenit etiam *venasec-*
tio , præ reliquis radix *hellebori albi* est *vomitiv-*
um maximè proficuum , sequenti modo præpa-
rata tunc propinari potest ; ℞. rad. *hellebor. alb.*

• 3ß.

℞ 3℞. ad 3j. coque in vino donec mollescat, tunc abjiciatur vinum istud, & radix in vinum aliud injiciatur, & ita per noctem relinquitur in loco calido sine coctione tamen, postea coletur expressione levi vel forti, prout magis vel minus validum potestetur, vires sunt optimæ, nec unquam satis laudatæ; *nitrum crudum* & omnia *nitrata* summè conveniunt, remedia pro cura *melancholiz* hæc quoque locum habent. Immersio subitanea in *aqua frigida* quandoque prodest.

Farrago sententiarum.

Art. 440. De horum affectuum origine, incremento, & ætiologia videatur *Boerhaave*. In sectis cadaveribus *Mania* demortuis (inquit *D. Shavu*) nihil alienum a sanorum corporibus invenitur, nisi forsan *induratio meningis cerebri exterioris*, quæ probabiliter ejusdem oscillationes liberas plurimum immutat, & interturbat, undè spirituum animalium distributio valde enormis ac perturbata evadit.

Art. 441. Cum melancholici plus justo lætentur, indicium est ac præludium instantis *maniz*.

Art. 442. Succus *hederae terrestris* intus sumptus ad ʒij. vel iij. singulis diebus valdè commendatur ad hunc morbum vincendum, item linimentum ex eodem succo confectum pro capite raso inungendo curam promovere creditur. Specifica duo simplicia adeo deprædicata sunt *hypericon* (*Fuga Dæmonum* dictum) & *anagallis*. *Angelus Sala* pro arcano habuit tincturam *hyperici*, & aliquando cum careret tinctura, decoxit *summitates* ejusdem in vino Rhenano & cerevisia tenui; atque utiliter propinavit. Decoctum *anagallidis flore purpureo* (dos. ʒiv. ter in die) præmisso plus semel vomitorio tanquam specificum commendatur ab *Ettmullero*, *Hartmanno*, *Vuillifio*, *Sennerto*, *Quercetano*, &c.

Art. 443. Sequens emeticum, quod fortissimum est, in hospitio mente captorum frequenter propinatur. ℞. succ. fol. asari ℥vj. vel ℥ij. aq. card. ben. ℥ij. oxymel. scillitic. ℥ss. m. s. potio. Pharm. pauper.

Cerevisia melanagoga.

℞. Rad. hellebor. nigr. ℥ss. jalap. ℥vij. hermodact. ℥ss. coq. in cerevis. nov. cong. xxiv. ad cong. xvij. addendo sub finem coction. sen. alexandr. ℥ij. rad. rhabarb. ℥vj. tart. alb. ℥iv. sem. coriandr. ℥vj. rad. liquirit. limatur. chalyb. ana ℥iv. fol. cochlear. hortens. M. iv. colaturæ add. fermentum.

Cerevisia ad Melancholiam.

℞. Fol. marrhub. alb. M. iv. coq. in cerevis. nov. cong. vj. ad cong. iv. cola & in doliolo suspendatur saccul. seq. ℞. Rad. chin. nodos. præon. mar. ana ℥ij. polypod. ℥i. lapath. acut. ℥iij. Raphan. sylv. ℥. x. fol. ling. cervin. m. iij. summit. hyperic. p. vj. cort. fraxin. ℥iv. bact. junip. sem. dauc. ana ℥ij. rasur. stanni (in nodul.) ℥iv. ferri rubiginos. ℥ss. includ. omnia in saccul. &c. *Pil. de lapide lazuli, flores salis atmoniaci martiati, &c.* sunt remedia proficua. Nescio an vires camphoræ, Regiæ societari a D.^{re} Keneir sesquianno abhinc communicatæ, ad hos contumacissimos affectus expugnandos ulterius tentatæ fuerint, necne. Dosis in his casibus est ad semidrachmam omni nocte, præmissis universalibus, & aliis remediis cephalicis & alterantibus non penitus neglectis. Philosoph. transact. N. 400.

DELIRIUM RABIOSUM

sive Hydrophobia.

Cælii Aureliani sententia.

Art. 444. Ex morfu animalis rabidi homines in delirium rabiosum sive hydrophobiam incidunt, quidam celerius, quidam tardius, post annum vel eo amplius, sed frequentius, post dies quadraginta.

Hydrophobia.

Art. 445. Signa præfagientia sunt anxietas quædam, iracundia, somnus suspensus & turbatus, stomachi gravedo, oscitatio, & extensio frequens membrorum, insueta querela de aere quamvis sereno, parva bibendi voluntas. Signum præsentis mali ad apicem proventi est omnium potulentorum timor & abhorrentia.

Signa hydrophobiam præfagientia & præsentia.

Meadii sententia.

Art. 446. Morfus canis rabidi hoc habet in se singulare & stupendum, quod interdum malum non prius detegatur, quam memoria illius causæ penitus oblitterata sit; *vulnus* enim est *æquè medicabile* ad communes morsus sanorum animalium: Sed quandoque longe post dira symptomata exsurgunt, post duos vel sex menses, interdum post annum integrum vel diutius, vel frequentius post quadraginta dies sentiuntur vagi per universum corpus, maximè circa partem læsam; æger evadit anxius ac tristis, & ad iracundiam proclivis; pulsus intermittit cum tremore aliquali & tendinum ac nervorum spasmis; adest insignis calor internus, & sitis, & postremò aquæ timor & abhorrentia [quod *essentiam* morbi constituit] aded ut nè quidem conspectum potulentorum sine maxima consternatione ferre possit, multò minùs unam guttulam deglutire

Morsus progressus.

valeat, atque hoc est signum *pathognomonicum* morbi consummati; quod tamen non accidit nisi sub ejus finem & ultimam *catastrophem*, nempe diebus duobus vel tribus ante obitum, cum morbus sit prorsus insanabilis.

Quid faciendum est in re gens vulnerato.

Art. 447. Sicut in aliis moribus venenatis, ita speciatim hoc in casu *Galenus* prudenter admonuit vulnus amplificare per *incisionem circularem*, *capterio* inurere, & ulcus *apertum* servare per dies 40. ad minimum; sin vero hæc methodus nimis dura & inhumana videatur, sufficere licet *cucurbitula* applicata virus extrahere, prægressa prius profunda scarificatione. Sola applicatione *unguenti Ægyptiaci* quam calidissimi recens vulneratum feliciter servatum novi.

Cura interna.

Art. 448. Si quando remedia externa omnino omittantur, vel saltem haud rectè vel tempestivè adhibeantur, cura internis magna ex parte tentanda est; *alexipharmaca* sunt propinanda, inter quæ præ reliquis omnibus *cineres cancerorum fluviatilium* veteres medici uno ore magnopere extollunt; *Galenus* ait neminem periisse, cui hoc remedium propinavit; sumendi sunt cineres ad quantitatem coch. i. vel ij. singulis diebus ad dies quadraginta, vel soli vel potius cum pulv. rad. gentian, & thur. in vino.

Immersio in aquam marinam.

Art. 449. Frequens immersio demorssi in *aquam salsam marinam* optimum & certissimum omnium prophylacticorum meritò perhibetur, ad hydrophobiam præcavendam.

Etzmulleri sententia.

Delirium rabiosum.

Art. 450. Delirium rabiosum a morso rabidorum animalium, in specie canis, oritur, unde hydrophobia; demorssi planè rabiosi redduntur, & omnino in mores brutales transmutari videntur; nihil ferè humani apud se retinentes. Præter canes,

nes, etiam *feles*, *galligallinacei*, *equi*, *muli*, *lupi*, *boves* & similia animalia fiunt rabida, & morsus eorum sunt venenati, ut & hominis irati. Notandum est, quod etiam morsus levissimus, immodò tantillus salivæ contactus in homine ab animali rabido receptus, suo tempore rabiem inferre possit, adeò penetrans & malignum est istud seminum. In decursu morbi, hydrophobia est symptoma semper conjunctum. Extant exempla quædam, licet rariora, hydrophobiæ, nullo morsu animalis rabiosi prægresso, sed dubium est an in talibus præcesserit aliqualis infectio, nec ne: contagium etenim subinde ad biennium, imò ad plures annos absconditum latet, antequam in actum erumpit.

Art. 451. Signa rabiei incipientis in demorso sunt anxietas præcordiorum, iracundia sine causa, querelæ de molestia aeris ambientis, de corporis gravitate, & ineptitudine ad motum; æger melancholicus evadit, lucem fugit, a potu abstinet, in parte olim vulnerata morificationem & titillationem, interdum dolorem sentit.

Signa rabiei incipientis.

Art. 452. In morbo perfecto ægri sunt anxii, spumant circa os, oculos horridos habent, quidam latrant instar canum, collum, & fauces ringunt, liquida omnia abhorrent, insomnes permanent; in his extremis raro curantur, sed ut plurimum moriuntur inter triduum vel quatrimum post inceptam hydrophobiam.

Hydrophobici, intra triiduum vel quatrimum moriuntur.

Art. 453. Ex vulnere facto, quantocyùs fieri potest, malignum virus extrahendum est, ideoque sanatio non citò perficienda est, sed vulnus potius ampliandum. Internè conducunt *cardiaca* & *alexipharmaca*, *tinctura bezoardica*; *spiritus theriacalis camphoratus*, &c. sed omnia dupla dosi danda sunt, & diutissimè insistendum est his remediis; super locum morsum, allium, ruta, & sal contusa & mista apponenda sunt more cataplasmatibus,

Intentiones curativæ.

tis. Præ ceteris optima cura fit per improvissam in aqua frigida immersionem; convenit purgatio cum helleboro & mercurio dulci; diuretica prolunt; vis cantharidum est quasi specifica. Post scarificationem vulneris applicetur cepa sub cineribus assata vel sequens; 24. Cepam acrem No. 1. alliorum capita. No. 5. theriac. 3vj. ferment. 3ß. f. cataplasma: sunt qui addunt, herb. rut. sem. sinap. ol. scorpiion. &c. verum promptissimum remedium est ustio loci affecti cum ferro candente: hæc omnem malignitatem destruit: Si serò advocatus sit medicus; applicanda est cucurbitula cum multa flamma; conducit etiam foniculus prope locum affectum excitatus.

Listeri sententia:

Dolor in loco commorso diu post vulnus sanatum signum futuræ hydrophobiae.

Art. 454. Præter signa ab aliis commemorata futuræ hydrophobiae unum se [Salium], quod præcipuum & infallibile appellat, animadvertisse ait omnibus ignotum; viz. dolor quidam in loco commorso, licet ulcus antea per dies & menses integrè fuerit sanatum, accedens, qui intensus esse non consuevit; nisi morsus partem nervosam petierit: hic dolor a loco jam commorso incipiens leviterque patientem affligens, per partem post partem spatio 3. aut 4. dierum plus minus ascendit ad cerebrum, ubi quasi vertiginem causat, & confusionem, indeque statim homo in rabiem deducitur.

Omnes hydrophobici meruntur.

Virus in saliva maxime consistit.

Art. 455. Huic prognostico (nempe neminem aqua metu oppressum servatum esse) consentiunt ferè omnes antiqui.

Art. 456. Ex nostra observatione ipsam salivam præcipuè vitari atque in ea unicum esse virus, experimentis credo: etenim hæc ferè vulnera inficere solet, & etiam sine vulnere communiari potest malum. Huic conjecturæ adstipulatur

„ latur historia duorum hominum hoc malo affe-
 „ fectorum *solo saliva tactu* sine recepto vulne-
 „ re, itenique duorum puerorum in *Hibernia so-*
 „ *la tractatione vulneris* in capite canis ab alte-
 „ ro rabioso demorſi pariter infectorum; historiæ
 „ proſtant Actis philoſophicis. Plures canibus ra-
 „ bioſis demorſi curæ meæ commiſſi fuerunt, ſed
 „ ne unum quidem *Hydrophobia* laborantem mi-
 „ hi unquam contigit videre; ſuppeditamur exem-
 „ plis in Gallic. Hiſt. Acad. Scient. quorundam eu-
 „ ratorum, etiam ubi aquarum pavores aderant,
 „ maximè *phlebotomiis* uſque ad deliquia itera-
 „ tis vicibus celebratis; *immerſionibus in aquas*
 „ *falsas* tantùm non mortem inferentibus, & *per-*
 „ *uſionibus* earundem uſque ad extremas vitæ
 „ oras provectis. “ Quidam medicus hydropho-
 „ bici cujuſdam oculis mappam craſſam ſuperinje-
 „ cit, manibusque ligatis, potionem bibere invi-
 „ tum aliquoties coge-
 „ bat; at prorsus ſiniſtro even-
 „ tu; nam ſtatim vehementer convulſus obiit.
 „ Qui plura velit adeat authorem Liſſerum, qui
 „ elegantiffimum tractatum de hoc affectu con-
 „ ſcripſit. Admiranda proſectò eſt historia *Jaco-*
 „ *bi Corton* apud illum ab omnibus lectu digniſ-
 „ ſima.

Louvthorp. Philoſ. Tanſact,
 Vol. III. pag. 283.

Art. 456. ℥. Rad. ſerpent. virgin. flor. hyperic. Remediũ
ana p. æ. ſ. pulv. doſ. ʒß. vel ʒij. in julap. ce- ſingulari
phalic. ℥. Fol. rut. ʒvj. theriac. Ven. allii, ra-
ment. Jovis ana ʒiv. infund. in vin. Caparienſ.
vel alb. digere in balneo per horas 4. coletur
cum expreſſione forti, doſis ʒij. vel iij. ſingulis
auroris ad dies novem, maneatque æger jeju-
nus per tres horas: magna reſiduum parti vul-
neratæ circumligetur & ſingulis diebus renove-
tur,

tur. Remedium hoc me nunquam fefellit. *Mayerne.*

Remediū
topicum.

Art. 457. Loco vulnerato quamplurimum applicetur *anus galli veteris* plumis prius divulsis; & si canis rabiosus esset, gallus statim intumescet, & mox morietur, & demorsus sanabitur; si vulnus sit exiguum, ampliari debet.

Alia me-
thodus.

Art. 458. Aliter; homo morsus in mare quanti-primū novies immergatur, & locus vulneratus cum lixivio e cineribus *quercinis* & *urinā* eluatur, & applicetur cataplasma ex *theriaca Londinensi*, *alliaria*, *rutā*, & *sale*.

Electua-
rium.

Art. 459. ℞. *Fol. rut. sicc. scord. ana* ℥ij. *rad. serp. virgin.* ℥iſs. *flor. hyperici* ℥ij. *theriac. Lond.* ℥j. *syr. e cort. limon. q. s. m. s. elect. pro dos. ix.* una lingulis auroris sumenda.

Lichen ci-
nereus.

Art. 460. *Lichen cinereus terrestris* [*Raii p. 117.*] cum æquali quantitate *piperis* est remedium infalibile ad rabiem præcavendam in homine ac jumento.

Deco-
ctum ad
morsum
canis ra-
bidi.

Art. 461. " Aliquando expertum vidimus deco-
ctum ad morsum canis rabidi *pharm. Bat.* cum
felicit' successu. Postremò quoniam hoc malum
a morsu animalis (& ut plurimum canis) ra-
biosi omninò pendet; operæ pretium esse vide-
tur, ut accuratè animadvertamus, quænam sint
signa *diagnostica* canis verè rabidi, ut futurum
morbum, si fieri possit, præcaveamus. " Se-
quentia itaque habemus apud *Lomium*; canis ra-
biosus esurit, sitit, nihil tamen cibi vel porionis
sumit, oculos flammeos trucesque habet, auricu-
las demittit, linguam exurit, multum oris spumat,
umbræ suæ oblatrat; sæpe sine omni latratu tristis
atque anxius discurret, crebrò tanquam cursu fa-
tigatus spirat; caudam gestat intortam, nullo di-
scrimine in quosque obvios animantes impetu ac
morsu fertur, præcipiti atque incerto oberrans
cursu. Integri canes & conspectum & latratum
ejus, qui furit, exhorrescunt, ac fugiunt. " Pri-

Signa dia-
gnostica
canis ra-
bidi.

" mum

CAP. III. *Tarantismus, Incubus.* 175
 „ mum symptoma rabiei in canibus est *inustus*
 „ tremor seu trepidatio.

TARANTISMUS.

Art. 462. Tarantismus est rabies eorum, qui a *Tarantif.*
tarantulis sunt morfi. In *Apulia Italia regione* *mus.*
 frequenter occurrit; apud nos nusquam invenitur.
 Spiritus animales primario afficiuntur. Cura per
musicam peragitur. *Clarissimus Baglivius* de hoc
 affectu tractatum emisit: & de eodem etiam scrip-
 sit *celeberrimus noster D. Mead*; quibus remit-
 tendus est lector eruditus. V. d. etiam *Hist. de l'*
Acad. Vol. VI. p. 20.

INCUBUS SIVE EPHIALTES.

Vuillisi sententia.

Art. 463. Incubi paroxysmus ferè tantum inter *Incubus.*
 dormiendam ingruit, & plerumque post stoma-
 chum cibis dyspeptis aggravatum, & decubitum
 in lecto supinum excitari solet; eo laborantes po-
 tissimum in pectore & circa præcordia noxam sen-
 tire videntur, nam respiratione plurimum impedi-
 ta, se a pondere, thoraci gaviter incumbente, op-
 pressi putant quod pondus nunc hæc nunc illa
spectri aut *larvæ* specie ipsorum imaginationes il-
 ludit, nec excutere possunt, nec corpus dimovere;
 verum post diutinam, ac interdum ferè ad vitæ de-
 liquium, in præcordiis luctam tandem evigilant,
 & moles imaginaria evanescit; superstitè verò ut
 plurimum cordis tremore, & non raro diaphrag-
 matis vibratione celerrima & violenta. Hic affe-
 ctus raro ex se periculosus est.

Art. 464. Præmissis universalibus *cephalicis* & *an-* *Curatio.*
tispasmodicis curatur.

Estmul.

Estmulleri sententia.

Quomodo
præcavea-
tur.

Art. 465. Rarè hos malo afficiuntur, qui laudabili utuntur diæta, aut qui *sobriam* amant *cenam*; si dormiatur in latere, elevato capite, præcavetur incubus. Ab Arabibus appellatur *epilepsia nocturna*, quia incubus habitualis & diuturnus in *epilepsiam* tantum degenerare solet, & est ejusdem prodromus in junioribus, uti in senibus *apoplexia*.

Curatio.

Art. 466. Incubus habitualis curandus est, præmissis præmittendis, *antiepilepticis*, *marialibus*, &c. cum sobrietate conjuncta. *Lapis lazuli* laudatur.

Inter legendum.

Elegans
modus de-
scriptio.

Art. 467. *Antonius Menjoitius* hunc affectum eleganter describit; quoddam sit nocturna spirandi difficultas absurda superinjectæ molis opinione somniantem eludens. Pueros frequenter exercet; quia voraces plus comedunt, quàm digerunt. Cum vehementior impresserit prælocatio; quosdam interfici testatur *Aurelianus*; additque ex *Silimacho* contagiosum quoddam & epidemicum Incubum Romæ grassantem multos pestis instar jugulasse.

Quando-
que lethali
est.

CAPUT IV.

Sive Fasciculus Morborum quartus.

AFFECTUS CATARRHALES.

Art. 468. **A**ffectus Catarrhales, nimirum, Catarrhus, branchus, seu raucedo, & coryza, a se invicem juxta distichon antiquum distinguuntur. Affectus Catarrhales.

Si fluit ad pectus dicatur rheuma Catarrhus. Differentia.
Ad fauces Branchus, ad nares esto Coryza.

CATARRHUS,

Etmulleri sententia.

Art. 469. Catarrhus propriè dictus est præternaturalis a sero plus minus vitiato in quacunque parte facta alteratio seu functionum læsio. In genere frequentius præcedunt Catarrhos capitis gravitas, sensuum & actionum torpor, artuum lassitudo; supervenit successivè refrigeratio quædam in superficie corporis, horripilatio dorsi levis, in Catarrho graviore febricula lenta. Intensiora sunt omnia symptomata in *calido Catarrho*, adest ardor, dolor, corporis quasi phlogosis, materia excreta est tenuis & corrosiva; remissiora verò sunt omnia in *Catarrho frigido*, ubi lympa est mitis, & excernuntur mucosa viscida & crassa. Catarrhus

Art. 470. Conveniunt *diuretica*, & imprimis *Curatio: sudorifera ex salibus volatilibus, decoct. e lignis, speciatim sassafr. & junip. rosmarinus, succinum, serpillum, &c.* In *Catarrhis calidis*, ubi lympa est tenuis acris aut salsa, prosunt *opiata cum aromaticis & volatilibus*. In *Catarrhis diuturnis con-*

M

ve-

veniunt *vesicatoria & fonticuli*. In affectibus catarrhalibus vix habetur par remedium *fumo tabaci*; omnibus enim satisfacit scopis. "In frequenti usu sunt *decoct. catechu & suffitus ad Catarrhum Fulleri*.

Ventus
Borealis.

Art. 471. "Ventum Borealem producendis Catarrhis aptissimum esse, prater *Hippocratis* testimonium, experientia communis suffragatur. "Voillis."

R A U C E D O.

Estmulleri sententia.

Raucedi-
nis sedes
& causa.

Art. 472. Raucedo seu raucitas est vocis diminutio; pars affecta est aspera arteria ejusque larynx; larynx enim primariò format vocem; causa proxima est nimia effusio lymphæ tenuis. Est affectus *catarrhalis* a lymphâ acriori, saliori, aut acidiori.

Cursio:

Art. 473. In Raucedine contumacissima *spermaceti* est expertum remedium, item decoctum *rapparum, rob. passularum*. In Raucedine inveterata, ubi mucus viscidus aut lymphâ crassa peccat, *incidentia & expectorantia* conveniunt, & præ cæteris *syrupus de erysimo, & oxymel scilliticum, & bals. sulph. venæsectio* vitanda, nam morbum diuturnum reddit.

Vermes.

Art. 474. "Interdum *vermes in intestinis* (683.) sunt causæ *aphoniae* vel Raucedinis, ut in praxi vidimus. " *Extractum pectorale, loboch. ad raucedinem, Loboch. visellinum, Lac ebutyratum, &c.*

Remedia
varia.

C O R Y Z A.

Ettmulleri sententia.

Art. 475. Coryza, sive narium catarrhus, est quando copiosa lymphæ tenuis & acris in principio per nares defluit, & postea materia crassa, tenax, variè colorata cum dolore capitis gravativo, ab aere inclementiore ut plurimum ducens originem, rarissimè a causa interna. Frequentissimè recurrens periculum est, nè *ozenam* vel *polypum* producat.

Coryzae
descriptio
& causa.

Art. 476. Coryzam inchoantem curant naribus applicanda, in ore masticanda, suffitus, odoramenta, illinitio narium cum *ol. anisi* ante excoriationem, item *oleum succin.* vertici illitum, *ol. garyophyl.* cum bombyce naribus intrusum; *balsam. apoplecticum*, &c. quandoque in usum veniunt. Ad Coryzam præcavendam suffitus ex fumo succini, *mastich. oliban. gum. animi*, &c. multum juvant, sed hæc in principio; si morbus ulterius progrediatur; conducunt *sternutatoria* cum *ol. chym. cinnamom.* vel *garyoph.* vel *ol. majoranæ*.

Curatio.

Art. 477. Decoct. catechu compositum [in catarrho tenui præ aliis serè omnibus] decoct. rosar. *loboch. japonicum*, *loboch. vitellinum*, suffitus ad catarrhum [fumus, pallio similive tegumento capite prius tecto, naribus attrahatur,] *tabeilla domestica*, &c. sunt remedia in Coryza usitata.

Remedia
vassa.AFFECTUS CATARRHALES
in genere.

Art. 478. " Cum fluxiones sunt pertinaces, aliis auxiliis haud cedentes, ad dietam sudorificam, tanquam ad summum præsidium & rarè fallax, accedendum est, eandemque 15. 20. vel 40. die-

Dietæ su-
dorifica.

„ rum spatio imperandam, vivendo toto hoc tem.
 „ pore pane biscocto, amygdalis torrefactis, & car-
 „ nibus assatis cum decocto guaiaci in frigidis & pi-
 „ tuitosis, rusticèque viventibus; Sarsaparillæ &
 „ Chinæ in mollioribus & delicatulis. *Chefneau*.

CATARRHUS SUFFOCATIVUS.

Etmulleri sententia.

Catarrhus
suffocati-
vus.

Art. 479. Catarrhus suffocativus est affectus la-
 ryngis, in quo hæc & caput asperæ arteriæ, in
 specie epiglottis, afficiuntur primariò ab irritatio-
 ne ibidem excitata arcturam & quasi stricturam
 efficiente; certum est sedem mali esse in isto loco;
 respirationem subitò difficillimam reddit, & suf-
 focationem minatur; incipit cum raucedine subita-
 nea, deinde irritatur larynx, stringitur epiglottis,
 undè metus suffocationis; est quasi complicatio *tus-
 sis ferinae & raucedinis* gravioris: oritur a lymphæ
 acore vel salsedine.

Curatio.

Art. 480. Catarrhus suffocativus est morbus, si-
 „ quis alius, plerumque revera peracutissimus ho-
 „ minem ferè dicto citius jugulans; propterea omni
 „ arte properanda est cura, festinanter instituendo
 „ multiplicem humorum divaricationem, per ve-
 „ næsectionem, cucurbitulas cum scarificatione,
 „ enematum acrium injectionem, vesicantium ap-
 „ plicationem, artuum fortem deligationem, *quam*
 „ *magni facio*, & sequens cataplasma plantis pe-
 „ dum apponendum suaderem; *℥. Herb. ranuncu-
 „ li flammei minoris contus. p. iij. fimi columbin. p.
 „ j. pulv. euphorb. p. β. sapon. nigr. q. s. acet. parùm*
 „ *contundantur*, &c. Author nollet *Etmullerus*
 „ *vomitória & opiata* proponit, sed in paroxysmi
 „ articulo ambo suspecta habeo. Usui interdò con-
 „ ducunt medicamenta *volatilia & nervina dicta*,
 „ *item oleosa & mucilaginosà*, privatim albumen

„ ovum-

CAP. IV. *Catarrhus suffocativus.* 181

„ *ovorum cum syrup. de althæa conquassatum* &
 „ *cum tantilla aq. nephrit. dilutum*. Extra paro-
 „ *xylum remediis antiasthmaticis*, & *ad catar-*
 „ *rhum propriè dictum usitatis recidivatio præca-*
 „ *venda est.*

Art. 481. “ Medicus quidam juvenis, athleti- Historia
 „ *cus, oppido vicino degens, præeunte per bien-*
 „ *nium raucedine, in hunc morbum subitò lapsus*
 „ *intra spatium 24. horarum mortuus est. Ipse &*
 „ *adstantes angina laborasse existimabant, etiamsi*
 „ *nullus tumor gutturis aderat, intus aut extror-*
 „ *sum, deglutitio neutiquam impedita, &c. Ho-*
 „ *ra extrema implorabat meum auxilium, mor-*
 „ *bum fuisse catarrhum suffocativum admonui; sta-*
 „ *tim ac locutus fueram, ægrotus ipse, qui adhuc*
 „ *mente constabat, agnovit morbum. Cucurbitu-*
 „ *las illicè affigendas imperavi; sed priusquam chi-*
 „ *rurgus officium inchoare poterat intra horæ qua-*
 „ *drantem animam efflavit. Quatuor alios hoc*
 „ *morbo exitiali tentatos novi, quorum duos tan-*
 „ *tum servatos vidi.*

Art. 482. Est etiam alia species catarrhi suffoca- Alia species
 „ *tivi, ubi sanguis in pulmonibus stagnat, & mor-*
 „ *riuntur ægri ex syncope (est forsan polypus cordis*
 „ *vel in valis sanguineis majoribus) ejicitur spuma ex*
 „ *ore; Catarrhus hic suffocativus cognoscitur ex do-*
 „ *lore pectoris gravativo, difficultate respirationis,*
 „ *& suffocationis metu, voce ferè intercepta, anxie-*
 „ *tate ægri; interdum tussi, non semper; screatu non*
 „ *multum emittitur; appellatur etiam syncope car-*
 „ *diaca. (575.)*

Art. 483. Convenit *venesectio* quàm ocissimè; Curatio
 „ *sperm. cet. a ʒss. ad ʒj. in appropriato vehiculo insi-*
 „ *gne levamen adfert, sal. succini, antimon. diapho-*
 „ *ret. & alia sudorifera; item gum. ammoniac. crocus*
 „ *est summarum virium in hoc casu.*

T U S S I S.

Ettmulleri sententia.

Tussis.
Distingue-
dum est
an sit a
pectore
vel ven-
triculo.
&c.

Art. 484. Probè distinguendum est, an tussis hu-
mida sit ex *pectore*, an ex *stomacho*, an a *nervis*.
Percunctandum est, ubi ægri percipiunt tussendi
stimulum; an in larynge seu aspera arteria, vel
pectore, vel inferiùs circa scrobiculum cordis; nam
posterior locus *tussim stomachalem*, priores *pecto-
ralem* innuunt; jubeatur æger profundius respira-
re; sic enim tussire incipiet, si vitium sit in pul-
monibus; secus si in stomacho. Sonus in tussien-
do ex profundo quasi raucus pulmones affectos indi-
cat, superficialis asperam arteriam.

Tussis sto-
machalis.

Art. 485. Nullus practicum aliquid habet de
Tussi stomachali præter *Lindanum*; mihi (in-
quit) est compertum pluribus observationibus ple-
rumque Tussim esse ex ventriculo; ubi autem ma-
teria latitet, & undè procedat, ex sono dicere
possum, qui variatur pro materiæ & loci condi-
tionibus; si materia sit tenuis, & in ventriculo
delitescit, furibunda Tussis est, in qua vix aliquid
egeritur, licet cum summo conatu tussiant [omnis
Tussis in principio *sicca* progressu temporis evadit
humida.]

Curatio.

Art. 486. Ad expectorationem promovendam
convenit succus *raphan.* recens expressus cum pau-
co *sacchar.* temperatus; Tussis humida stomachalis
cum *vomitoriis* & *stomachicis* curatur; sanctè tes-
tor, quod ex usu *vomitiorum* nè minimum
noxæ observaverim; *purgantia* non conducunt,
mercurius dulcis verdè primum obtinet. *Elixir*
proprietatis & *bals. Peruv.* laudantur. Tussis sic-
ca, nocturna, pectoralis, catarrhalis dicta, ex
lymphæ vitio, & exinde irritatione, optimè cu-
ratur per *volatilia sudorifera* & *opiata*, etiam si
febris

febris conjuncta fuerit. *Flores benzoës, sperma cetti*, decoctum *raparum*, succus *glycyrrhiz.* &c. laudantur. In Tussi sicca chronica *phthisin* minitante, ubi peccat lymphæ, egregium est decoctum *e lignis cum passulis*, &c. Decoctum *raparum* in omni Tussi sicca, vel catarrhali, vel pectorali, vel stomachali est nobile remedium, quod aliis irritis vidi optimum.

Sydenhami sententia.

Art. 487. Tusses aliquando sunt *epidemicæ* ne-
mini ferè parcentes: Hæ pendent plerumque a fe-
bre aliqua constitutionis prægressæ, tanquam a
morbo primario; ideoque quando cum febre im-
plicentur, respiciendum est ad istius morbi genium;
cùm verò tusses sine febre contingant, curandæ
sunt sola a *carnibus* abstinencia, moderato exerci-
tio, & *ptisana pectorali refrigerante*: quandoque ve-
rò tusses *epidemicæ* ad tussim puerorum *convulsi-
væ* quàm proximè accedere videntur, & tunc
eandem ferè postulant medelam, viz. *venæsectionem* & *catharsin*.

Tussis epi-
demica.

Art. 488. Tussis recens [*phthisi* nondum con-
firmata] sola abstinencia a *vino* & *carnibus*, &
usu *loboch. ex ol. amygd. dulc.* &c. & *tab. dome-
stic. seq.* ordinariò subigitur; *℥. Sacchar. cand.*
*℔iij. coq. in q. s. aq. font. usque dum adhærescat ex-
tremis digitorum*, tum add. pulv. *glycyrrhiz. enul.*
campan. sem. anis. angel. ana ℥ss. pulv. irid. florent.
sulph. ana ℥ij. ol. anis. chym. ℥ij. s. s. a. tabellæ.
Sin verò, his tentatis, superstes maneat (præci-
puè si febrem comitem habeat, vel a *peripneu-
monia* vel *pleuritide* originem ducat) ineptum
fuerit *pectoralibus* fidere; sed *venæsectione* & *ca-
tharsi* debellanda est; si autem denique huic me-
thodo non cesserit, tum capiat æger *balsam. Pe-
ruv. gut. x. in coch. j. syr. heder. terrest. ter in die*

Curatior

superbibendo ℥iij. decoct. amar. sine purgantibus; sed in tussi diuturna vel phthisi omnibus aliis præsidii equitatio (492.) palmam faciliè præripit.

Farrago sententiarum.

Terra cal
sechu, &
alia reme-
dia.

Art. 489. Si Tussis a catarrho oriatur, curatur ut catarrhus; ℥. Terr. catechu. ℥iv. sacchar. penid. in aq. ros. solut. (℥vj. mucilag. gum. tragacanth. q. s. f. trochisc. si sub linguam teneantur, tussim curant, [inquit Bonetus] viscidam & tenacem pituitam bene solvunt, eamque commodè expectorari reddunt, quare in his affectibus pulmoniacis mihi in frequenti est usu, semperque meo desiderio respondet hoc remedium.

Remedia nonnulla alia melioris notæ sunt, quæ sequuntur, viz.

Syrupus ex allio sequens;

℥. Rad. enul. campan. incis. ℥iv. zinzib. ℥vj. rad. liquirit. ℥vj. coq. in aq. font. ℔vj. ad ℔iv. sub finem add. lobul. allii tenuiter incis. ℥iv. sem. aris. contus. ℥β. colatur. add. sacchar. q. s. ut f. s. a syr. Pharm. paup.

Trochisci balsamic.

℥. Balsam. Tolutan. ℥β. pulv. rad. irid. enul. campan. ana ℥ij. gum. Arab. trag. ana ℥j. flor. benzoin. ℥ij. sacchar. rand. ℔β. omnibus in pulv. subtil. redactis cum q. s. mucilag. gum. tragacanth. f. s. a. trochisci.

Item. Balsam. sulphuris anisat. & extractum peborale, Lohoch. rub. & Lohoch. myrrhisat. præcipuè Fulleri in recenti Tussi conveniunt.

Admoni-
tio.

Art. 490. Discant ægroti Tussi laborantes, tem-
pore

pore idoneo , & cum morbus altas nondum egit radices , validisque adhuc viribus , remedia adhibere .

Principiis obsta , serò medicina paratur ,
Cum mala per longas invaluere moras .

P H T H I S I S P U L M O N A R I S .

Sydenhami sententia .

Art. 491. Phthisis pulmonaris a frigore hyemali plerumque ortum ducit , & gradatim crescit , viz. ab humore in pulmones delapso , unde *catarrhi* ritu eos ita jugiter irritat , ut *tussis* inde excitetur tantum non continua ; & progressu temporis symptomata reliqua succedunt , & morbus frequenter evadit incurabilis . Phthisis Pulmonaris.

Art. 492. Tentandum est tamen defluxionem in pulmones minuere *venesectione* & *catharsi* leni , tum *pectoratibus* ad varios morbi status accommodatis , scilicet *incrassantibus* , vel *attenuantibus* , & febrem *hecticam* temperantibus cum *emulsionibus* , lacte *asinino* , &c. & prostermò *ulcus sanantibus* cum *balsamicis* , *opobals.* dos. gr. xx. sed hoc non est sumendum nisi prægressis *evacuatio-* Curatio .
nibus debitis : sed palmarium hujusce morbi præsidium est , ut æger quotidie *equo* vehatur ; & qui se huic corporis exercitio sanandum tradit , nullis jam diætæ legibus adstrictus , nullo cibi potusve genere privandus est ; cum in hoc uno omnis rei cardo vertatur : hoc solummodò observando , ut si æger juvenilem ætatem prætergressus fuerit , plus temporis huic exercitio impendere debet , quàm si puer aut juvenis esset , & sanè haud multò certius *cortex Peruvianus* feбри intermittenti , quàm in hac ætate *equitatio* phthisi medetur . Quibus Equitatio-
nis bene-
ficium .
dam eorum , qui ex hac methodo convalescere , tu- Tumor in
collo .

mor in collo exortus est non multùm a *scrophulis* abludens.

Prognosis.

Art. 493. In Phthisi materia purulenta per tussim excreta in ignem coniecta tetrum spirat odorem, & immitta in vas aqua repletum fundum petit. Sudores nocturni, genæ livescentes, faciei pallor, nares exacutæ, temporum collapsus, unguium incurvatio, capillorum defluxio, & alvi profluvium colliquativum, mortem statim subsequituram denuntiant. Inter chronicos Phthisis *duos* *serè trientes* jugulat. "Nasus acutus, oculi concavi, collapsa tempora, aures frigidæ & contractæ, cutis circa frontem dura, intenta & resiccata, totiusque faciei color subviridis, niger, aut lividus, lethale. Hæc est illa *facies Hippocratica* vulgò dicta, ob traditam ab *Hippocrate* descriptionem, quæ humidi calidique nativi consumptionem, adeoque mox futuram mortem indicat.

Facies Hippocratica.

Mortoni sententia.

Phthiseos causa & diagnosi.

Art. 494. Phthisis pulmonaris pendet aliquando a mala conformatione pectoris, estque illa vel *naturalis*, quando pectus sit nimis angustum, cervix longior quàm par est, omoplatæ tanquam alæ videntur; vel *accidentalis*, ubi curvitas vel pectoris distortio. Signum Phthiseos appropinquantis primum est *tussis arida*, quæ per menses aliquot durat; catarrhus verò simplex est, humorosus & brevis. Vomitus vel vomendi dispositio post pastum tussi prædicta concitata est signum Phthiseos certissimum. Signum secundum est *febris hectica* cum calore in volis manuum, & rubore genarum præcipuè post pastum. Tertium *extenuatio* partium solidarum in extremis digitorum maximè conspicua, unde incurvatio unguium; & postremo febris *putrida hectica* superveniens.

Art. 495.

Art. 495. Inter signa *pathognomonica* phthiſeos confirmatæ, primum eſt febris *inflammatoria*, inflammatis pulmonum tuberculis, quæ febris tanquam febres aliæ inflammatoriæ tractanda eſt, viz. *viſtu tenui*, medicamentis *peſtoralibus*, & *expectorantibus*, *linimentis*, & præcipuè *venæſectione*, utcunque emaciatus ſit æger (eſt enim *peripneumonia* cum pulſu ferrato) *ol. lini* eſt remedium in hoc caſu nunquam ſatis laudandum. Febrem hanc inflammatoriam ſequitur *putrida intermittens*, quæ ſit a ſuppuratione tuberculorum ob venæſectionem omiſſam, vel nimis parçè celebratam, vel aliter; hoc autem eſt ſignum pulmonum corruptorum certiffimum. *Cortice Peruviano* non proſtigatur, neque *antihectic.* *Poterii*, aut ullo alio remedio, niſi ulcere priùs curato; hanc autem comitantur inſignes aliquot evacuationes, ſeu corporis colliquationes (& hoc eſt ſignum *pathognomonicum ſecundum*) expectoratio materiæ purulentæ (pus phthiſeos confirmatæ eſt graveolens, & etiamſi ſit ſpiſſum, non tamen glutinoſum ſeu tenax, ſed fluidum, colorum variorum, viz. flavi, viridis, ſed frequentius cinerei). Sudores colliquativi, quos ſi arte obſtruentur, inſequuntur tumores hydropici in pectore vel cruribus, ſive dysenteria vel diarrhœa. Signum ultimum eſt *ſalivatio*, unde calor gutturis præternaturalis, & aphthæ pertinaces, incurabiles, (mortem non procul abeſſe plerumque nunciantes.)

Art. 496. Ad therapiam quod attinet, in principio *venæſectio*, *lenis purgatio* cum *pil. ſtomach.* *Ruſſi tinctur. ſacr.* (*calomel.*) &c. conveniunt *diuretica*, *millepedes viv.* & *preparat. balf. ſulph. terebinth. acidulæ.* *Diaphoretica*, *antimon. diaphoret.* *ceruſſ. antimon.* privatim decoctum *lingnorum* (*in aq. calc.*) ſi adſit catarrhus & calor hecticus catharticis *opiata* ſunt admileſcenda, reliquis antecellit *pil. cynogloſſ.* ſeu *ſtyrac.* Radatur caput

Curatio :

caput & aperiantur fonticuli. (Atque hæc est summa curæ rationalis & radicalis phthisicos pulmonaris. In confesso est phthisicos confirmatos rarissimè curari; non tamen idcirco planè sunt deserendi; cum palliativa cura debeat illis, qui non possunt curari perfectè.)

Diarrhœa. Art. 497. In diarrhœa decoctum album pro potu communi; sed opium est unicum præsidium, elect. ad diarrhœam seq. in praxi nostra maximè efficax expertus sum. ℞. Ocul. cancr. præp. ℥iſſ. coral. rub. præp. matr. perlæ. ana ℥ij. margar. præp. ℥ſſ. spec. confect. de hyacinth. ℥j. ol. cinnam. chym. gt. iv. miv. cydon. ℥j. laudan. Lond. sp. eroc. solut. gr. vj. syr. balsamic. q. s. m. f. elect. Ad acrimoniam humorum obtundendam injiciatur quandoque enema ex jussculo ovin. cum diascord. ℥ſſ. opiata benè ferunt hoc in casu ob metathelin materiæ morbificæ a pulmonibus ad intestina: diarrhœa tamen non est temerè aut nimis citò sistenda, nè gravius malum accideret, quod optimè præcavetur expectorantia & lubricantia certis intervallis propinando, & diarrhœam moderando potiùs quam penitus vincendo.

Tussis. Art. 498. Ad tussim importunam & vigilias pertinaces levamen vix procurandum est, nisi ab opio; cum cautela tamen exhibendum est, parcè, & non sine maxima necessitate; nè languores, dyspnœam, extremorum frigus, &c. inferat, & mortem properet, & medico dedecus pariat. Hic in usum veniunt linctus, trochisci, &c.

**Sudores colligati-
vi.** Art. 499. Sudores colligativi, nisi sunt valdè immodici, sunt tolerandi, sin verò sint maximè profusi, ita, ut languores usque ad deliquium ferè inducant, astringentibus, & aliis propriis administrandis moderari debent. Sequenti julap. uti soleo; ℞. Aq. tormentil. germ. querc. plantag. ana ℥iij. cinnam. ten. ℥iv. mirab. ℥j. margar. præparat. coral. rub. præp. ana ℥ij. bol. ver. sang. dracon.

con. ana ꝑ. ter. japon. ꝑ. syr. myrt. ꝑ. sp. vitriol. (dulg.) q. s. ad gratam aciditatem. m. f. julap. sumat ꝑ. vel iij. omni bñorio vel trihorio phiala benè agitata,

Baynardi sententia.

Art. 500. " Si calor hecticus sit insignis, & Ad febrem hecticam.
 „ phthisis celèri cursu progrediatur, convenit *di-*
 „ *ta lactea*, & *lac asininum* (si comparari possit)
 „ eligendum est; quoniam est minùs crassum:
 „ huic verò *succedaneum* adinvenit, quòd etiam
 „ valdè commendat *clarissimus Baynard* in *ap-*
 „ *pendice ad psychrolusiam*, nimirum *serum* sive
 „ *lac butyraceum*; quamplurimis (inquit) indica-
 „ tionibus satisfacit; refrigerat, humectat, nutrit,
 „ &c. & deinde inferius pergit laudatus author fi-
 „ denter affirmans, & expertus loquens se comper-
 „ tum habuisse, quod plures ex continuato usu *hujusce*
 „ *lactis* a caloribus præternaturalibus & etiam he-
 „ tictis liberati fuissent; iisque, quibus calor est in-
 „ gens & sitis importuna leviter acidulum præberi
 „ debuisset, recens verò & dulce magis nutriat.
 „ Et reverà hæc omnia meritò dicta esse arbitror:
 „ Ego etenim plus semel *raucedinem* pertinacem
 „ & *catarrhum* mediante hoc remedio, utcumque
 „ vulgari feliciter sustuli; & in febre *hectica*
 „ magno fuisse commodo pro certo deprehen-
 „ di.

Ettmulleri sententia.

Art. 501. Phthisici dicuntur κατ' ἑξοχὴν ii, qui Phthisicæq;
variae.
 „ ulcere pulmonum laborant, & habent febrem he-
 „ cticam conjunctam; eandem etiam habent ii, qui
 „ phthisi renali, jecorali, a vitio mesenterii, &c.
 „ laborant, tabidi evadunt. Tabes a glandularum
 „ mesenterii vitio solet habere abdomen inflatum ac
 „ tumi-

tumidum cum dolore in ejus profundo obtuso, ac plus minus gravativo, itemque cum renitente hinc inde sparsa duritie circa umbilicum observabili.

Art. 502. Tussis phthisicorum non statim est *pulmonalis*, sed *stomachalis*, (485.) cui tandem acrioris lymphæ occasione per glandulas asperæ arteriæ, aut pulmonum excretæ tussis pulmonalis supervenit. Materia viscida in aquam exspuita supernatat; pus verò fundum petit. Materia pinguis phthisicorum urinæ innatat.

Curatio.

Art. 503. Vomitoria sunt optima in omni phthisi incipiente, maximè si malum sit a vitio stomachi: *purgantia* sunt omninò vitanda; *syrupi* & *saccharata* omnia plus nocent, quàm prosunt. *Lindanus* refert se curasse quendam domesticum atrophiam laborantem solo decocto ex *radice bellarii* cum *passulis* & *glycyrrhiza*, adjecta 10^{ma} parte vini *Hispanici*, nam & hoc nutrit egregiè; laudatur *rob. passularum*.

Art. 504. Febris hæctica hæc tria sunt quasi signa *pathognomonica*, 1°. calor ipsi ægro ferè occultus vix sensibilis; ab omni pastu post aliquot horas acutus. 2°. Adest *absumptio* & *extenuatio* corporis successiva. 3°. *Pulsus celer, parvus, frequens, debilis* & *subinde durus*, efflorescit plerumque *facies* colore plus minus rubicundo, & *sudores* nocturni infestant; accidit etiam frequenter *capillorum* defluvium, totius corporis lassitudo, frequens lipothymia; somnus horis matutinis est rarus; ægri conqueruntur de æstu interno. Hæctica incipiens *difficillimè* cognoscitur, *facillimè* curatur; confirmata e contra; in statu morbi *urina* in summitate pellem habet quasi oleaginosa, *aranearum telis* similem. In *saturno* singulare quid latet contra febrem hæcticam, & internas viscerum exulcerationes & corruptelas. Laudantur *antimon.* *diaphoret.* & *antihæctis.* *Poterii*, & de-

& decoct. e lignis præ reliquis in lymphæ acrimonia, ut & *sperma ceti*. Ad ulcus pulmonum abstergendum, & sordes nimis hærentes eliminandas optima sunt ex *tabaco* remedia, utpote quæ præter vim expectorandi *vulnerariam* quoque possident. Potus ordinarius phthysicorum hecticorum commodissimè conditus sit *fumo sulphuris* ad imitationem *Helmöntii*. Immo & *fumus sulphuris* cum aliis per os attractus singulare est experimentum cujusdam *medici Hiberni*, quo aliquot desperatos phthysicos curavit, uti refert *Boyle*.

Vuillisi sententia.

Art. 505. Communis observatio est, regiones istas, sive in *Anglia*, sive in *Belgia*, ubi *cespite* ignes nutriuntur, & odorem valde sulphureum spirant, tabem rariùs infestare; quinimo loca ista phthysi obnoxiiis, aut ea laborantibus maximè salubria, & non raro sanativa existere; cui accidit quod suffumigium ex *sulphure* & *arsenico* (quod sulphure copioso refertum est) pro curandis pulmonum ulceribus penè deploratis remedium licèt ultimum; efficacissimum tamen habetur. Haud novi præstantius remedium in tussi quacunque, modò febris absit, quàm tinct. *sulph.* (sine empyreumate) *dof.* a gt. vj. ad x. manè & vesperi in coch. syr. idonei.

De virtutibus *cespitis cre. mari & aliorum remedia. rum.*

Sylvii sententia.

Art. 506. Nullum hætenus reperi medicamentum, quod vel externè vel interne usurpatum citius tutiusve non tantùm mundaverit, sed insuper consolidaverit recentia ulcera, atque *sulphuris balsamum*: cæteris verò omnibus imprimis præfero istud cum *oleo anisi* paratum, modò lentè paretur, ita enim longè gravior fiet, &

Latus balsami sulphuris anisati.

con-

convenientior, aliàs empyreuma redolet, & acrior existit. Insuper pus ipsum tenuius fluidiusque reddit, adeoque ipsius excretionem promovet, ac faciliat. Ad mundati ulceris consolidationem quoque multum laudari solent *rosa rubra*, *conserva*; & aliis præparationibus præter decoctum *rosarum rubr.* cum forti expressione pauco *saccharo* edulcoratum,

Farrago sententiarum.

Quibus
potissimū
tabes acci-
dens solet.

Art. 507. Tabes maximè fit ætatibus ab anno 18. usque ad 35. *Hippocr. aphor.* In aliis ætatibus evenire potest, at in isto vitæ stadio multò periculosior existit.

Phthisis
est morbus
contagiosus.

Art. 508. Phthisis est morbus *contagiosus*, per indusia, per vestes, per lintea, per lectos, phthisin communicatam fuisse mille docent exempla (inquit *Bonetus*) "extant quidem hujusce *con-*
,, *tagii* nonnulla exempla, sed, pace viri, non
,, sunt aded frequentia.

Ufus mer-
curii dul-
cis.

Art. 509. Quandiu tabes est in primo gradu, & probabile est sanguinem non esse extravasatum, ulcusque nondum factum, debet ante usum decocti. *ex lignis*, & dum *purgantibus* utimur, adhiberi *mercurius dul.* non quidem cum purgantibus simul eodem die, sed sine purgantibus post aliquot dies. *Pitcar. in MS.*

Acida in
phth. si.

Art. 510. Hoc constanter affirmo me contra omnium ferè scriptorum practitorum sententiam *acidis* temperatis felicissimè usum in curatione phthiseos (in hoc convenit auctori cum *Colebatch.*) *Barbette.* "Atque hìc liceat mihi obiter tantum men-
,, tionem facere *coaguli vitulini*, quo utuntur ca-
,, seo conficiendo, tanquam ferè unici acidi anima-
,, lis, non solum in hoc morbo, (maxime in Hæ-
,, moptisi); sed in nonnullis aliis, de quibus hic
,, non est dicendi locus, opem ferentis."

Coenulum
vitulinum.

Art. 511.

Art. 511. Quæro cùm in hydrope tussis vehemens moveri soleat, & elaterio sedari, annon eadem phthisis etiam elaterio, parce dato, tollatur; *Lister de hydrope*, p. 20. Dubitatur.

Art. 512. Remediorum sequentium vires & usus lector ipse expendat. *Antihellicum Poterii. Bals. sulph. anisat. nitr. saturnisat. Syrup. de peto. Sacchar. saturni. Aqua balsamica. Aqua limac. scorbut. aq. limac. pectoral. decoct. phthisic. express. milleped. simplex. Jusculum galli. Jusculum canceror. fluviat. Jusculum consummatum. Lixivium de calce. Loboc. myrrhisat.* (Phthisicis primo adhuc stadio optatissimum est, præstantissimumque profectò remedium. *Fuller.*) *Tinctura antiphthisica. Decoctum flor. bellidis major. Specificum habetur. Decoct. phthisicum, linimentum anodynum.*

Remedia
varia.

PHTHISIS NERVOSA.

Mortoni sententia.

Art. 513. Phthisis nervosa est absumptio corporis tabida sine febre, tussi, vel anhelatione insigni, appetitu tamen dejecto, & concoctione depravata, languent vires exhaustis carnibus & robore; aliquando *indigenis* accidit (immo nuperis annis sæpissime, ratio in propatulo est, scilicet, ex nimia spirituosorum liquorum indulgentia;) sed frequentius huc revertentibus ab insulis nostris in *India occidentali*. In principio habitus corporis œdematosus apparet, & quasi chylo spiritibus destituto distensus turget; facies pallet, ventriculus fastidit omnia exceptis liquidis; urina est pauca, & plerumque rubicunda, aliquando tamen, ut in aliis nervosis affectibus, pallida & copiosa; nulla adest febris aut dyspnœa, nisi in ultimo morbi stadio. Constat luculenter genus nervosum asseri (& primariò *ventriculum.*)

Phthisis
nervosa.

N

Art. 514.

Causæ
procathar-
ticæ.

Art. 514. Causæ *procatharticae* ut plurimum sunt graviores animi affectus, liquorum spirituosorum nimis libera ingurgitatio, aer insalubris, &c. (omnia etiam quæ cruditates, affectus *hypochondriacos* & *scorbutum* parere solent.)

Curatu
difficilis.

Art. 515. Et morbus reverà *chronicus*, &, nisi in ipso principio, curatu difficillimus; terminare solet in tumore *hydropico* incurabili.

Curatio.

Art. 516. Quod ad therapiam attinet in usum revocanda sunt medicamenta *stomachica* interna & externa, *chalybeata antiscorbutica*, *cephalica* & *amara*. Instituat^r purgatio cum *spec. hier. in aq. rut. ceras. nigr. & pæon. comp.* externè empl. *stomach. magistral.* cum *gt. aliquot cinam. & absynth. ventriculo.* In æstate *aq. minerales chalyb. dictæ*; inter *chalyb.* præparaciones *extractum myrsicht.* anteponendum est.

Atrophia
scorbutica

Art. 517. " Huic malo quoque affinis est iste, qui a *Vvillifio atrophia scorbutica* appellatur.
" p. 116.

Animi af-
fectus sa-
pissime
huius ma-
li causa.

Art. 518. " Mœror qui est animi dolor, & lu-
" cubratio nimia, quæ est ejusdem labor, ambo
" Phthisi plerumque viam sternunt, ast omnium
" quæ mihi hætenus nota sunt, nihil corpus a-
" deo velociter absorbit, ac *insanus amor*, quan-
" do *ambit & non exambit.*

Tabes reliquæ ab aliis morbis ortum ducentes,
aut ab iis quodammodo pendentes.

Mortoni sententia.

Phthisis
ab hæmorrhagia.

Art. 519. In phthisi ab hæmorrhagia, hæmorrhagia suppressa, velcatur æger juncula & gelatinas, & alios cibos bonum nutrimentum præbentes. Convenit *dieta lactea*; incipit plerumque æger in febrem hæticam, quæ *cort. Peruv.* profliganda est, ne in Phthisi pulmonari incurabili desinat.

Art. 530.

Art. 520. Phthisis a gonorrhœa vel fluore albo exorsa; confirmata cum sit, est prorsus immedicabilis; si recens fuerit, fluxus est sistendus, & æger cum euchymis nutriendus, & calor hæcticus, modò adsit, *dieta lactea*, aut aq. *chalybeata* extinguendus.

Art. 521. In Phthisi ab apostematibus & ulceribus; ulcus tempestivè sanandum est ope externorum & internorum, aq. calcis seq. sit pro potu ordinario; *4. Rad. sarsaparil. incis. ʒvj. uvar. Corinth. libb. infund. in aq. font. libxij. coq. ad dimid. in colatura extingue calcis viv. libb.* per residuum depurat. sit pro usu. Nisi habitus sit jamjam hæcticus *cathartica mercurialia* sunt usurpanda ad accelerandam ulceris curationem; immò excitare licet levem *ptyalismum* cum fructu; in usum veniunt *balsamica*, ut *syr. balsam. bals. Locatelli, Tolutan. &c.* suprèma cura adhibenda est, nè Phthisis pulmonaris sequatur; quamobrem a curato ulcere fiant *fontanellæ*, continuetur usus *balsamicorum, diætæ lact. acidularum, &c.*

Art. 522. Phthiseos a lactatu signa præfagientia sunt 1^o. Appetitus diminutio; 2^o. Spirituum languor & imbecillitas corporis 3^o. Oppressio hypochondriorum. Tempestivè ab lactandus est infans, & nutrix *diætæ lact.* committenda.

Art. 523. " Phthisis a diarrhœa vel dysenteria; a diabete; a salivatione, ab hydrope, & a sudore nimio nihil habent peculiare a morbis primariis & Phthisi in genere dicendum.

Art. 524. Phthiseos scrophularis signa diagnostica sunt plerumque tumores scrophulares & crudi in externo corporis habitu, accomitantes vel præcedentes, ophthalmiæ; aut scabies, & similes affectus scrophulares: (1277.)

Art. 525. Vitanda est *diætæ lactea*, utpote obstructiones pariens. *Radices scrophularia, filipendula, millepedes, &c.* cum *ingred. pulmonar. &c.*

Phthisis a
gonorrhœa vel
fluore albo.

Phthisis
ab apostematibus
& ulceribus.

Phthisis a
lactatu.

Phthisis a
diarrhœa
&c.

Phthisis
scrophularis.

Curatio.

balsamicis conveniunt. *Opium* rarissimè usurpandum est. (" Animadversum est a *Sculteto* mesenterium hoc malo semper primò esse affectum, & frequenter tumoribus strumaticis obsideri, sanis adhuc partibus externis: & in hoc casu difficile est quidem, nisi conjectura sola, morbum invenire, priusquam ægrum penè interfecerit. ") Convenit *emplast. de sapone* toti abdomini, &c.

Deco-
tillag.

Art. 526. " Est aliquid singulare in decocto, *fol. tussilaginis* ad hunc morbum curandum, etiam in ægris maximè deploratis, & fere desperatis. *Fulleri medicina gymnastica.* [v. locum p. 92. &c.]

Phthisis
scorbuti-
ca,

Art. 527. Phthiseos scorbuticæ signa diagnostica præcipua sunt eruptio macularum hinc insparlarum per universam cutem, secreatio ferè perpetua puris viscosi salsi a glandulis jugularibus præcipuè tempore maturino, exulceratio & extenuatio maxillarum.

Curatio.

Art. 528. Conveniunt *pectoralia incidentia* cum *antiscurbuticis*, ut summit. *pini*, *rad. oxylapath.* authoris *pil. balsamic. chalybeata. acidula*, &c. *opium* omnino vitandum est, ut & *dieta lactea*, & immodica *sumisuctio*.

Phthisis
asthmatic-
a.

Art. 529. Phthiseos asthmaticæ signa diagnostica sunt anhelatio, & spirandi difficultas: hæc autem Phthisis est valde chronica, & est Phthisis senectutis.

Curatio.

Art. 530. Omnia incrassantia sunt vitanda; pro sunt medicamenta *expectorantia*, *incidentia*, &c. ut *syrupus de erysimo*, e 5. *rad. millepedes*, *pil. balsam. nostr.* &c. *venæsectio* in paroxysmo *oxymel. scilicet.* & *aq. cinnam. fort. ana p. æ.*

Phthisis
hypochondri-
aca.

Art. 531. Phthisis ab affectu hypochondriaco vel hysterico a cæteris distinguitur symptomatibus his affectibus peculiaribus.

Curatio.

Art. 532. Curatio est fere ejusmodi cum aliis [præcipuè cum Phthisi scorbutica] conducunt *volatilia*, *chalybeata*, &c.

Har-

Harvei sententia .

Art. 533. In Phthisi ab hæmoptysi sanguis a pulmonibus ejectus sine dolore per tussim exantlatur; & si rupta fuerit vena, ut plurimum prima eruptione magna copia egeritur, & postea minori quantitate: in principio apparet tenuis, sincerus & floridus cum spuma flavescente; progressu temporis pallidior & aquosior evadit cum bululis; & postremò cum pure commistus excernitur. Qui per *diapedesin* expectoratur, dilutior est, & minus copiosus cum humore seroso vel purulento confusus.

Phthisis
ab hæmoptoe.

Ettmülleri sententia .

Art. 534. Hæmoptysis est quando sanguis ex pulmonibus per os tussiendo ejicitur; aliquando, sed rariùs, sine tussi; sanguis rejicitur vel floridus vel semigrumofus, facilè vel difficulter, cum vel sine dolore, spumofus vel non. Si ex pulmonibus provenit, sæpius *vomicam*, *empyema*, aut *peripneumoniam*, & hinc *Phthisin* post se trahit.

Hæmoptysis :

Art. 535. Convenit *venæsectio*, *purgatio* vitetur; *diuretica* & *diaphoretica* locum habent; *opiata* sunt perquam proficua; in specie semen *hyosciami* est nobile specificum tam veteribus quàm modernis commendatum, cavendum est tamen in ejus usu ob vim narcoticam ne exhibeatur in nimia dosi; sed tutius est propinari repetitis vicibus; maniam etenim inducit nimis larga dosis. Respiciendum est ad acrimoniam sanguinis in hujus mali cura, hoc facto, quæ in capite de *hæmorrhagia* tradita sunt, hîc locum habent. *Hedera terrestris* est plane mirabilis, item succus *urtice*, *catechu*, *trochisc. de carabe*, *oleum lini* cochleatim sumptum mira præstat, *ol. vitriol. succ. cydon. decoct. hord. cum passul. min.*

Cura :

Acciden-
talis vel
habitualis.

Art. 536. "Hæmoptysis est vel *accidentalis* vel *habitualis*; posterior est Phthiseos signum: cor-
,, tice Peruv. optimè & tutissimè curatur. astring-
,, gentibus sistitur, ut *bol. armen. sang. dracon.*
,, *lapid. hæmatit. &c.* Morton.

Remedia
y-42.

Art. 537. Mantissa. *Elect. Boylean. elect. Pe-*
ruv. astring. elect. styptic. emulsio styptic. haust.
japon. loboch. japon pulv. hæmoptoicus, stypticum
regis. Syrupus Boylean. succur urtic. menth. sed
præ reliquis heder. tereft. "In hæmoptoe *acciden-*
,, *tali* desperata, cæteris incassum tentatis, (si-
,, cut in aliis omnibus hæmorrhagiis) medici ex-
,, pectationem rarissimè frustratur sequens reme-
,, dium; ʒi. *Aq. plantag. vin. rub. astring. ana*
℥ss. syr. papav. errat. ʒij. ol. vitriol. quantum
lingua ferre potest; f. julap. suffitus ex calce viv.
O *acet. in extremis eximè confert.*

Mortoni sententia.

Phthisis
a chlorosi
vel mensi-
bus ob-
structis.

Art. 538. In Phthisi a chlorosi vel mensium
obstructione non nisi in principio *chalybeata* ten-
tanda sunt; calorem enim hecticum adaugent, &
sanguinem exagitant; sed potius *pulmonaria*, &c.
sunt usurpanda.

Phthisis
a pleuritide,
&c.

Art. 539. Phthisis a pleuritide vel peripneumo-
nia malè tractata, julapiis contemperantibus, ex-
pectorantibus, venæsectione, acidulis, &c. tra-
ctanda est, vel si sit empyema *paracentesi*. *Mil-*
lepedes, decoct. *sars. sal. succin. diuretica*, &c.
Historia prima hoc morbo laborantis est insignis
& notatu dignissima, vide locum.

Phthisis
ab ictero.

Art. 540. Phthisis ab ictero non curatur nisi
sublato morbo primario; ideoque remediis *anti-*
ictericis oppugnanda est.

VOMICA PULMONIS

Vvillifii sententia.

Art. 541. Rara est mentio hujus affectus apud
 authores. Vomica Pulmonis plerumque accidit si- Vomica
pulmonis.
 ne febre aut phlegmone, immò sine tussi immani,
 aut sputo, tacite ac velut improvisè in pulmone ge-
 neratur, & non rarè non priùs se prodit, quàm pa-
 tientem interimit. Latet (inquit *Tulpius*) inter
 initia ita clanculum, ut vix ulla sui proterat indi-
 cia, præter tussiculam, primò siccam, mox humi-
 dam, qua aliquamdiu continuante, trahitur diffi-
 culter spiritus, deficit anima, & emarcescit paula-
 tim corpus, licèt interim nec sanguinem præ se fe-
 runt sputa, sed si rumpatur nec opinanti vomica,
 occiditur (dictum ac factum) homo. Ita interdum
 solet contingere; verùm novi plures, qui ex Pul-
 monis Vomica sensim orta, maturata, & demum
 rupta, pus copiosum & foetidum expuissent; cum-
 que tale sputum per multas hebdomadas, imò men-
 ses quotidie excernentes debiles aded & velut tabidi
 evaserint, tandem medicamentorum ope, cum ul-
 cus detergeretur & siccaretur, integrè convaluisse.
 Ab abscessu in Pulmone exoritur, & pus sæpissime
 insigniter foetet, eoque differt a sputo, quod in pe-
 ripneumonia & phthisi ejicitur. Causæ remotio-
 res latent, neque per signa ulla *pathognomonica* di-
 gnosci queat hicce morbus, neque prognosis insti-
 tuti potest, antequam ictu ferali se prodit.

Art. 542. Post Vomicam disruptam medendi Curatio.
 methodus ferè eadem est ac post sectionem *empy-
 matis*, aut in *phthisi* incipiente; in hoc casu *lac
 asininum* sæpe prodest; observavi quoque *fonta-
 nellam* in latere excitatam non rarè insigniter pro-
 fuisse. Historias quasdam adducit author, de qui-
 bus consulendus est. p. 205.

Baglivii sententia.

Baglivius
vomica
accuratè
describit.

Art. 543. Tuberculo Pulmonum laborantes de cætero benè se habentes, difficulter spirare incipiunt, inter spirandum non stertunt, & nihil expuunt, dolorem quoque in pectore sentiunt continuum, & dolentem in locum decumbere non possunt, sicca tussi laborant, tandem genæ rubent, febricula supervenit; & negotio ad suppurationem vergente alia suppurationis symptomata accedunt. Duo tamen tanquam *pathognomonica* crudi & adhuc incipientis tuberculi signa sunt, *tussis sicca*, & *dolor lenis* in alterutro pectoris loco; & quamdiu quidem tuberculum adhuc crudius fuerit, dolorem exilem & tussim siccam inducit. Qui tuberculo Pulmonum laborant, sæpissimè derepente moriuntur; nam suppurato tuberculo pus erumpit in trachæam, & suffocat: hinc quod longius a trachæa, & Pulmonum centro distat, ed minùs periclitantur de suffocatione; pus enim in cavitatem pectoris erumpet, aut per urinas eliminabitur.

Ettmulleri sententia.

Differen-
tia inter
vomica
& phthi-
sin.

Art. 544. Vomica Pulmonum & phthisis in eo saltem differunt, quòd Vomica sit *ulcus Pulmonum clausum* seu *abscessus*, phthisis *ulcus sordidum ex abscessu jam aperto*: nam in Vomica interdum pus est laudabile, quod suis membranis inclusum citra excretionem in Pulmonibus hæret, & etiam sine tussi aliquando existere queat. A tumoris intus ruptione exsolutio, vomitus, & animi deliquium fit. *Hippocratis Aphorism.*

ASTHMA.

A S T H M A.

Floyeri sententia.

Art. 545. Asthma est respiratio difficilis & laboriosa cum scapularum elevatione & sibilo, a compressione, coarctatione, vel obstructione vasorum pulmonalium. Estque vel *continuum* vel *periodicum*. Asthma *continuum* pendet a compressione venarum & vasorum bronchialium & vesicularum pulmonalium vel nervorum, 1°. Propter pectoris hydropem. 2°. Empyema, phlegmonam, abscessum vel tuberculum. 3°. Polypum in vasis sanguiferis, sanguinis ipsius coagulationem, varicem, plethoram, obstructions catameniorum, hæmorrhoidum, fonticulorum, ulcerum, psoræ, &c. 4°. Lapides in trachæa generatos. 5°. Obesitatem nimiam, vel intumesceniam thymi. 6°. Gibbam. 7°. Pulmonum adhæSIONem. 8°. Nimiam pulmonum intensiONem a cursu [vociferatione,] &c. 9°. Hydropes, tumores visceris alicujus insignioris. 10°. Coli vel ventriculi inflatiONem. 11°. Paroxysmos apoplexiæ, vertiginis, lethargi, serum extravasatum nervos opprimens. 12°. Tumores pulmonum flatuosos, quemadmodum accidit in *equis ilia ducentibus*, vulgò *broken, winded, Horses*.

Asthma
definitio.Asthma
continui
causa.

Art. 546. Asthma *periodicum* pendet a compressione vasorum & vesicularum bronchialium mediante halitu flatulento, & morbis sequentibus pleurumque succedit; 1°. Febris intermittentibus, variolis, peripneumoniis. 2°. Catarrho. 3°. Affectionibus hysteriis. 4°. Ephemeræ, a sex non naturalibus, maximè aeris mutationibus subitaneis, pendenti. 5°. Cacochymia glutinosæ, flatulentæ, in ventriculo prognatæ, ibique inflatiONES excitanti, & denique inflatiONem in pulmonum vesicu-

Periodici
causa.

veliculis producenti. Atque hoc est *verum Asthma flatulentum periodicum*.

Asthmatis
periodici
paroxys-
mi ple-
rumque
sunt regu-
lares; con-
tinui non
ita.

Art. 547. Observandum est Asthmatis *continui* paroxysmos frequentes esse, a nimio corporis motu, vel errore in diætâ inductos, vel noctu recurrentes; sed hi recursus non sunt aded regulares ac in Asthmate *periodico*, ubi decimo quoque die redeunt paroxysmi. Circa horam 2^{am} vel 3^{iam} pomeridianam a prandio asthmatici sentire solent coarctationem vel inflammationem circa scrobiculum cordis vel os ventriculi, quod tunc temporis flatibus distenditur, & ructus insipidos copiose emittit; atque hæc ventriculi inflatio est primum signum appropinquantis paroxysmi, hanc sequitur sanguinis effervescencia, & huic proxima spirituum in pulmonum nervis & membranis expansio seu rarefactio, quippe rigidi & inflati sentiuntur.

Paroxys-
mi dicitur
pau.

Art. 548. Hora prima vel secunda matutina paroxysmus sensim obrepit; respiratio evadit lenta, & mox angusta: si paroxysmus futurus sit brevis, nempe duarum, vel trium horarum, & æger e lecto surgat, dyspnœa brevi facessit, & expuit *crudum* quendam & *glutinosum* sereatum, instar *albuminis ovi* vel solutionis *gum. tragacanth.* tam in Asthmate *humido* quam in *hysterico* (*sicco* vel *convulsivo*); hæc autem materies lineis nigris seu filamentis discriminatur; si verd diuturnior futurus sit paroxysmus, viz. duarum, trium vel quatuor dierum, primis diebus parum aut nihil expectoratur, sed 3^o. vel 4^o. die materia purulenta, magis cocta, & non aded glutinosa, coloris albicantis, viridescantis, vel flavescantis, & in morbo inveterato saporis dulcis, instar sanguinis aut glycyrrhizæ, vel etiam saporis putridi, salsi, aut acidi, & frequenter cum filamentis sanguineis. Intra spatium 3. 4. aut 5. dierum paroxysmus prorsus finitur, & exinde parum aut nihil expuitur ante novi paroxysmi exorsum.

Art. 549.

Art. 549. Plures & diuturniores occurrunt paroxysmi in *æstate* quàm in *hyeme*; ego ipse viginti in *æstate*, & tantùm sedecim in *hyeme* sustinui; in *Augusto* severiores semper; quanto diuturniores paroxysmi, tanto maiora intervalla, & vice versa; Intervalla breviora mecum fuerunt 2. 2. 4. 5. 6. vel 7. dierum; longiora 8. 9. 10. vel 14. dierum; calor lecti morbum exasperat; extremum frigus est tolerabile sine injuria. Magna pallidæ urinæ copia in paroxysmo excernitur, sed sub finem rubicundior evadit cum sedimento crassiore. Quanto parcior & tenuior sit victus in paroxysmo, maximè in principio, tanto melius; minor erit quantitas chyli ad pulmopes missi, & materia purulenta citius coquetur & evacuabitur, carnes itaque sunt omnino prohibendæ. De victu convenienti & improprio *vide locum* p. 90.

Art. 550. Ad unum scopum potissimum dirigenda est cura, nempe ad *temperandam effervescentiam*: malum etenim ipsum est quasi *catarrhus*, ideoque propinanda sunt remedia *incidentia* minùs *calida*: *Venæsectio* quotiescunque repetita solummodo levamen præsentaneum affert, senibus asthmaticis maximè perniciofa est: ad *cachexiam* enim & *leucophlegmatiam* viam munit.

Art. 551. *Acetum scilliticum* ad omnes flatulentias a *Galeno* valde commendatur; sensus acuit, respirationem facilem reddit, coctionem juvat, alvum laxat, urinam movet, flatus dissipat; & præ omnibus contra asthma ægregia præstat. Sequens est syrûpus asthmaticus declinante paroxysmo sumendus, dos. coch. j. manè & vesperi; 2℥. *Syr. de erysim. prass. balsam. ana* ℥ij. *oxymel. scillit. aq. brion. ana* ℥j. *bals. Peruv.* 3℥. m. *Cortex Peruvianus* ad avertendum paroxysmum multùm laudatur. *Agua simplex* cum *pane tosto*, additis paucis *nitro* & *sal. ammoniaco*, copiosè epota, & hor. decubitus *acet. scillit.* ℥ij. mecum frequentissimè adventum paroxysmi

De paroxysmis
observa-
tiones var-
iæ

Indicatio
curativa
generalis

Remedia
varia ab
auctore
compro-
bata.

xyfmi eluserunt. Et *oxymel. nostr. cum rad. zedoar.* &c. vid. Pharm. *Fulleri*. Eundem ad plures menses protelavit. *Hypnotica* ad compescendam inflammationem multum valent (in asthma *convulsivo*) testibus *Riverio* & modernis plerisque, inter quos clarissimus *Gibbons*. Mihi in frequenti usu fuit haustus seq. *℥℥. Aq. papav. ℥iij. sal. prunel. ℥℥. syr. papav. ℥vj. m.* In paroxysmo omnia calida sunt maximè perniciofa, acida blanda sunt magis proficua, ut *mala aurantia, limonia, citria, fructus berber. acetum ol. sulphuris per campan. &c. ℥℥. Conseru. acetos. cynosbat. rob. berber. ana ℥j. crem. tartari ℥iij. syr. limon. q. s. m. f. elect.* pro pauperibus *posca, gas sulph.* (i. e. aqua fumo sulph. saturata) , quod remedium est maxime efficax. Semel atque iterum exhibui medicamenta *mercurialia* in hoc morbo cum felici eventu, sed hoc fuit in *leprosis*. De virtutibus *aceti* vide locum p. 183.

Vuillisi sententia.

Asthma
convulsi-
yum.

Art. 552. Observare licet graves asthmatis paroxysmos sine quavis notabili pulmonum labe accidisse, reverà ut putaverim hunc morbum aliquando esse merè *convulsivum*: paroxysmo etenim finito, quin etiam priusquam incipitur, respiratio libera & æqualis satis rectè ducitur, nullaue tussis, aut valetudinariæ pulmonum dispositionis signa apparent. Hujusce morbi varias adducit *historias*. Ad hujus generis asthma curandum medicamenta *antispasmodica*, potiùs quàm *bechica* vel *pneumonica* adhibenda sunt: p. 92. *Millepedes* in hoc affectu egregia præstant.

Prognosis
& Cura-
tio.

Art. 553. Asthma inveteratum difficillimè aut vix unquam curatur, magnum tamen a medicamentis juvamen accipit, in deterius vergens, aut *phthisin* aut *hydropem*, aut affectum quendam *soporosum* vel *convulsivum* minatur. Extra paro-

paroxysmum *peffloralia* cum *antispasmodicis* conjungantur. Laudantur *spiritus gum. ammoniac. cum sal. ammoniaco distillat. dos. a gr. xv. ad xx. tinctur. sulph. &c.* sed maximè *sp. gum. ammoniac. vires extolluntur*. p. 213. "De viribus visci arbor. vid. 69" [Art. 389.]

Etmulleri sententia.

Art. 554. Adest in omni Asthmate respiratio frequens laboriosa & difficilis cum anxietate circa præcordia; adest sæpe tussis, interdum crebra & molesta, interdum non, interdum adest stertor, interdum sine stertore *orthopnoea* laborant. Asthma dividitur in *humidum & siccum*, sive in manifestum & occultum; prius expectorationem materiæ purulentæ conjunctam habet, alterum est merè *convulsivum*: verùm interdum hi asthmatici, in fine paroxysmi, aliquid licet parum muci emittunt, quod non causa peccans est, sed ex conatu respirationis circa laryngem & fauces aliquid colligitur, quod evacuatur: causa materialis asthmatis *humidi* aut in pulmonibus est mucus viscidus, vel pus in vomica, empyema, phthisis, &c. vel serum pulmones copiosius inundans, vel sanguis in motu impeditus; aut in stomacho & primis viis ex cruditatibus, cachexia, &c.

Asthma
humidum
& siccum.

Art. 555. Probè observandum est an Asthma sit *Curatio*
morbus *primarius* vel *secundarius*; si *posterior* respiciendum est ad morbum a quo pendet. In paroxysmo Asthmatis *humidi* optima omniùm sunt *vomitiva*, nec est quidd exinde metuatur suffocatio, dyspnœam insigniter tollunt; in Asthmate *siccò* quoque extra paroxysmum cum fructu propinantur *cathartica*, in paroxysmo neutiquam conveniunt; malum etenim exasperant. *Venæsectio* locum habet solummodo in Asthmate ex vitio sanguinis orto.

to. *Opiata* in Asthmate *siccò* multum conferunt, in *humido* suspecta sunt. In Asthmate *humido*, præsertim in senibus laudatur *syr. nicotiana*. Succus *raphani* est potentissimum expectorans. Gum. *amoniacum* est optimum remedium: *Sperm. ceti* a ʒß. ad ʒj. in paroxysmo multum levamen adfert. Denique *millepèdes* in utroque Asthmate est remedium omnem laudem exsuperans. Pro curando Asthmate *siccò* live *convulsivo* conducunt in genere *antiepileptica*, *antihysterica*; *antispasmodica* & *opiata*, *cinnabarina*, *sal. succin. castor. &c.*

Farrago sententiarum.

Coffee.

Art. 556. Potio *coffee* omnium maximè certissimeque inflationem mirum in modum cicurat & compescit in ipso paroxysmo. *Musgrave*.

Epispastica,

Art. 557. " In paroxysmo diuturniori & periculofo convenient *vesicatoria* præcipuè tibiis applicata; ex *Hippocratis* præcepto.

Remedia varia.

Art. 558. Remedia sequentia judicio prudentis medici permittuntur. *Flor. benzoin. dos. a gr. v. ad xij. nitrum saturnisatum*: *Serum sinapium*. *Sp. nitr. dulc. decoct. expectorans*. *Emulsio asthmatica*. *Emulsio Brunneri*. *Expressio asthmaticæ expressio mulled. hydromel. Joelis* (in Asthmate *humido*) *loboch. viride* (in moribundis) *mistura expectorans*: *Oxymel, asthmatic. Floyeri*.

C A P U T V.

Sive Fasciculus Morborum quintus.

M O R B I C O R D I S.

Art. 559. **C**OR variis Morbis gravioribus obnoxium esse, & reverà affici ex descriptorum sectione satis patet. In Historia Medica occurrunt exempla *vermium* in ipsis ventriculis latitantium, item *calculorum* ibidem reperorum. *Tumores scirrhusi* & id genus alii Cor occuparunt; *apostemata*, *abscessus*, & exinde *sordida ulcera* ipsam Cordis substantiam & auriculas obfuderunt. Omnes Cordis Morbos absolutè lethales non statim existimandum est; contrarium etenim ex *Bartholomæi Cabrollii* observatione constat. Ipse ego (inquit) præsentè *Rondeletio* duo mirabilia satis in duobus cadaveribus exhibui, in uno in basi Cordis ad coronariam *cicatricem* duos latoſ digitos longam detexi; in altero *ulcus* in Corde latitudine folii myrtini sat profundum. *Observ. Anatom. 26.* In adolescentis cadavere [inquit *Cheselden Anat. p. 160.*] magnam vim puris in pericardio; & Cor ipsum exulceratum inveni. Et in homine tabidè mortuo pericardium undiquaque Cordi adhærens, & portio ipsius Cordis ossilacta, ferè unius digiti lata, reperta sunt.

Cordis
Morbi.

Art. 560. Verisimillimum est medicos interdum hallucinari inflammationem cordis cum peripneumonia confundentes: æquum est enim, ut supponamus, cor inflammatione tentari, secus vix credibile est suppuraciones & ulcera ibidem existere nisi præeunte inflammatione. Dies meliùs docebit.

Inflam-
matio
Cordis.

Art. 561. Quo circa quoties propria Cordis substantia

stantia

stantia constitutione aliqua præternaturalis afficitur, æque solliciti debent esse medici ac in morbis hepatis cerebri, neque negligenda sunt media, quæ aliarum partium Morbis similibus subvenire solent.

Remedia
ad Ves-
ices.

Art. 562. Vermiculos & in corde & in capsulis ejus gigni extra dubium est; & Morbus hic virginibus familiaris est. Noscitur ex puncturis & doloribus Cordis, & convulsio plerumque est signum diagnosticum. *Remedia mercurialia* hic præ cæteris prosunt, immo *argentum vivum* in substantia exhibitum est maximè efficax. *Hartman.*

PALPITATIO CORDIS:

Vvillis.

Palpitatio
cordis est
Morbus
convulsi-
vus.

Art. 563. Palpitatio Cordis est motus ejus (*convulsivus*) adeo vehemens & immanis, ut non solum tactu manifestius percipi, verum & oculis conspici, imò interdum ad distans quoddam audiri possit. Porro ab authoribus fide dignis narratur ipsas costas interdum effringi, aut in junioribus foras propelli, p. 102. &c. de hoc morbo egregiè scripsit *Vvillifius*.

Etmulleri sententia.

Causæ
sunt va-
riæ.

Art. 564. Causæ sunt variæ, aliquando excrementiæ verrucalæ Cordi adnatæ, ossificatio arteriæ magnæ propè cor, vermes in ipso Corde, aut pericardio, abscessus in corde, status sanguinis præternaturales, polyposæ concrementiæ, calculi, flatus, ataxia spirituum animalium affectum spasmodicum faciens, (chlorosis seu pallidi virginum morbi, catameniorum obstructio.)

Curatio
est diffici-
lis.

Art. 565. Quæ a scorbuto aut affectione hysterica ortum ducit, est curabilis; quæ a reliquis cau-

cau-

causis ut plurimum incurabilis. Cavendum est ab opio, venesectione in dubium vocatur, (Galenus vero, de locis affect. capitis, instat urgente paroxysmo venesectionem omnibus remediis præferendam esse.) Cura aggredienda est martialibus, coralliatis, cinnabarinis, volatilibus, & succinatis. Ol. cinnam. laudatur a Lindano. Rosmarinus, crocus, camphora, ambra, moscus, sal. volat. viperin. (& alia viperina) castoreum, verbo uno antispasmodica. "Si diutius protrahatur, periculum ostendit repentinæ mortis. Qui hoc morbo in juventute tentantur, nunquam senescunt," ex observatione Galeni.

Art. 566. Medicus peritus de usu sequentium, quomodo & quando benè novit; "aurum mosaic. cataplasma stomach. emplastr. stomach. fofus spirituosus, julap. moschat. mistur. hysteric. spirituos. saccul. stomach. tinctur. epileptica, hæc ex Pharm. Fullerii. Item, Pulv. ad guttet. sp. C. C. succinat. sp. lavend. comp. &c. Vide etiam remedia ad singultum (372.)

Remedia varia.

TREMOR CORDIS.

Vuillifii sententia.

Art. 567. Tremor Cordis est carniū ejus convulsio spasmodica, seu potius trepidatio, quæ fibræ motrices celerrimè, ac tantum semicontractæ vices occissimas, verum abruptas & quasi dimidiatas efficiunt.

Tremor Cordis descriptio.

Art. 568. Ad curam quod attinet, tria remedium genera maximè proficua esse solent, viz. resæacea, chalybeata, & sale volatili prædita.

Curatio

Ettmulleri sententia.

Cum pal-
pitatione
Cordis fre-
quenter
confundi-
tur.

Art. 569. In tremore Cordis pulsus inæqualis est, & languidus, subinde virium ingens prostratio & imbecillitas juncta esse solet, & cor tremulo motu vibratur, adeo ut Tremor Cordis pertineat quodammodo ad *lipothymias*: pulsus aliquando est vermicularis, pauca apud authores prostant de hoc affectu seorsim, quoniam ordinariò cum *palpitatione cordis* confunditur.

Plerumq;
est mor-
bus secun-
darius.

Art. 570. " Est potius plerumque *symptoma* alterius morbi, quam morbus *primarius*; ideoque causa exquirenda est diligenter, & morbus *primarius* inveniendus, & cura pariter instituenda.

L I P O T H Y M I A, S Y N C O P E,
& Asphixia.

Ettmulleri sententia.

Horum
affectuum
differen-
tia.

Art. 571. Hi affectus differunt saltem gradualiter non essentialiter. *Lipothymia* est [gravis languor] cum insigni spirituum defectione. *Syncope* est gravius animi deliquium, non multum ab *apoplexia* distans; atrociora adsunt symptomata, ægri inopinatò concidunt, sensus & motus abolentur, respiratio vix ulla, aut pulsus, partes corporis frigent & pallent cum sudore frigido. In *asphixia* omnia hæc sunt adhuc graviora, ita ut cum pulsu planè abolito, & aliquamdiu ad sensum cessante, ægri instar mortuorum jaceant.

Causæ.

Art. 572. Horum affectuum causæ reliquæ, præter evidentes, quales sunt evacuationes nimis, balneationes nimis longæ, potus frigidus post corporis incalescentiam, animi pathemata, &c. sunt ut plurimum obscurissimæ, ut sunt *cordis abscessus*, *polypi*, *vermes*, &c.

Art. 573.

Art. 573. Indicantur *spirituosa* ; *volatilia* , & *aromatica* , *ol. cinnam. ambra* , præ omnibus *sal. volat. viperarum* , *aq. cordial. citr. croc. castor.* (*spir. carmin. sylv.*) externè *sp. sal. ammoniac. ol. succini* , *fumus succini* ; aliquando confert *venæsectio* .

Art. 574. “ In syncope facies in colorem cadaveri rosum mutatur , dentes , os atque manus tam ar- , Et clauduntur , ut vix recludi possunt , pulsus , ferè nullus & vix ulla manifesta respiratio ; sudor , frigidus erumpit , & externa frigent : atque his , signis diagnosticis ab *apoplexia* facile distinguitur .

Art. 575. Frequenter ex *polypo* Cordis ortum du- , cit . *Vesperis* crurum fibrosorum ramos ulnæ , longitudinem superantes extraxit a scœmina car- , diacæ *syncope* interempta : talem in juvene cavi- , tatem venæ cavæ ferè implentem reperit , & in , aliis quamplurimis .

Art. 576. “ *Sternutatoria* naribus immittenda , sunt , *cardiacis* & *volatilibus* imprimis incuben- , dum est , dum est , *cucurbitulæ* sunt affigendæ .

POLYPUS CORDIS.

Malpighii sententia .

Art. 577. Polypi nomen a substantiæ *piscis* simili- , tudine ortum , peculiari cuidam tumori in nari- , bus excitato adaptari cœpit , donec observata qua- , dam in præcordiis luxuriante materia ; novus hic Cordis & vasorum morbus jam nunc audit . Figuram sortitur loci in quo generatur . Moles Polypi major est ut plurimum in dextro Cordis ventriculo quàm in sinistro ; in dextro autem color est subalbidus , laridi intar , seu excreti succi , quem vulgò pituitam appellamus , & interdum rubra quædam vel subnigra stigmata confersa habet : in sinistro autem colorem plerumque atrum ,

& densiorem obtinet substantiam . Morbosa hæc excreſcentia ſuam ſtructuram habere videtur , etenim præ ſe fert congeriem ſuperpoſitarum extenſarumque pellicularum , quæ ſubſtantiæ modo nervolum corpus cum aliquali tamen mucoſitate referunt , & ſi eadem laceretur , ſolvi videtur in oblonga & ſolida filamenta ; hæc maniſeſtiora red- duntur in ejus appendicibus , quæ ſaſciculi inſtar in fibras quaſi nerveas reſolvuntur . Ex tota concreti ſanguinis mole , grumofa pars appellata , aſuſa licet purpura , multiplicibus lotionibusq. cum factis rubicundæ illæ particulæ detergentur , & ſanguis concretus tractu temporis albefeſcit , & ejus contexturam planè fibroſam & reticularem oculis certè armatis videre licet ; & hæc eſt materia procul omni dubio , ex qua generantur Polypi . *Malpighius de polypo Cordis* , p. 158. &c. conſulendus eſt author , qui hujus morbi *ætiologiam* & deſcriptionem longè optimam litteris mandavit . “ De polypis in auriculis & ventriculis Cordis hydropicorum repertiſ (vid. *Art.* 823.)

Cauſa eſt
frequenter
mortis re-
pentinæ ;

Art. 578. “ Concreſcentiæ polypofæ in *apoplexia* demortuis frequenter inveniuntur ; & procul omni dubio plerumque ſunt cauſæ plurimorum *ſymptomatum* atrociffimorum , necnon *mortis inopinatæ* raro deprehenduntur aptequam ægrum jugulant ;

C A P U T VI.

*Sive Fastidialis Morborum sextus.*C R U D I T A S A C I D A
& Nidorosa.*Ettmulleri sententia.*

Art. 579. **M**Orbi plerique, præcipuè chronici, a depravata coctione originem ducunt; *chylificationis læsæ*, duo sunt vitia insigniora, cruditates in coctione, viz. *cruditas acida & nidorosa*. Chyl. fræctio læsa.

Art. 580. *Cruditas acida* est, quando alimenta abeunt in liquamen acidum fixum plus minus viscidum, nec sufficienter attenuatum, & volatilissimum, fundamentum & origo morborum chronicorum. Cruditas acida.

Art. 581. *Cruditas acida* cognoscitur ex soda, ructibus acidis & copiosioribus; quæ rejiciuntur per vomitum vel natura vel arte, sunt admodum crassa, viscida, ac pituitosa; alvus plerumque adstricta est. Signa cruditatis acidæ.

Art. 582. *Cruditas acida* corrigitur per *absorbentia & acidum destruentia, ac aromatica volatilia, nucem moschatam, zinziber, sp. C. C. &c.* Destructo in hunc modum acido *purgantia* demum adhibenda sunt: nisi enim hæc methodus observetur, nihil per purgantia evacuabitur sed tormina & motus convulsivi excitabuntur. *Ufus cancerum fluviatilium* mirè proficiuus est, ut & *Gelastina, C. C. &c.* Curatio.

Art. 583. *Cruditas Nidorosa* est; quando alimenta corrumpuntur ita ut abeant in liquamen putrilaginosum horridi saporis & odoris, & omnino nutritioni ineptum, quod vocatur *Nidor*, exhalant Cruditas nidorosa.

ructus graveolentes *Nidorosi*. Appetitus est index, qui loquitur, & monstrat quasi, quæ sunt assumenda; hinc nobis inculcat *Hippocrat. in aphorism.* quod appetita facilius longè digerantur, quàm non appetita. Verum est proverbium; *quod sapit, nutrit.*

Signa cruditatis nidorosæ.

Art. 584. Ingestio variorum alimentorum ad Cruditatem *Nidorosam* disponit. Masticationem qui negligit, *Arabibus* animam suam odile dicitur. Conqueruntur ægri de dolore gravativo stomachi duobus horis post pastum; item de ructibus 5. vel 6. hor. post alimentorum assumptionem, iisque non acidis, sed nunc insipidis, nunc putridis, nunc sulphureis, nunc genuinum saporem & odorem assumptorum repræsentantibus; mox post pastum adest rubor faciei, quasi essent ebrii. [585.]

Signa cruditatis nidorosæ.

Art. 585. Cruditatis *Nidorosa* ructus habet foetidos, aut saltem horridos instar ovorum frigorum, aut piscium putridorum; percipiunt imprimis manè saporem peregrinum & abominabilem, quasi cinereum, seu ligni putridi, quem sufficienter exprimere nequeunt. Subinde amaror cum *cardialgia* & aliquali *nausea* percipitur, ex ore & stomacho; quæ vomitu rejiciuntur, sunt liquida, flava, & omnino insipida, aut quodammodo amaricantia, aut insipida dulcia, aut ex amarore dulcescentia; præterea habent alvum sæpius plus solito aperitam. " Cruditatis *Nidorosa* juxta veterum principia est *intemperies ventriculi calida*, in qua omnia assumpta mutantur in bilem; signum hujus est sapor tetricus in ore, incipiente vel peracta chylificatione.

Intemperies ventriculi calida.

Curatio.

Art. 586. Quoad curam convenit vomitus aut saltem evacuatio per *rhabbarum* & *tamarindum*; post horum exhibitionem mirè conducunt *julapia acidulata*, *succus aurantiorum*, *citrorum*, *elixir proprietatis acid. sp. salis dulcis*, *vitriolata*, &c.

Nota bene

Art. 587. " Probe notandum est (ut therapia rite

„rite instituat^{ur}) ægroto incumbere non modo
 „remediorum sibi præscriptorum usui, ut decet,
 „insistere, sed quoque cane & angue pej^{us} su-
 „gere alimenta sibi noxia fomitem causis mor-
 „bificis, & mala exacerbantia. Qualis erit dieta
 „petendum præcipue ex nocentibus & juvantibus,
 „in quæ itaque diligenter dirigere oportet
 „medicum,

Art. 588. Flatus in stomacho & intestinis sunt ^{Flatus.}
 per fermentationem vitiosam ab acido præterna-
 turali in subiecto viscido excitatam. “ In cura-
 „tione omnem paginam absolvunt *digestiva* &
 „*evacuantia* cum victu regulari,

Art. 589. “ *Ventriculus* corporis *culina* appel- ^{Apepsia.}
 „lari potest: ejus officium est alimenta recipere
 „tanquam in promptuarium, eademque conco-
 „quere est ejusdem actio primaria; unde *apepsia*,
 „*sive indigestio* est totius œconomix ruituræ in-
 „dubitata denuntiatio,

Art. 590. Digestio est opus simpliciter naturæ, nec ^{Digestio,}
 arte promoveri potest; opus naturæ saltem adjuva-
 re possumus & fermentum ventriculi corrigere ita,
 ut in statum naturalem reducatur. Propinanda
 sunt *vomitoria*, *cathartica*, &c. postea *stomachicis*
 & *corroborantibus* insistendum est. “ Mirum vide-
 „tur in quibusdam somnum, in aliis exercitium,
 „coctionem promptiorem ac faciliorem reddere,
 „quod tamen monet quotidiana experientia.

Art. 591. Remedia stomachica, & ventriculum <sup>Remedia
stomachi-
ca.</sup>
 roborantia insigniora sunt, quæ sequuntur. *Men-
 tha*, *absynth.* utrumque, *aromata*, *zedoaria*, *gra-
 na piperis integra deglutita* (ad cruditates acidas)
rad. belenii, *calami aromat.* *raphani rusticani*, *ari*,
plebeia quidem, sed optima *stomachica*, *succus sy-
 don.* [cum fumo *sulphuris* servatus,] *tincturæ* ex
amaris & *aromaticis* [cum *ol. sulphuris* per cam-
 pan. extractæ] *pulvis pepticus* ex *pelle interio-
 re ventriculi gallinæ*, & *tinctura* ejusdem, *chaly-*

beata, cortex Peruvianus, cortex aurant. citr. conditus, item zinziber, & allium conditum, tartarum vitriolatum, tinctura sacra, elixir proprietatis, aqua gentian. comp. absynth. comp. spiritus menth. syrupus cydoniorum, rob. & miva eorumdem, species diambrae, crusta panis vino generoso ebria & cum pulv. N. M. caryoph. &c. conspersa, & ita instar scuti stomacho tepidè applicata, &c.

„ Stomachica alia celebriora & in praxi Londi-

„ nensi usitata sunt Elixir magnum vitrioli,

„ tinctura stomach. amar. Quincii ad imitationem

„ Stoughroni; vel sequens, quæ præstantior vi-

„ detur.

“ ʒj. Cort. aurant. sic. ʒj. rad. gent. ʒij. sem. car-

„ damom. min. zedoar. ana ʒj. caryoph. croc. ana ʒj.

„ cochinel. ʒʒ. sp. vin. Gallic. ʒʒ. f. tinctura f. a. vel

„ infusum sequens.

“ ʒj. Rad. gent. ʒij. summit. absynth. Rom. p. ij.

„ calam. arom. ʒʒ. cubeb. ʒj. cort. aurant. ʒij. in-

„ fund. in aq. bullient. ʒxx. colatur. add. aq. ab-

„ synt. mag. comp. ʒij. misce; vel

“ ʒj. Rad. gent. zedoar. cassmunar. sem. carda-

„ mom. min. ana ʒj. cort. flav. aurant. sic. ʒij. in-

„ fund. in aq. bullient. ʒʒ colatur add. aq. gent. ma-

„ gis comp. ʒij. sp. lavend. comp. ʒʒ. misce.

In omnibus ferè imbecillitatibus & morbis ven-

„ triculi masticatio rhabarbari conducit, præcipuè

„ in alvum habentibus adstrictiorem.

“ Item, Electuarium e zinzib. mistura stomach. &

„ julap. stomach. Et pro ulu externo Fetus stomach.

„ epithema, scutum, sacculus emplastr. roborans, ex

„ Pharm. Fulleri, quandoque usurpari possunt.

Art. 593. “ Stomachica debent esse temperata,

„ (ut rectè annotavit Vvaldschmidius) nè fortiori-

„ bus remediis calorem nimium vel augeamus vel

„ extinguamus, & ne fermentum reddamus acrius

„ vel debilius, hinc præstat pauca dosi & per in-

„ tervalla remedia stomachica exhibere, quàm

„ uno impetu ventriculum remediorum mole ob-
 „ ruere.

Art. 594. Nausea & vomitus. In genere vo- Nausea &
vomitus.
 mitus omnis, qui non est *nimius*, ut plurimum
 est *salutaris*.

Art. 595. In omni vomitu unice observetur, Curatio.
 ut *alvus*, quantum fieri potest, teneatur *aperta*.
 Ad vomitum sistendum conferunt *cydoniata*, *syr.*
et tinct. coral. præ reliquis *succus cydon. sp. menth.*
sal. absynth. cum succ. limon. &c. Externè *de-*
coct. absynthii, menth. cort. granator. flor. ros. rub.
&c. in vino rub. coct. *sacculus croci* ventriculo
 admotus egregiè vomitum sistit, ut & cataplas-
 mata ex *fermento et pulv. aromaticis*. In genere
 præmissis ritè universalibus *stomachica* (592.) sunt
 usurpanda; *decoct. fracastr. elect. zinzib. julap.*
stomachicum, coral. mistur. stomach. “ In vomi-
 „ tionibus ab emetico fortiori excitatis (teste *Vvald-*
 „ *schmidio*) si detur *coch. j. spiritus vini*, vomi-
 „ tum in momento compescet.

Art. 596. Vomitus *cruentus* frequenter a pan- Vomitum
cruentum.
 create oritur, quando, scilicet, vasculum ejus a
 succo acriore corroditur, ex irritatione duodeni
 partim sursum in ventriculum propellitur, par-
 tim inferiùs defertur, dolor gravativus & obtusus
 in superiori lumborum regione, ubi situm est pan-
 creas, præcedere solet. Non rarè decipiuntur me-
 dici, qui vomitum materiz *nigricantis* habent pro
cruento. In vomitu *cruento* *Hæmorrhoidum* flu-
 xus est *salutaris*; est enim *evacuatio* quasi *vica-*
ria.

Art. 597. “ Ipse ventriculus quandoque gravif- Pericul-
sum me-
lum.
 „ sumis *Hæmorrhagiis* obnoxius est. Et reverà vo-
 „ mitus sanguinis a quacunque causa oriatur, pe-
 „ riculo haud vacat. *Nimia sanguinis* ejusmodi
 „ effusio intra ventriculi parietes vel extra cor-
 „ pus *ejectio* mortem subitanèam interdum in-
 „ fert; vel si sanguis in ventriculo extravasatus
 „ restat,

„ restat , ibidem grumescere solet & corrumpi ;
 „ inde graves *Lipothymia* & *suffocationes* crean-
 „ tur. “

Remedia
ad vomitum
eructum.

Art. 598. Remedia in hoc affectu sunt succus
urtica , *sem. hyoscyami* , *catechu* , *lap. hematit.*
 cum *blandis acidis* , aut succ. *cydon.* Aliquando
 etiam pus excernitur , & per vomitum rejicitur .
 Convenit *antimon.* *diaphoret.* *antihect.* *Poterii* ,
sacchar. saturni , *haustus japonicus* *Fulleri* , *tin-*
ctura antiphthifica , &c.

Anxietas
præcor-
diorum.

Art. 599. *Anxietas præcordiorum* est insignis
 dolor circa scrobiculum cordis . Malum hoc ori-
 tur semper ab affectu plus minus orificio ventri-
 culi sinistro .

Cardial-
gia.

Art. 600. *Cardialgia* est ventriculi orificii supe-
 rioris dolor admodum molestus & intensissimus ;
 oritur ex effervescencia succorum heterogeneo-
 rum , maxime bilis , unde percipiuntur phlogo-
 ses , & insignis ardor . Causæ hujus mali sunt va-
 riæ , bilis vel succi pancreatici vitia , lumbrici ,
 ulcus orificii ventriculi , &c.

Curatio.

Art. 601. Dosis *theriac.* *Andromach.* egregium
 est *anticardialgicum* . Cura ut plurimum inchoan-
 da est cum vomitorio , & postea opiata cum pur-
 gantibus admiscenda sunt . *Tinctur. sal. tartari a*
gutt. xl. ad l. item pulv. testac. cum castor. oleum
amygd. dulc. est maxime efficax ; laudatur decoct.
saltatr. externæ linimenta , *empl. e tacamahac. ca-*
ran. & *balsam. Peruv.* “ *Pulvis interioris pelli-*
 „ *cule ventriculi musculosi gallinae ad ʒj. in ve-*
 „ *hiculo appropriato est efficacissimum remedium*
 „ *huic malo [inquit Sharrv.]*

Anorexia.

Art. 602. *Anorexia* sive inappetentia est , quan-
 do ægri destituuntur desiderio ad alimenta . Ra-
 tio habenda est morbi alicujus tanquam causæ , un-
 de *indicationes curativæ* petendæ sunt , & postea
stomachica [592.] sunt usurpanda , &c.

Malacia
& pica.

Art. 603. *Malacia* est appetitus nimius , unde
 inter-

interdum plus, quàm conducit, comeditur. *Pica* est appetitus insuetorum, ut crudæ animalium carnis, carbonum, calcis vivæ, &c. " In virgibus *chlorosis Pica*, vicissimque *Pica chlorosis* sovere solet. *Pica* est affectus chronicus, & non infrequenter ad *hydropem*, *cachexiam*, vel *marasmodum* viam sternit. Non solum virginibus accidere solet, sed plerumque gravidis quoque; iis verd non adeò perniciosa est. " Hi affectus oriuntur ex depravato stomachi fermento; ideoque *evacuationibus* & *stomachicis* sunt curandi.

Art. 604. *Bulimus* seu appetentia canina, est *Bulimus*, voracitas nimia; ægri copiosè deglutiunt alimenta, sed non commipunt; est affectus plerumque ab extremo ambientis aeris algore progenitus, in cibi fastidium brevi desinens. *Appetentia canina* est semper cum vomitu vel diarrhœa, " Præcipua cura in diætâ est querenda. Omnia pingua & dulcia temperata illis profunt, ut & leniter purgantia. "

A Surfeit.

Art. 605. " *Crapula*, per quam intelligo id, *Crapula*, quod nostro idiomate vocamus a *Surfeit*, est mala corporis habitudo cum sensu gravitatis ad ventriculum, & ægritudine; supervenire solent plerumque *Eruptiones cutaneæ* & *febricula*: Causa usitatior hujus affectus est edilium vel potulentorum nimia voracitas; ingesta autem non minus qualitate quàm quantitate peccabili lædentia, esse possunt; aliæ quandoque etiam sunt causæ, uti potio nimis larga frigidæ vel cerevisiæ tenuis æstivo tempore, exercitium nimis violentum, fervida ac sulphurea aeris constitutio, & similia. *Eruptiones cutaneæ* sunt de genere *Erysipelatoso*, quod ordinariò appellamus a *Rash*.

Art. 606.

Curatio :

Art. 606. " In omnibus hisce affectibus , &
 „ præcipuè a Crapula propriè dicta originem du-
 „ centibus vomitorium quàm primum est propi-
 „ nandum , & si febris nondum invaserit dosis tin-
 „ cturæ hier. die proximo exhibenda est. Si eru-
 „ ptiones in conspectu veniant, sustentandæ sunt
 „ cardiacis ; & lenibus diaphoreticis ; potus sit
 „ serum lact. vino Canariensi alteratum , & aliàs
 „ infusum salviæ . In habitu plethorico , ubi fe-
 „ bris intensior fuerit , *phlebotomia* locum habere
 „ potest .

CHOLERA MORBUS.

Sydenhami sententia .

Cholera
morbi de-
scriptio .

Art. 607. Malum ex se cognoscitur : adsunt e-
 nim vomitus enormes , ac pravorum humorum
 cum maxima difficultate & angustia per alvum
 defectio ; ventris ac intestinorum dolor vehemens,
 inflatio & distentio , cardialgia , sitis , pulsus eeler-
 cum æstu & anxietate , nausea , artuum contra-
 ctura , extremorum frigiditas , animi deliquium ,
 &c. " Bilis suprà infraque magno impetu prorum-
 „ pit , primum liquidior , pallida ; & subflava ;
 „ dein crassior , majoremque colorem exhibens ,
 „ flavum scilicet , prasinum , cœruleum aut etiam
 „ nigrum .

Methodus
medendi.

Art. 608. Pullus tenerior elixetur in aq. font.
 eong. circiter iij. *hujus decocti* cyathos plenos ex-
 hauriat æger , eodemque tempore injiciatur *enema*
 ejusdem liquoris semel atque iterum , vel ad 3^{am},
 4^{tamve} vicem ; his addi possit *syr. portulac. lactuc.*
violar. &c. Exantlato hoc eluvionis penso detur
paregoricum . Si vires ægri exhaustæ fuerint , &
 valde debilitatæ ante adventum medici ita , ut ex-
 tremæ frigescant , recto cursu ad *laudanum* con-
 fugiendum est. Vix ultra *Augusti* limites evagatur .

Estimul-

Ettmulleri sententia.

Art. 609. In genere qualiacunque symptomata Prognosis.
 fortem ac deleteriam antimoniam purgationem,
 aut helleborum album sequuntur aliudve cathar-
 ricum, ea similiter obvia sunt in cholera. Cho-
 lera, quæ sponte sua sine causa manifesta externa
 corripit ægros, ut plurimum est funesta. Est ma-
 lum peracutum intra 24. horas, biduum, vel tri-
 duum, jugulans, periodum ferè observat tertiana-
 riam, ita nempe ut de 3^{io} in 3^{um} diem moveatur,
 seu plus minus exasperetur; quò magis excremen-
 ta a *statu naturali* recedunt, eò periculosior. Cho-
 lera aliquando est *epidemica* & valde *maligna* &
lethalis.

Art. 610. "Remedia petenda sunt ab *Art. de* Remedia
 „ vomitu, de *diarrhœa*, &c. causa morbi, si in qualia.
 „ veniri possit, benè pensitata. Vires decocti
 „ rad. *ipæacœan.* tentari merentur. Vid. *dysen-*
 „ *teriam*."

ALVI RETENTIO.

Ettmulleri sententia.

Art. 611. Alvi retentio cùm sit pertinacior, Alvi retentio causa mille malorum.
 frequentius est causa mille malorum, dolorum ab-
 dominis variorum: interdum nausæ & vomitus,
 affectuum capitis, cephalalgie, vigilie, vertigi-
 nis, &c. "Familiaris est spleneticeis, nephriti-
 „ cis, hystericeis, arthriticis, literatis, scorbuti-
 „ cis, &c."

Art. 612. convenit *oleum amygd. dulc.* vel per Curatio.
 se vel in jusculo ad ʒij. vel iij. decoct. *tamarind.*
 in sero lactis; *gum. ammoniacum.* *Aurum fulmi-*
nans cum extracto *hellebor. nigr. sal. gem.* in cly-
 steribus ad ʒiſs. vel ʒij. multum laudatur ad fæces
 indu-

induratas fluxiles reddendas; item clysmata oleosa ex ol. lini, ol. raparum, ol. oliv. &c In alvo pertinaciter obstructa conducit balneum ex emollientibus & linimenta.

Boerhaavii sententia.

Tartarus
crudus.

Art. 613. Vires tartari crudi in medicina optimæ sunt, cremoremque & crystallos superat viribus ad absterfionem primarum viarum; vix sua indole secundas vias ingreditur; ob crassitiem & indissolubilitatem; nec invenit tantum liquidi in illis, quantum ad sui solutionem requirit. Si autem humoribus alcalinis occurrit; solvitur penitus, non a liquido, sed a solo alcali occurrente; qui duo sales faciunt tunc optimum salem dissolventem; si vero dissolvitur ab aqua; est aded crassus ut per pannum non transeat quid, quod transeat per lactea; & si fortè solvitur a bile, aliove forsan liquore, non agit ut Tartarus; sed ut sal neuter, vel sapo: hinc multos morbos ex vitio pituitæ, & vitio primorum viscerum egregiè tollit, debet verò dari ad drachmas sex ex jussulo recenti. *Angelus Sala, chymicus candidissimus*, qui integrum tractatum, ubi sua arcana, cunctis medicis desiderata, revelat, de viribustartari scripsit; laudat illum in colicis doloribus, diuturnis obstructionibus primarum viarum, hysteriis, podagra, &c. Sed dabat ad unciam unam, unde purgabantur per duos aut tres dies; hoc continuabat optimo cum successu; nam non intrat sanguinem, sed pondere & stimulo optimè agit; ergo reliquam massam sanguinis non turbat, sed saltem alvus diluitur, & emollitur sæx, cum alia purgantia post operationes suas relinquunt semper alvum adstrictam.

Quomodo
de præca-
vendæ est.

Art. 614. "Novi plures ventri constipationi obnoxios curatos fuisse diluculo, & hora priùs
„ assue-

„ assueta citius lecto assurgendo: quantum enim
 „ a perspiratione solita adimitur, tantum ad al-
 „ vum lubricandam additur. “ *Vvillis*. “ Qui al-
 „ vum habent sicciorē (inquit *Vvaldschmidius*)
 „ nunquam se manē studiis applicare debent, vel
 „ foras procedere; nisi alvum prius deposuerint;
 „ vult enim sæpius moveri alvus segnior.

„ *Art. 615.* “ Quibus, dum sunt juvenes, (in- Aphorism.
 „ quit *Hippocrates*) alvi sunt humidæ, iis sene-
 „ scentibus siccantur: quibus verò, dum sunt ju-
 „ venes, alvi sunt siccæ, his senescentibus hume-
 „ stantur. Melior est autem in juventute alvus fu-
 „ sior, in senectute adstrictior. Obstructo inferio-
 „ re ventre (inquit *idem de flat.*) in universum
 „ corpus flatus discurrunt.

„ *Art. 616.* “ In act. philosoph. No. instantiam Historia
 „ singularem habemus cujusdam hominis nomine
 „ *Phelips*, qui per plures annos non nisi semel in
 „ 19. vel 20. diebus alvum exonerabat, nihilomi-
 „ nus, quoad cætera bene se habuit: obiit tamen
 „ vigesimum tertium agens annum.

ALVI FLUXUS.

„ *Art. 617.* “ In genere quod ad alvi fluxum at- Alvi fluxus in ge-
 „ tinet, aliquando cibi nondum cocti aut imper-
 „ fectè cocti per alvum dejiciuntur. & appellatur
 „ *lienteria* vel fluxus *lientericus*; aliquando chy-
 „ lus excernitur, & dicitur *caliaca*, aliquando hu-
 „ mores excrementitii, bilis, pituita, &c. excer-
 „ nuntur, & vocatur simpliciter *diarrhæa*; postre-
 „ mò quandoque dejectiones sunt sanguinolentæ
 „ cum vel sine intestinorum exulceratione, & ap-
 „ pellatur *dysenteria*.

D I A R R H Œ A .

Definitio *Art. 618.* "Diarrhœa est frequens & copiosa
 „ per alvum materiæ tenuis, aquosæ, mucosæ,
 „ pituitosæ, spumosæ, adiposæ, biliosæ, nigri-
 „ cantis &c. excretio, ab intestinis provenientis,
 „ aliquando cum, aliquando sine excrementis,
 „ frequenter sed non semper torminibus stipa-
 „ tur.

Etmulleri sententia.

**Ventricu-
lus primus
omnibus
est corro-
borandus** *Art. 619.* In cura diarrhœæ ex quacunque causa
stomachus est corroborandus, & *sudorifera* cum *aci-
da absorbentibus* sunt admiscenda. Diarrhœa oleo-
 sa & pinguis (si non ex assumptis) ex colliquefa-
 ctione pinguedinis corporis oritur.

Cutatio *Art. 620.* In omni diarrhœa potus debet esse par-
 cus. Ad ventriculum restituendum convenit *vi-
num ustum cum aromatibus*, *vinum absynth.* & ma-
 ximè *cydoniata*, & externè *fotus*. Sistendus est ef-
 fervescentium humorum imperus; hoc facto, ces-
 sat diarrhœa. Decoctum *rad. tormentil.* egregium
 est in omni diarrhœa & dysenteria, tam *benigna*
 quam *maligna* & omnibus aliis medicamentis præ-
 cellit. *Fructus cydon.* & speciatim *mespillorum co-
rumque mirra* maximè laudantur; *gelatina C. C.* in
 potu ordinario soluta est admodum specifica in diar-
 rhœis *epidemice* grassantibus, ut & *gum. Arab.* (in
 decoct. alb. solut.); si adsint *tormina* vehementiora
 & *tenesmus*, convenit enema ex *lacte tepido* & *the-
riac. Androm.* In diarrhœis *habitualibus* per longum
 tempus durantibus conveniunt internè imprimis
martialia & *aromatica* stomacho grata, imò *ther-
ma*. Diarrhœa pertinax & diu durans *radice Ip-
pecacuannæ*, quemadmodum *Dysenteria*, debi-
 tis intervallis aliquoties repetita curanda est,
 non

**Diarrhœa
habitualis.**

non neglectis interim aliis appropriatis remediis.

Baglivii sententia.

Art. 621. Mœror nihil aliud frequentius producit quam Diarrhœas, quæ, diu persistente mœroris causa, evadunt incurabiles, iisque demum superveniente febre erratica & atrophia, ægrotantes e medio tollunt. Ad iram pariter diarrhœa supervenit, & si hæc non superveniat, febris superveniet dummodò ingens fuerit ira. p. 129.

Farrago sententiarum.

Art. 622. Indusium laneum magnopere conducit ad curandam diarrhœam *habitualement*. *Vvainvvrigh*. Ut & *equitatio* seu *vectio in rheda*. *Fulleri med. gymnast.* Observandum est, appetitu & concoctione salvis, vix unquam nocere diarrhœam.

Art. 623. Narrat D. *Vvalker* in obsidione *Derria Londinensium* nupera milites ed redactos fuisse, ut compositionem quandam ex *sebo & amylo* liberaliter sumplerint, unde non modò nutrimentum, sed & medicamentum egregium habuerunt, nempe diarrhœæ *curationem* in his, *prophylacticum* in illis, idque miraculosè & infallibiliter.

Art. 624. Opium (sagaciter observante *Cockburn*) parum aut nihil facit in cura *Diarrhœæ seorsæ*; & reverà res, si propius illam inspiciamus, & ad calculum accuratè vocemus, ita se habere videtur. Opium plerumque dolorem sedat, & somnum conciliat, & dejectiones rariores reddit, sed tamen copiosiores sunt & æquè tenues ac liquidæ, ut antè, &, quod probè notandum est, magis foetentes.

Art. 625. Remedia sequentia quandoque prodelle possunt, *laudan.* *liquid.* *cydoniat.* *cataplasma*. Remedia varia.
P *stomach.*

stomach. epithem. stomach. sctus astring. saccul. stomach. decoct. catechu, comp. decoct. fracastr. decoct. sistens, elect. corinth. enema de malicorio, expressio rosac. mistur. coral. elect. ad diarrhœam.

LIENTERIA & COELIACA.

Lienteria
& Cœliaca.

Art. 626. Lienteria & Cœliaca videntur esse diarrhœa cum insigni apepsia seu coctione ventriculi depravata conjunctæ; ideoque earum cura partim cum diarrhœa convenit, præcipuè quoad evacuantia in principio propinanda: hic etenim super alia quovunque radix ippecacuan. & rhabarb. locum habent, nec omitti debent.

Estmulleri sententia.

Lienteria
quid.

Art. 627. Lienteria est alvi fluxus, in quo assumpta prout fuere ingesta, aut parum immutata per alvum egeruntur. "Dolor ventriculi est Lienteriæ comes indissolubilis, & ægrotum post partum semper magis excruciat, donec alvum exoneraverit. Urina est pauca & valde colorata." Lienteria scorbutica est malum periculosum curatu difficile, & facile recidivans; ad cachexiam & tabem disponit.

Curatio.

Art. 628. Imprimis stomachus præ omnibus est roborandus. Rhabarbarum propinari debet; coral-liata & cydoniata valde laudantur; in genere omnia in vomitu usurpata hic conducunt. "Stomachicæ simpliciores & paratu faciliores (inquit Vvaldschmidius) sæpius plus præstant, quam compositæ: v. g. nux moschata condita, zinziber conditum, vitellus ovi cum aceto coctus, vinam absynth. ex mastiche parata, &c.

Cœliaca
quid.

Art. 629. Cœliaca est alvi chylosa excretio, quando assumpta digeruntur quidem in stomacho, sed digesta sub forma chylosa cum excrementis excre-

excernuntur; ventriculus ut plurimum est saluus, & appetitus, sed hoc non semper; per alvum excreta sunt albitantia vel grisea, aut saltem pallida. Est malum satis grave & periculosum.

Art. 630. Aromatica blandiora & amara ap- *Curatio*
primè conveniunt; astringentia malum exasperant.
“ Deobstruentia procul omni dubio indicantur &
„ martialia cum amaris. Præmissa tinct, rhabarb.
„ dosi una vel altera, elegantem puellam ab hoc
„ malo diutius laborantem liberavi cum tinctur.
„ mart. & vino amaro sequenti; ʒi. Rad. zedoar.
„ ʒi. gentian. ʒiiss cort. aurant. ʒiij. vvinteran.
„ ʒiij. myrrh. pulv. ʒi. flor. cham. p. ij. centaur.
„ min. p. j. N. M. mac. ana ʒi. Infund. frigide
„ in vin. alb. Hispan. ʒiiv. coletur usus tempo-
„ re. “ Forestus valde commendat pulverem *pel-*
licula interioris ventriculi gallinae in Coeliaca pas-
 sione; ut etiam pulverem *integræ nucis moscha-*
tæ in vitello unius ovi exhibitum in Lienteria.

D Y S E N T E R I A,

Sydenhami sententia,

Art. 631. Dysenteria cum rigore & horrore ag- *Dysent.*
greditur, calor sequitur; & deinde ventris tor- *fia,*
mina cum defectionibus mucosis, quibus pro-
gressu temporis intertexuntur sanguinis lineamen-
ta quædam cum dolore insigni; sanguine aliquan-
do destituuntur, & nihilominus (modò frequen-
tes sint defectiones cum ventris torminibus & col-
lævie mucosa) rectè vocabitur Dysenteria. Si
sanguis sincerus evacuetur, vita ægri periclitæ-
tur.

Art. 632. Venæsectio quamprimum celebretur, & *Methodus*
exhibeatur haustus paregor. eadem nocte, dein- *medendi.*
de catharticum lene bis repetitum, & paregor. hor.
4. vel 5. post sing. purgationes: potus ordinarius sit

lac coctum cum aq. tripl. vel decoct. alb. Si morbus præfractior sit, detur *laudanum* 8. quaque hora etiam in majore dosi, & injiciatur enem. ex *lacte vaccin. & theriac. Androm.* ʒß. ubi vires *venæsectionem* non patiuntur, detur singulis matutinis bolus ex *rhabarb.* ʒß. cum *q. s. diascoridii & paregorici* cum hora somni.

Infantes eodem modo tractandi sunt diminuta dosium quantitate. Methodus in *cholera morbo* (608.) in hoc quoque laudatur, ut & *diata lactea*.

Vvillisi sententia.

Dysenteria incruenta.

Art. 633. Quamvis dysenteria vocabulum communi acceptione alvi fluxum cruentum, sicut diarrhœa humoralem denotat; tamen morbus *Londinensis* anno 1670. Dysenteria appellabatur, incruenta licet. Fuit affectus ille subitaneus & frequenter absque manifesta occasione invadens; laborantes cum vomitu immani & sedibus crebris & aquosis citò in maximam debilitatem inque spirituum horrenda deliquia & virium omnium prostrationes redigebat. Novi plures pridie satis sanos, & valde robustos, intra xij. horas morbi hujus tyrannide adeo dejectos, ut cum pulsu debili & exili, sudore frigido, &c. jamjam moribundi viderentur, & quidem non pauci ab eo citò interibant.

Curatio.

Art. 634. Pro curatione hujus morbi nulla evacuatio juvabat; verùm remedia tantùm *cardiaca*, eaque calidissima commoda fuerunt, in tantum, ut *sp. vini* cum sacchar. parum deflagratus remedium populare & quasi *epidemicum* fuerit, atque in tali Dysenteria ferè semper proficuum: etsi in altera cruenta indifferenter usurpatum sæpe noxiumprehenderetur. Ego exhibui satis feliciter *theriac. androm.* ʒiß. cum *julap. cardiac.* & ventriculo placentam ex *pane tosto & theriac*, illinito vinoque generoso

neroso immerfam applicari jussi, aut loco *theriaci*:
Androm. pulv. seq. ʒi. Pul. e *chel. cancr. comp.*
 e *contrayerv. serpent. virg. ana* ʒi. *cinnam. rad.*
tormenil. ana ʒʒ. *croc. cochinel. ana* ʒi. *dos.*
 ʒij.

Art. 635. De descriptione dysenteriae verè *cruenta Londinensis* vide authorem, pag. 49. laborantes haud citò interibant, quin plures septimanas, imò interdum menses sanguinem quotidie in magna copia excernebant, &c. In his dejectiones fuerunt liquidæ, & sanguine diluto tinctæ, instar loturæ carniū, in aliis crassiores cruore saturatæ, ac insuper mucō albicante, & non rarè membranarum frustis refertæ, &c. de remediorum formulis consulendus est author. p. 50. & 52.

Dysenteria cruenta.

Estmulleri sententia.

Art. 636. Dysenteria est diarrhœa cruenta. Hujus morbi tres sunt differentiae. 1. Quando sine intestinorum vitio mero motu & impetu naturæ ex plethora sanguis bonus excernitur tanquam in fluxu *hemorrhoidali*, scorbuticis familiaris est. 2. Quando sanguis tenuis & aquosus loturæ carniū similis excernitur, fluxus *hepaticus* dicitur, sed revera a valis hæmorrhoid. internis provenit. 3. Tertia species dysenteriae est, quando ob vitium intestinorum spasmodicum cum insignibus torminibus, & cum mucō albescēte, hinc cum purulenta materia sanguis ejicitur, atque hæc κατ' ἐξοχλὴ dysenteria appellatur, diarrhœa cruenta tormentosa; reliquæ species ferè semper sunt absque torminibus. Est vel benigna sine febre & contagio, vel maligna cum febre & maximè contagiosa. In gradu acerbissimo *caruncula*, (signum ut plurimum lethale) quæ excernuntur cum materia purulenta, quid sint explicatu obscurum est; non enim nisi in Dysenteria diuturniori fit

Tres differentiae.

Caruncula. Id est cum materia purulenta.

intestinatorum excoxiatio, & forsan exulceratio aliqualis; adsunt aliquando *aphthæ*, & intestina ipsa *gangræna* afficiuntur, ex qua serè omnes, qui Dysenteria laborant, moriuntur. " Omnes qui
 „ Dysenteria moriuntur, (teste *Vvaldschmidio*)
 „ *sphacelo* pereunt, ipsis intestinis *sphacelatis*;
 „ quod observatur triduo ante mortem, ubi sitis
 „ non magis urget, & extrema frigent.

Curatio.

Art. 637. Cura inchoanda est cum *opiat*is & *sudoriferis* & *absorbentibus*, præmissa tamen dosi *rhabarbari* semper in Dysenteria *benigna*, in *maligna* verò eadem methodus observanda est, ac in aliis febribus continuis *malignis*; tinctura *bezoardica* laudatur. *Astringentia* in principio malum exasperant, in declinatione locum habent cum cautela. *Venasectio* & *clysteres* non conveniunt. Summa habenda est ratio *stomachi* externis & internis, uti in quibusvis alvi fluxibus. Priapum *cervi* tanquam specificum extollitur. Semper propinetur *gelatina C. C. pulv. cran. human. & usinea*. *Album grac.* pro pauperibus est insignè remedium, item succus *heder. terrest.* & *cydoniata*, *lac chalybeatum*, in quo *rad. symphit. maj.* coctum fuerit, *gum. Arab. trag. &c.* sed præ omnibus *sacchar. saturni*, & *viperina* (in Dysenteria *maligna*.) *Balsam. Peruv. aut terebin.* in *clysteribus* aliquando est proficuum. *Oleum lini* præsentaneam præstat operam. Accuratè distinguendum est inter *flux. dysenter.* & *hemorrhoid.* (1263.)

Remedia
varia.

Art. 638. " De viribus *rad. ipecacoan.* est res nota; sed præstat ejus *decoctum* propinare, quam
 „ *radicem* in substantia. In Dysenteria *serum lactis* serè specificum; *Bagliv. 242.* & alibi. *Radix ipecacoanhæ* præter vim *vomitariam*, quam
 „ obtinet, *sudores* copiosos excitare solet. Atque
 „ in hoc (inquit D. D. *Freind*) quantum ego conjectura assequi possum, præcipue consistit egregia illa in Dysentericis affectibus virtus, quam
 „ sibi

„ sibi præ aliis vomendi instrumentis vendicat .
 „ Grassante Dysenteria (inquit *Dolæus*) hoc uni-
 „ co medicamento plus centum feliciter curavi-
 „ mus, oleo, scilicet, *amygdalar. dulc.* cum suc-
 „ co *citri* commixto, sæpius de die assumpto,
 „ præmisso tamen *rhabbarbo* tosto; *diaphoretica*
 „ semper interponi debent in hoc morbo curando,
 „ inter quæ eminent *tinctura bezoardica* & *mi-*
 „ *stura simplex*. *Nux moschata* est egregium *an-*
 „ *tidyntericum*: prosunt *gelatin. C. C. ol. rha-*
 „ *barbari, cydoniata. &c.* Fungosa substantia nu-
 „ clei lobos intercedens & separans exsiccata &
 „ pulverisata in vino exhibita modica quantitate
 „ exercitum *Anglicanum in Hibernia* gravissima
 „ Dysenteria medicorum omnium solertiam elu-
 „ dente laborantem feliciter liberavit. *Raii Hist.*
 „ *plant. J. Aubrey* communicavit. Repetitis ex-
 „ perientiis (inquit *Toune* in *Traçtatu de Mor-*
 „ *bis Barbade*) sequens electuarium in Dysen-
 „ teria successu felicissimo exhibui: *℞. Conserv.*
 „ *ros. rub. ʒiʒ. sperm. cet. ʒj. cer. flav. ʒiij ol. a-*
 „ *mygd. dulc. ʒʒ. syr. e cort. citr. q. s. m. f. elect.*

Art. 639. “ Sequentia quandoque locum habent, Alia non-
nulla.
 „ *cataplasma stomach. decoct. Fracastor. enema bal-*
 „ *samicum* (expetitissimum planè remedium) *ene-*
 „ *ma de malicorio; enema ad tormina; epithema*
 „ *stomach. fofus ad colicam; fofus stomach. tinct.*
 „ *rhabarb. Sennertus* de hoc morbo copiosè & pul-
 „ chrè scripsit.

Art. 640. Tenesmus in genere est assidua cupi- Tenesmus.
 ditas per alvum egerendi; parum mucosum, aut
 viscosum, aut cruentum aut purulentum, aut ni-
 hil omnino excernitur; pars affecta est intestinum
 rectum aut sphincter musculus. Tenesmus pro-
 ducitur a Dysenteria, hæmorrhoid. verm. ascarid.
 calculo in vesica, &c. Fofus *lactis tepid.* (cum *flor.*
sambuci incoct.) tenesmum lenit. *Enem. emol. cum*
lumbric. terrest. &c. incoct. (est exoptatissimum

remedium) item enema ex *jure carn. vervecin.*
&c.

Fluxus he-
paticus.

Art. 641. Fluxus *hepaticus* veterum est merum non ens, est enim fluxus *hemorrhoidalis* e venis hemorrhoid. vide *Dysenteriam*.

Remedia
varia.

Art. 642. Conveniunt remedia *hemorrhagiarum* supprimentia, imprimis *martialia*. Decoct. e *lignis* (cum *aq. calcis*) *gelatina C. C.* item *passula majores*, &c.

COLICA BILIOSA.

Sydenhami sententia.

Colica bi-
liosa.

Art. 643. Colica Biliosa est intestinorum dolor atrocissimus præ cæteris omnibus, intestina nonnunquam quasi injecta fascia constringit; nunc in punctum contractus quasi terebello perforat: subinde remittitur dolor, mox recrudescit paroxysmus, quem æger præsentens vultu miserabili atque ejulatu ceu præsentem exhorret & averſatur. Sub initio hujus morbi non ita certò ad unum aliquod punctum determinatur dolor, atque in ejusdem progressu, neque tam crebra est vomituritio, neque alvus ita pertinaciter cathartico- rum vim eludit; quò autem magis augetur dolor, eò obstinatiùs in puncto figitur, vomituritio succedit frequentior, & major-alvi adstrictio, donec tandem ab ineluctabili horum symptomatum vi totalis peristaltici intestinorum motus inversio (nisi maturius quis tulerit suppetias) atque *iliaca passio* procuratur. Quæ hoc morbo excernitur materia, sincera si fuerit atque *purpurea*, viridis aliquando, aliquando etiam flava aut insoliti ejusdem coloris spectatur.

Quomodo
a nephri-
dislin

Art. 644. A *nephritide* sic distinguitur. 1. Dolor nephriticus fixus in rene est, & ab eo ad testem exporrigitur secundum longitudinem ureteris, Colicus

Colicus verò vagus est & cinguli instar medium ventrem affligit. 2. A pastu Colicus dolor auge-
tur, nephriticus potius imminuitur. 3. In Colico dolore ab excretionem per alvum & vomitum ma-
jus levamen emergit, quàm in nephritico. 4. In dolore nephritico urina primùm clara & tenuis,
postea aliquid subsidet, & tandem arenulæ aut la-
pilli excernuntur; in Colica urinæ in initio cras-
siores existunt.

Art. 645. Ad curam ritè instituendam *sanguis e* Methodus
medendi.
brachio paulò liberius quamprimùm educatur, &
post horas iij. vel iv. *anodynum* exhibeatur: po-
stero die *catharticum lenitvum* & interposito die
uno ad tertiam vicem propinetur. *Aq. epidem.*
mirab. vel quæcunque alia *cardiaca*, postquam
longo morbo vires plurimùm exhaustæ fuerint,
aliquando mirum in modum juvant. Equitatio,
quemadmodum in pluribus morbis chronicis quod
maximum est præstat, hîc quoque cæteris non
proficientibus curationem nonnunquam absolvit.
„ Aliud exercitii genus in hoc affectu equitatio-
„ ne longè efficacius in *Barbada* habemus [in-
„ quit *Toune*] viz. *navigatio circa insulam*. Vi-
„ dit quosdam in deploratissimo infirmitatis statu,
„ cùm aliam qualemcunque gestationem ferre non
„ potuerunt, hac ratione, ultra quàm quod crea-
„ dibile est, restitutos.

Purcellii sententia.

Art. 646. Colica est dolor ventris atrocissimus, Morbi de-
scriptio.
quandoque totum abdomen occupans, aliquando
ad unum punctum determinatur cum cruciatu
quasi terebrante, interdum de loco in locum im-
mutatur, nonnunquam videtur sensatio tanquam
viscerum cum funibus simul correptorum; in-
tumescit aliquando torus venter ita, ut quasi dis-
rupturus esset; alvus ut plurimùm clausa est, urina
pauca

pauca redditur ; atque hæc sunt symptomata usitiora ; accidunt etiam aliquando graviora , febris , in ore sapor acidus vel amarus, vomitus , ructus, urinæ ardor aut suppressio ; icterus, pulsatio magna in abdomine , sensus frigoris in eodem, umbilici intus retractio, vel protrusio ejusdem extrisecus, materia flava vel viridis per alvum ejecta sine levamine , excrementa alvina levissima & ventosa, instar stercoris bovini , urinæ supernatantia. Colica frequenter in *paralysi*, *epilepsia*, *arthritide*, *hydropse*, *rheumatismo*, aut *tabe* terminantur. Dolores Colici sunt aliquando in *peritoneo*, qui frequenter lethales evadunt, ut etiam in *pancreate* ; vide loco p. 27. & 30. *Spigelius* affirmat se nullum unquam dissecuisse ex Colica mortuum sine intestinorum inflammatione .

Causæ varias.

Art. 647. Causæ colicæ frequentiores sunt cruditates, flatus, alvi adstrictio, humores acidi in sanguine, bilis, acrimonia, herniæ, abscessus interni & latentes, ulcera, canceri, &c. concretiones lapidosæ in pancreate, hepate, liene, intestinis vel ventriculo, insertio ductus cholidochi in ipsum ventriculum (vel pilorum,) luxatio cartilaginis xiphoidis, constitutio aeris maligna, unde Colica *epidemica*, affectiones nephriticæ, & postremo obstructions & tumores strumosi in glandulis intestinorum [& mesenterii] Colicam producant ; hi dolores sunt magis fixi, diuturni, nec aded acuti ; *cathartica* & *enemata* minus prosunt. De structura & situ *coli* vide locum part. 66.

Curatio

Art. 648. Curatio inchoanda est cum *venasectione*, si adsit calor insignis vel inflammatio, vel febris vel ingens humorum affluxus. *℞. Decoct. capit. ovin. vel pedum vitulin. vel intestin. vervecin. ꝑ. ol. oliv. ꝑ. m. f. enema.* In frigidioribus enema *ex ol. oliv. vel lini & vino Canarin.* item cum *ol. rut. cham. junip. &c.* cum fructu injiciuntur. Si hæc

hæc alvum non subducunt, ad fortiora devenien- Nota bene
 dum est. N. B. sed notatu dignum est, experien-
 tia abundè testante, quod immediatè post *venase-*
ctionem clysmata vel *lenissima* promptius opera-
 buntur, quàm fortissima ante sanguinis missionem.
 In acerbissimis torminibus cum vomitu, &c. *Lau-*
dan. gr. iv. vel v. in *clystere* dolorem in instanti
 leniunt, quum idem remedium per os nullum o- Colica habi-
 mnino afferat auxilium. In Colica *habituali* pannus bitualis.

lanceus mollis & subtilis immediatè supra cutem
 ventris contigud gestandus a *Galeno* & aliis mul-
 tum laudatur, tanquam fomentatio perpetua. “
Virtutes aquarum sulph. Bathonicas. [extra paro-
 „ xysmum] *equitationis*, &c. sunt satis notæ.
 „ Commendatur jusculum *cancrorum fluviatilium*:
 „ & *radix allii* pro pauperibus. Interdum exhi-
 „ beo *oleum seminum anisi* larga quantitate viz.
 „ a gr. 40. ad 100. in paucis saccharo vel aliter cum
 „ magno levamine, præcipuè in colica a causa
 „ frigida oriunda. Semen anisi vocatur ab *Hel-*
 „ montio *Solamen intestinorum*.

Baglivii sententia.

Art. 649. In Colica Biliosa succedit frequenter De apho-
aphonia & vox rauca, & per totum serè morbi nia & Pa-
 decursum durat. In Colica pertinaci si sudor co- ralysi ex
 piosus & universalis superveniat labefactis & re- colica.
 solutis viribus, brevi *paralysin* expectato: cave
 igitur ne *opiata* copiosius in ea exhibeas.

Art. 650. Antidotum Colicæ est *chamamelum*, Remedia
 a quacunque causa oriatur. Quando *opiatis* ute- nonnulla.
 ris, semper adde *castoreum*, nam & opii narcosin
 corrigit & doloribus medetur. In pertinaci malo
 conducit iter aliquod ut corpus plurium dierum
equitatione excitetur, fibræque mesenterii longo
 dolore laxatæ pristinas resumant oscillationes ad
 morbosas impuritates e mesenterii sinu eradican-
 das

das expellendasque . Valde prodest *semicupium* in graviori casu & in ipso ileo .

Vvillifii sententia :

In colica
mesento-
rium pri-
mario af-
ficatur.

Art. 651. Pars primario affecta in Colica videtur esse *mesenterium* , quod est valde sensile , & humorum nervosi generis affluxionibus plurimum obnoxium , & hinc dolores lumbares atrocissimi , in quantum scilicet nervi quidam insignes lumbares mesenterii plexum nerveum maximum ingrediuntur . Transitus a Colica ad *paralyfin* indicio est materiam morbificam non per arterias sed nervos deferri , ejusque sedem non esse intestinorum tunicas , sed *mesenterii* plexus nerveos .

Curatio.

Art. 652. ℞. *Fol. malv. utriusque mercurial. parietar. ana m. iv. flor. sambuc. cham. melilot. ana m. ij. caput vervecin. discissum* ; coquantur in *q. s. aq. font. colatura* usurpetur pro fotu cum stuphis laneis calidissime intinctis & expressis atque vicissim applicatis repetendo quoties dolores intensius urgebunt . *Omentum agninum aliave brutorum viscera calentia* abdomini imposita & subinde mutata dolores interdum mirè sedant . Præ aliis quibuscunque remediis aquæ *acidulæ minerales ferratæ* , ætivo tempore per mensem epotæ , juvamen maximum conferre solent , & reliqua alterantia longè superant . *Tinctur. antimon. & succini* locum habent .

COLICA HYSTERICA .

Sydenhami sententia .

Colica
Hysterica,
Morb. de-
scriptio.

Art. 653. “ De Colica Hysterica apud nullum auctorem uspiam legimus audivimusve ante ac curatissimum *Sydenhamum* . “ Imprimis cavendum est , ne symptomata fœminis hystericis familiaria

liaria ab aliis, quos sæpe æmulantur, morbis diagnosi errante putentur oriri. *Colica hysterica* biliosam nonnunquam mentitur, comitem habet dolorem circa cordis scrobiculum, regionem ventriculi & paulò inferiorem; sequuntur humorum viridi aut flavo colore per vomitum ejectiones & animi dejectiones maximæ; post diem unum vel alterum facessit dolor, a levissima verò animi commotione revocatur.

Art. 654. Cura radicalis a cap. de *hysterica passione* petenda est. Nec *venesectio* nec *catharsis* locum habent; nam malum exasperant, immò nociva sunt ipsa *enemata lenissima*; quippe hic morbus a spirituum *ataxia* potius quàm vitio humorum nasci videtur; Ideoque præmissis aliquot haustibus *liquoris possatici*, iisque per vomitum rejectis, statim ad *laudanum* confugiendum est, & in usu ejus persistendum. Aliquando tamen in foemina sanguineis humorumque copia oppressis vel phlebotomia vel catharsi vel utraque *anodyno* via aperienda est. In *icterum* interdum transit, qui plerumque sponte sua sensim facessit; sin longas moras nectat, remediis *ictericis* fugandus est; observandum solummodo occurrit, quod e cathartici *rhabarbaro* solo utendum.

Curatio
longè di-
versa quàm
colicæ bi-
liosæ.

Art. 655. *Colica Pictonum* est species quædam, quæ degenerare solet in *Paralysin*, & motus omnimodam manuum ac pedum depravationem, quam hoc nomine *Riverius* in cap. de *Colica* indigitat; & apud *insulas Caribum* notissima est, utpote quæ magnam vim hominum infestat. Hunc dolorem atrocissimum sanat *balsamum Peruvianum* frequenter ac magna dosi exhibitum, viz. gr. xx. xxx. vel xl. sacchar, albo instillatum bis, vel ter in die; at *paralysis* huic remedio haud cedit, *Galbanetum* pro usu externo.

Colica Pi-
ctonum.

Balsamum
Peruvianum

Touunei sententia.

Colica
nervosa.

Art. 656. Colica nervosa seu convulsiva est affectus aded frequens in *Insulis Caribensis*, ut in numero morborum *Endemicorum* jure merito habenda sit. In medicorum scriptis *Colica Pictorum* nuncupatur, quia *Pictavi* est frequentissimus; in insula vero *Barbada* vulgo audit *the dry Bellyach*. Inter universas calamitates humanum genus affligentes, ne una quidem tanta acerbitate homines excruciat, ac hæc Colica. Frequenter malum inchoare solet in uno puncto ventris, indeque latius diffunditur, ita tamen, ut omnia viscera, a pyloro ad anum usque, ad istum locum, tanquam *ad miseriarum commune centrum* miro cruciamine contrahi videantur. Omnimodi sentiuntur dolores, urentes, lancinantes, mordentes, pungentes, &c. Multifariæ hujusmodi torturæ ægrum exercent, ad dies fortasse 8. 10. vel 14. alvus interim pertinaciter constipata est, urina pauca, vires ferè exhaustæ, extrema frigida; adsunt etiam sudores gelidi, præcordiorum anxietates, animi deliquia, angores, desperationes, & similia donec tandem dolorum atque ægritudinum oneri succumbit.

Causæ;

Art. 657. Causæ præcipuæ hunc morbum atrocem producentes sunt acerborum ac immaturorum fructuum comestatio, nimia liquoris perniciosissimi ingurgitatio, quem vocant *Rum-Punch*, ex spiritu sacchari ardentissimo & succo limonum sylvestrium, &c. compositum (vid. *Tractat. de Venenis Art. 1633.*) & inclementia aeris nocturni itinerantibus si antè crapulam edormiverint, &c. Cessante aliquanto doloris vehementia ægrus perturbationem quandam per spinalem medullam sentit, qua brachiorum ac crurum nervis propagata, imbecillitate statim sensim afficiuntur, indies

dies crescente, donec brevi in paralyfin confirmatam definit. " Unde *Vuillifius* conjecturam fecit, transitum à Colica ad paralyfin indicio esse maiorem, teriam morificam non per arterias, sed nervos deferri, ejusque sedem non esse intestinorum tunicas, sed mesenterii plexus nerveos. [651.]

Art. 658. Methodus medendi hunc morbum gravissimum & paralyfin præcavendi a catharsi primario incipienda est ad pertinacem alvi adstrictionem subigendam. In hunc finem cathartica leniora forma liquida frequenter repetita optimè conducunt, fortiora spasmos adaugere solent: & Ileï periculum intentare. Verùm propter affectiones intestinorum spasmodicas consultum erit imprimis *Paregoricum* propinare. Opiata paralyfin accelerare nonnulli opinantur, sed longè errant; indubitata experientia doctus, larga manu illa non modò innocuè sed semper cum fausto successu exhibui. Sequenti methodo cum prospero eventu frequentissimè processì: ℞. *Pil. Matth. gr.* viij. vel x. *castor. gr.* iv. *opobalsam. q. s. f. pil.* statim capiend. deinde elapsa semihora, ℞. *Mannæ opt.* ℥ss. *crem. tart.* ℥ij. *syr. rosar. solutiv.* ℥j. *f. mistura* in haustul. tepid. juscul. avenac. sumenda & 3is horis repetenda, donec alvus soluta fuerit; in intervallis *pil. Matth. gr.* iv. exhibere soleo, vel, si vomitus vehementius urgeat, sequentem haustum ℞. *sal. absynth.* ℥j. *opii purissim.* gr. j. vel gr. iß. *aq. menth. fort.* ℥j. *syr. limon.* ℥ß. m. Enema quoque cum balsamicis q. quaque hora injiciendum est; sequens etiam foris abdomini usui esse potest; ℞. *Fol. cham.* ℥ij. *bacch. junip. laur. ana* ℥j. *coq. in aq. font.* ℔v. ad ℔iij. sub finem addendo sem. carui, sænic. anis. ana. ℥ß. colatur. add. *opii* ℥j. *sp. saccar.* ℔j. m. *Semicupium* doloribus mitigandis quandoque nonnihil prodesse observatum fuit. Morbi vehementia in hunc modum subacta ad purgantia efficaciora, *mercurialia* scilicet, decet, deveniendum est;

est; ʒj. Calomel. pil. coch. min. ana ʒj. opobals. q. s. f. pil. manè sumend. & quotidie repetend. donec dolor penitus remiserit, & alvus satis solubilis evadat. Deinceps *balsamum Peruvianum* ad ʒij. vel ultra 6. quaque hora sacchar. crystal. instillatum vel aliter exhibeo, & rarissimè spem meam sefellit. Est & aliud. insignè medicamentum apud nos divini numinis favore in hac insula sponte productum, nempe *Pisselaum Indicum*, huic malo valde proficuum, prædicto balsamo adhuc efficacius, nisi quod quibusdam stomacho non aded gratum sit; dosis ʒij. ter in diem per longum tempus, donec morbus penitus subigatur. Nec datur præstantius remedium pro usu externo quàm dictum *Pisselaum*, cum æquali vel dupla quantitate *sp. sacchari* commistum; pro vertebriis dorsi & artubus illinendis, quandocunque paralyseos sit levissima suspicio: hæc verò cum formata sit & confirmata, nulli remedio, quod scio, cedit; nisi forsan *aqua Bathonienses in Anglia* tanto malo succurrere valeant. Immo in ipso casu valere novi.

Ettmulleri sententia.

Colica biliosa, &c.

Art. 659. Dolor punctorius & terebrans acerbissimus sentitur in hypochondrio sinistro, aliando sed rariùs in dextro, in utroque colon facit angulum satis acutum in curvatura; dolor contorsionis, lacerationis, & vagæ lancinationis oritur ex spasmodica intestinorum contractione, & plerumque adest in Colica nephritica; dolor rodens & vellicans vermes indicat, dolor pulsans intestinorum inflammationem. Mulieres interdum sub difficili mensium fluxu patiuntur tormina gravia abdominis, quædam post partum (& ante etiam aliquando) dolore Colico laborant, in utroque casu plerumque ex abdominis & intestinorum *convulsione*.

Art. 669.

Art. 660. In omnibus intestinorum torminibus tam humorosis quàm convulsivis habitualibus, quoad causam antecedentem, respiciendum est imprimis ad *acre acidum* plùs minùs *austerum*, plus minùs *viscidum*, vel ex stomacho ad intestina delatum, adedque ab assumptis vel vitiosis, vel vitiosè digestis ed distributum, vel in plexibus nerveis mesenterii vicinisque locis membranosis pertinaciter hærens, & a quacunque causa externa excitatum.

Ad causam
antecedentem respiciendum
est.

Art. 661. In *Colica hysterica* sensus globi, in abdomine moti, quem mulierculæ & medici ignorantes pro uteri habent motu, est *plexus centralis mesenterii maxime convulsus*, in viris quandoque accidens. Attendendum est præ omnibus, an *Colica* sit *humorosa*, an *convulsiva*, an sit *accidentalis* vel *habitualis*, an sit *scorbutica*, *hysterica* vel *alia*. Clysmata terebinthinata in *Colica convulsiva* sunt optima.

Semper
attendendum est.
ad speciem
Colicæ.

Art. 662. In *Colica humorosa*, ubi pertinaciter hærent stercora, convenit enema ex *ol. sem. lini* & *raparum* & *sal gemmæ* ad ℥j. vel ij. aliàs enema emolliens & carmin. ex *urina pueri* in affectibus intestinorum *flatulentis* etiam cum *terebinth.* aliquando. Si dolor Colicus sit nimis acerbus prius est mitigandus, quàm *purgantibus* proritetur alvus. *Ol. amygd. dulc.* & *sperma ceti* in *Colica convulsiva* est remedium proficuum, & *gum. ammoniacum* in *humorosa*. Succus expressus *stercoris equini* est præsentaneum remedium contra Colicam, p. 1061. (vide locum) speciatim in *Colica convulsiva*. Decoctum *flor. cham.* in quacunque *Colica* maximè laudatur, tanquam specificum, & penè infallibile remedium, *saccar. saturni* est remedium singulare. Pro usu externo *ol. cham. succini junip. ol. petra, galbanum, empl. fotus*, &c. vid. locum p. 181.

Curatio?

Art. 663. In *Colica*, si *urina* sit tenuis & aquosa, mor-

Diagnosis
ex urina,
&c.

Q

sa, morbus est ut plurimum *nephriticus* (aliquando *hystericus*;) si valde colorata, *scorbuticus*; si respiratio sit difficilis & præcordia perturbentur, *hystericus*. In graviore casu clystma ex fumo *nico-
tiane* est remedium dolorem mitigans & alvum laxans.

Foresti sententia.

Art. 664. In Colica stercoracea aut a pituita vis-
Vires sal.
gemma. seidiore nunquam obliviscatur medicus *sal. gemma* :
 nam hoc expertissimum ad resolvenda stercora &
 mucilagines crassas; *Forest. l. xxj. vid. etiam mess.
 med. spargyr. sub tit. sal. gem.*

Remedia varia. *Art. 665.* " Consulendus est *Boerhaave* in his
 „ affectibus (uti in ferè omnibus) tanquam ora-
 „ culum. *2℥. Flor. cham. miß. coq. paulisper in aq.
 „ brion. comp. 3iv. in colatura dissolv. ol. mac. per
 „ express. 3ß. syr. de mecon. 3ß. m. f. haustus ca-
 „ lidè sumend. ad dolores leniendos in praxi no-
 „ stra frequentissimè. Decoct. fol. malvæ pro pau-
 „ peribus præcipuè in colica nephritic. Vvaldsch-
 „ midii experientia constat avenas calidas in sac-
 „ culo regioni ventriculi impositas vim habere dis-
 „ solvendi ac discutiendi. Allium condit. zinzib.
 „ condit. [in frigidioribus] empl. e bacc. laur. e
 „ Cymin. &c. *Pharm. Lond. Enema colic. enem. hy-
 „ ster. enem. tereb. fatus ad colic. fatus spirituosus,
 „ mistura hyster. spirituos.* " sunt remedia usu com-
 „ probata.*

ILIACA PASSIO.

Etmulleri sententia.

Iliaca Passio.

Art. 666. Ileos sive Iliaca Passio est motus pe-
 ristalticus intestinorum inversus cum dolore circa
 umbilicum intensissimo; excrementa alvina mo-
 tu re-

tu retrogrado per os ejiciuntur ex obstructione alvi contumaciori. Appellatur *Convolutus* & *Chordapson*: Quoties in sequiori sexu morbum Iliacum observare contigit, *Herniam* adeste tuto serè prædicere possumus; quamvis ob exilitatem ipsæ patientes non observare soleant. Opinio de convolutione intestinorum est falsa; ingressus verò superioris intestini in inferius; & contrà, est satis frequens: Dubium est an inflammatio intestini sit causa obstructionis ejusdem vel contra. Morbus gradatim progreditur, in principio nil descendit per inferiora; abdomen sensim durescit; & tumet; ægri nauseant & vomunt primò ingesta, deinde recrementa flavescuntia [& pituitosa] & tandem excrementa alvina. Adfunt lipothymix & anxietates inexplicabiles; sudores frigidi (extremorum frigus) urinæ suppressio; vires languescunt; singultus supervenit, qui prodromus est convolutionis; & epilepsix, & ipsius mortis. Plures intereunt, quam convalescunt. Si dolor sit acutissimus; & subito sine causa manifesta deficiat, signum est gangrænæ.

Art. 667. Venæsectio celebranda est in initio, si *Curatio* adsit febris vel insignis calor. *Cathartica* sunt fugienda; quoniam vomitoria evadunt; non priùs securitas promittenda est; quàm sequitur alvi profluvium spontè vel artè provocatum. Ægri *analeptici* & *cardiaci* sunt sustentandi. *Ol. amygdal. dulc.* cum jusculo pingui; item *Sperma ceti* in decocto *raparum*. Deglutitio *globulorum* aut *argenti vivi* nil prodest; sed potius malum exasperat; ubi adest intestini inflammatio; gangræna, vel hernia; vel ingressus intestini superioris in inferius. *Dos. argenti vivi* est ℥iij. vel iv. ad ℥ss. & amplius; & exitus ejus per clysteres omni studio promovendus est; aliquando non ante aliquot dies redditur; interdum *salivationem* movet. Exemplum affert alicujus mercurii ℥ij. per octi-

1. duum in corpore habentis & convalentis, sed
 2. non sine salivatione excitata. Mulieri in se-
 3. ctione de Lumbricis memorata [Art. 691.]
 4. gravissima passione iliaca correptæ enema la-
 5. steum statim injiciendum præscripti, & elapsis
 6. duabus horis haustum hypnoticum capiendum;
 7. & deinceps post duas alias horas largam dosin
 8. pil. ex duobus cum calomel. ℞. hæc nihil pro-
 9. ficiebant; die proximo excrementa alvina per
 10. vomitum ejecta sunt; largam quantitatem olei
 11. amygd. dulc. in brodio tenui potandum jussi, &
 12. linimentum ventris illinendo usurpandum, &
 13. sub noctem enema cum vin. benedict. ℥iv. inji-
 14. ciendum; nihilominus nihil per inferiora descen-
 15. derat, sed jugiter sursum omnia. Die 4. sudor-
 16. es frigidi superveniebant; viribus ferè exha-
 17. stis; itaque argenti vivi ℥iij. propinavi & tri-
 18. horio post tres alias uncias; elapsa deinde ho-
 19. ra una vel altera *ingentem lumbricum* evomebat
 20. & bis per inferiora purgata est, & in futurum
 21. alvus satis soluta manebat; argentum verò vi-
 22. vum [quod mirum videatur] non ante finem
 23. 7. vel 8. dierum redditum est; nihil tamen ma-
 24. li mulieri exinde obveniebat: hæc enim etiam
 25. nunc post quatuordecim annos vegeta vivit. “
 Omentum ovis recens mactati calidè in abdomen
 impositum mirum in modum dolorem lenit; lau-
 datur etiam cataplasma ex *pomis putridis Borsdorf-
 fianis* cum tantillo *croco*, vel ex *stercore ovilla*
 cum lacte cocto; p. 120.

Sennerti sententia.

Miserere
mei.

Art. 668. Barbari Superioribus seculis Iliacam
 Passionem *miserere mei* vocabant, quoniam ma-
 lum est commiseratione dignum; in hoc morbo
 clysteres, imò & glandes vomitu rejiciuntur ob
 motum intestinorum inversum, ideoque aliquan-
 do in-

do intestinorum viæ in ileo non penitus præcluduntur. Signum hujus morbi proprium est, quod nihil descendit per inferiora; accidit plerumque vomitus bilis & pituitæ, frigiditas totius corporis, dolor plurimus, spirandi difficultas, &c. & morituris sudor frigidus. Omnis Ileus periculosus; rarissimè convalescunt, qui stercus per os ejiciunt.

Art. 669. Venter foveri debet *decoct. emol. & linimentis* inungi. Oleum *amygd. dulc. & juscula pinguia* ore sumenda sunt, & quamvis semel atque iterum talia vomitu rejiciantur, continuandus tamen est eorum usus ad fibras relaxandas. *Curatio ;*
A tribus potissimum causis exoritur, ab inflammatione, ab aliis tumoribus & exulceratione, & denique a facibus induratis, de quibus singulatim consulendus est author. p. 429. *De causis consula- tur auth.*

Barbetti sententia.

Art. 670. *Fabricius Hildanus* observavit principium & originem hujus affectus fuisse circa *Intestinum Cecum*; ego verò existimo, valvulam in principio coli primùm ex intestini cæci inflammatione adedè contrahi & constringi, ut planè nihil permeare possit. In omnibus serè hoc affectu extinctis dissectis accuratiores invenerunt, vel intestini gangrænam, vel tenuis intestini coarctati ingressum in partem proximam flatu priùs turgidulam, Si gangræna jam aderit, cognoscitur ex eo, quod dolor statim cesset. *Causa proxima ;*
Omentum & etiam ipsa intestina ex vivo animali quam calidissimè abdomini applicari possunt multo cum levamine. Convenit *venæsectio* initio, si malum ab inflammatione oriatur; Immo in corporibus robustis nunquam omitti debet.

Art. 671. Plures ab ileo defunctos aperui, & *Gangræna* intestini cujusdam inflammationem & sphacelum *causa*.

„ ferè in omnibus , & morbi & mortis causam
 „ fuisse deprehendi , *Vuillis* . Sæpius in hoc mor-
 „ bo defunctis (inquit *Doleus*) intestina planè
 „ vacua invenimus ; undè manifestum est sæpius
 „ spiritus animales peccare .

Sydenhami sententia .

Methodus
 præcendi ,

Art. 672. Ventriculus primo loco præ omnibus
 corroborandus est , & vomitus , si fieri possit , si-
 stendus ; ideoque *sal. absynth.* cum succo *limon.*
 præscribo (subinde) sumend. intermediis verò
 temporibus exhibeo coch. aliquot *aq. menth. stil.*
lat. sine alio quovis additamento . Dum hæc fiunt
catulum viventem nudo ventri indefinenter ac-
 cumbere jubeo , dolore hoc modo profligato , ex-
 hibeo *Pil. coh. maj.* ʒj. in *aq. menth.* dissolut. quam
 etiam *aquam* (quo certius vomitus recursus præ-
 vertam) toto catharseos tempore injungo . Vi-
 ctus sit tenuis per totum morbi decursum , & de-
 cumbat æger in lecto , donec convalescat . Usus
argenti vivi & *globulorum* author minùs probat .

Curatio .

Art. 673. In hoc affectu quocunque cathartica
 propinaveris , ea statim emetica fiunt ; ideoque
vena brachii tundenda est & *sumus nicotiana* (de
 hoc vid. *Fulleri enema oleos. amar.*) in intestina
 inflandus est quàm validissimè [omnium enema-
 tum , quæ mihi innotescunt , hætenus efficacissi-
 mum esse duco] ideo quoque post moram ali-
 quam reiterari potest . Hoc successu carente , ne-
 cesse est *catharticum fortissimum* exhibere , sed præ-
 stat hora una aut altera *paregoricum* propinare ,
 ut sub *laudani* tutela *catharticum* retineatur , & suo
 munere defungatur . Sched. mon. p. 48. De usu follis ,
 &c. vide enema oleosum amarum *Fulleri* . *Kotys*
ad colicam , *sotus spirituosus* , *mistura corallata* .
 omnia ad colicam quandoque in usum veniunt .
 Demulcendis doloribus conveniunt *semicupium* ,

In

In Ileo *stercore vacca* quàm recentissimo universa ventris regio emplastretur ; hoc etenim remedium, aliis nihil proficientibus, viam intestinorum aperui (*inquit Zacutus Lusitan. in praxi admiranda.*)

Art. 674. “ Infans vix semestris a nativitate Historia.
 „ perfectè valens & vegetus subitò in gravissima
 „ ventris tormina lapsus est ; subsequutæ sunt vomitiones enormes, nihil omnino per inferiora
 „ descendente, præter exiguum sanguinem. Ad
 „ infantulum succurrendum omnem operam ac
 „ studium navavi, sed frustra ; nam triduo expiravit. Abdomine aperto intestina omnia usque
 „ ad inferiorem Ilei partem flatibus valdè distenta
 „ invenimus ; & jejunum leviter inflammatum ;
 „ jamque paulò inferius morbi sedes in conspectum venit : portio etenim Ilei, *sex digitos longa*, [quod prodigiosum erat in subjecto tam parvulo] in *coli* cavum, *cum mesenterio adjuncto*, collapsa est ; pars affecta in tumorem attollitur tunicis intestinorum incrassatis, nigricantibus, gangrænosis, & quibusdam in locis sphacelatis per totius involutionis tractum, unde intestinorum *oppilatio insuperabilis*, quæ instar Polypi visa est, En luculentum exemplar ; *Passionis Iliacæ* perfectissimam morbi ideam complectens in infante nondum semianniculo ; quod rarissimum esse credo.

L U M B R I C I.

Sennerti sententia.

Art. 675. Lumbricorum tres sunt species frequentiores, viz. *teretes sive rotundi, lati, & ascarides* [ex ovis insectorum oriuntur] ; aliquando sed rariùs vermes anomali ejiciuntur, cornuti scilicet,

Vermium species variorum.

Vermes
in variis
corporis
partibus.

licet, hirsuti, quadrupedes, multipedes, bicipites, tricipites, cauda bifurcata præditi, &c. Præter vermes intestinales, sunt & alii, omnes, ferè corporis partes incolentes, uti vermes *dentales*, *gingivales*, *rhinarii*, *pulmonarii*, *cardiaci*, *sanguinari*, *urinarii*, *cutanei*, *umbilicales*, *eleophagi*, vermes in *hepate*, in *saliva*, &c. Sed hi omnes non nisi in statu morbido inveniuntur.

Teretes.

Art. 676. " Lumbrici teretes sunt frequentissimi & satis noti, Lumbricis terrestribus similes, nisi aliquantum albidiores sint.

Lumbrici
lati descriptio.

Art. 677. Lumbricus latus, tænia a *Plinio*, *Platero*, &c. appellatus, est instar fasciæ duarum vel trium ulnarum, aliquando longior, geniculis transversis per totum divisus. *Nicolaus Andry* affirmat unum esse tantum in corpore, unde *solum* appellatur. Ast *Mr. Hageunot* tæniam in ventriculo felis aliamque in duodeno reperit. *Memoir. de l' Acad. Vol. xvii. p. 484.* Et *Mr. Geoffroy* tæniam in tinca pisce duos pedes & amplius longam observavit. *Hist. de l' Acad. Vol. xiv. p. 50.* hunc Lumbricum in cane ipse vidi tres circiter pedes longum; ideoque in aliis animantibus præter hominibus generantur.

Latus
Lumbricos.

Art. 678. Latos Lumbricos qui habent, appetentia cibi nimia laborant, ac nisi cibis offeratur, dolor & morsus in ventre percipiuntur, &c. Certissimum verò signum est, quod cum alvi excrementis corpuscula quædam *cucurbita* seminibus similia excernuntur. Hi difficulter necantur; commendatur *rad. filicis* ad *℥ij.* & decoctum *corticis rad. mori*.

Remedia
ad Lumbricum
laticum.

Art. 679. " Ad latos Lumbricos educendos adhiberi debet *vomitum ex oleo*, non ex *radicibus*, & alia die *clystere* utendum admixta *nitri* parte vel *salis*; danda etiam *aqua salsa* potui, aut
gly-

„ *glycyrrhizæ radicis decoctio aut similiter inco-*
 „ *cta glycyrrhiza.*

Art. 680. “ *Ascarides sunt tenues Lumbrici, fi-*
 „ *lorum particulas referentes, qui in parte infe-* *Ascarides,*
 „ *riori crassorum intestinorum, & juxta sphincte-*
 „ *rem musculum residere solent.*

Art. 681. “ *Signum pathognomonicum ascar-* *Remediis*
 „ *dum est pruritus in ano vix tolerabilis; ægro-* *singulare.*
 „ *tantes aliquando syncopen patiuntur, & frequen-*
 „ *tissime tenesmum. Ad ascarides facit experimen-*
 „ *tum Aetii, suppositorium scilicet formatum e*
 „ *carne veteri salita, pinguedine derafa.*

Fulleri sententia.

Art. 682. *Ascarides sunt quidem gens pusilla,*
 sed expugnata difficillima; namque licet omnes
 ad unam enematis vi exterminarentur, nova ta- *Ascaridum*
 men & numerosa proles ab ovulis in recto depo- *Curatio.*
 sitis mox nascetur. Idedque non tanti erit paren-
 tes solos proscriptisse; nisi insuper & natos, &
 semina etiam ipsa radicitus extirpentur, & ejici-
 antur. Hocque optimè fiet, si postequàm ascar-
 ides jam disparuerunt, non statim a remediis absi-
 stamus; sed tertiis quartilve diebus per aliquot
 vices; ac deinde semel in hebdomade hujusmodi
 deturbantia enemata repetamus; quod nemo au-
 thorum hætenus notavit. Ided minimè dubitan-
 dum est *enema amarum* seq. *℞. Rad. serpent. virg.*
contus. ℥j. pulp. colocynth. (in nodulo ligat.) ℥j. *Enema*
herb. tanacet. summit. sabin. ana M℥. coq. in aq. *amarum.*
font. q. s. ad ℥vj. colatur. add. ol. hyperic. ℥℥.
ol. absynth. chym. ℥℥. spec. hier. pict. ℥℥. m. lin-
 gulis novilunii injectum, & per aliquot menses
 repetitum, ascarides interrempturum, exterminatu-
 rum, & funditus deleturum esse.

Art. 683. “ *A Lumbricis vomitus, cardialgia,* *Sympto-*
 „ *syncope, singultus, vocis privatio, tormina in-* *mata a lū-*
 „ *testino.* *bricis.*

„ intestinorum, capitis dolores, sopor gravis, delirium, mœror, tristitia, febres, angina, pleuritis, & alia innumera gravia symptomata.

Remedia
vermifuga
varia:

Art. 684. “ In genere amara ferè omnia sunt vermifuga. Privatum pulv. cort. aurant. mercurialia, Æthiop. min. merc. dulc. &c. muscus corallin. ens veneris, semen Santonici in vino clareto est anthelminticum insigne. Floyer, De crescente luna vermes sunt aggrediendi, Pulv. colocynthid. cum felle bovin. subact. cum gut. aliquot ol. absynthii umbilico applicatus, Lumbricos pellit. Ad ascarides necandos enemata cum colocynthid. incoct. mercurialia. &c.

Baglivii sententia.

Vermes
anomali
& insoliti
symptomata
saepè
patiunt.

Art. 685. Quod ut plurimum homines ex improviso, & sine ulla causa manifesta, & signis alios morbos comitantibus, in subitum vitæ discrimen incidunt, & cadunt veluti apoplectici cum extremitatibus frigidis, pulsu exilissimo (qui ferè semper signum est vermium latentium uti & singultus) aphoniam, quandoque improvisa mania, tunc de vermibus dubitandum, in tali casu nil potentius est, quàm statim dare cum brodio gr. xii. merc. dulc. & gr. v. scamon. sulphurat in adultis. In pueris verò minoretur dosis, vel potius detur mercurius crudus ad magnitudinem pisum cum brodio, nam erit ad miraculum. Chesneau.

Nota bene.

Art. 686. “ Probe notandum est, quod nullum tam peregrinum sit symptoma, tamque paucum, quod vermes excitare non possint. Horrenda quidem symptomata quandoque a vermibus exoriantur, ut non rarè ex incantatione produci vulgò credantur. Periti medici multa adstantium admiratione sacrodozmona non rarè ejiciunt.

Ex vermibus.

Art. 687. “ In praxi quotidiana horrenda hujusmo-

„ iusmodi symptomata a vermibus excitata vidi-
 „ mus, Homo quinquagenarius subito in gravissimam *Epilepsiam* lapsus est, & intra decem
 „ dies sex vel octo violentissimos insultus cum
 „ horrendis spasms passus est; deinde in *maniam*
 „ incidit per diem unam aut alteram, & postremo in *moriam* & ferè omnium rerum *oblivio-*
 „ *nem*. Die 16. Lumbricum mortuum exerevit,
 „ & sensim pristinam sanitatem nactus est, nisi
 „ quod *memoriam* nunc biennio post nondum in-
 „ tegrè recuperavit.

Cecitas.

Art. 688. “ Adolescentula quædam febre ver-
 „ minosa laborans stupendis motibus convulsivis
 „ correpta est, unde *visum* penitus amisit, &
 „ luce orbata ad quatrimum mansit, interim a
 „ spasms ferè libera; die 5. alius paroxysmus
 „ convulsivus supervenit, & acies oculorum resti-
 „ tuitur. Exhibita erant medicamenta antispas-
 „ modica, & præcipuè anthelminthica, *Æthiop.*
 „ *mineral.* & *calomel.* &c. Vermes comminuti
 „ & contriti excreti fuerunt & puella conva-
 „ lescbat.

Obmutescencia.

Art. 689. “ Alia puella ex Lumbricis intestina
 „ incolentibus primò rauescit, & febre acutissi-
 „ ma laborabat; post paucos dies vocem penitus
 „ amisit, & ad dies aliquot muta remansit; &
 „ cum omnia symptomata mortem in propinquo
 „ esse monstrabant, alius vermifugis minùs suc-
 „ rentibus, exhibui *decoctum foliorum hellebori*
 „ *nigri* ferè in ipso articulo mortis; vermes quam-
 „ plurimos exerevit, & convaluit. Eiusdem re-
 „ medii ope plures qui in extremo vitæ discrimi-
 „ ne fuerunt versati, restitutos vidi; & longa ex-
 „ perientia didici helleborum nigrum *optimum es-*
 „ *se* & *certissimum vermifugum in tota pharma-*
 „ *corum familia.*

Art. 690. Ex Historia Medica abundè constat
 „ Lumbricos nonnunquam ventriculum, intestina,

hypo-

Lumbricus
umbilica-
lis.

hypochondria atque inguina perforare & foras prorepere. Plusquam viginti abhinc annos ex umbilico pueri octennis exulcerato *Lumbricum teretem* 6. vel 7. digitos longum propriis manibus evulsi; post *Lumbricum cochl.* j. vel ij. *puris flavi* effluerunt, quod excrementa alvina non olebat. Ulcus non remerè sanandum esse judicavi; ideoque foramini turundam adaptari jussi, ut materia purulenta quotidie evacuaretur; per septimanam & diutius pus ubertim effluebat, sed indies minori quantitate; deinde post triginta dies sine ullo incommodo ulcus exsiccatum est, & puer integrè restitutus, utcumque tamen proximo anno in *ascitem* lapsus est, a qua causa nescio; ex hoc etiam morbo remediis appropriatis illum feliciter liberavi, & etiamnum sanus ac vegetus vivit.

Lumbrici
ex ingui-
ne prode-
untes.

Art. 691. Fœmina quadraginta quinque annos nata, robusta, & laboribus assueta, dolore colico quandoquē obnoxia, aliàs sana, circa quatuordecim abhinc annos tumorem habuit in *inguine sinistro*, ovum gallinæ æquantem, quem *herniam* esse ipsa credebatur; durabat enim integrum annum ante disruptionem. Interea circa dictam periodum fœmina *ileo* correpta est, de quo alibi (*Art. 667.*) a cujus morbi cruciatibus ac immani vomitione, &c. ruptus est *tumor in inguine*, & effluxit tenuis humor flavescens, turpethi mineralis colorem æmulans: advocatus est chirurgus, qui stylo immisso largam cavitatem detexit; foramen sensim spongia præparata dilatatum est, & magna vis prædicti humoris indies evacuat; die 10. in foramine apparuit *Lumbricus vivus*, quem chirurgus coram astantibus detraxit, figura, colore, & magnitudine Lumbricis intestinalibus omnino similem. Post duas vel tres septimanas ductus est *alius Lumbricus* priori non dissimilis, nisi quod aliquanto rubicundior esset. Vermifuga internè propinabantur, & *decocta anthelmintica* ex *fol. hellebor. nigr. aloe, sem. sanctonis.* &c. in
ulcus

CAP. VII.

Diabetes:

253

ulcus sinuosum injecta fuerunt. Tribus circiter mensibus sanatum est ulcus, & mulier, adhuc viva, ex illo tempore benè se habuit.

Art. 692. Si quis de *Lumbricis umbilicalibus* & *inguinalibus* plura velit, *Schenckium* adeat, *Observ.* p. 408. 409. item, *Bonetus*, p. 631. Inguinalium recentiora exempla habemus apud *D. Morton Hist. Natural. Northamptonia*, p. 467.



C A P U T VII.

Sive Fasciculus Morborum septimus.

D I A B E T E S.

Listeri sententia.

Art. 693. **D**luturna est hujus morbi creatio, & Diabetes
historial
longo tempore parturit. In principio os humore privatur, saliva albida est ac spumans, paulò plus lotii, quam moris erat, effunditur; sitis adest, sed nondum vehemens, calcfactio parva quidem, sed mordax, visceribus inhærens exoritur; habitus corporis gracilis evadit, & homo anxius & animi dubius existit; progressu temporis sitis insigniter augetur, & velox est carniū & membrorum in urinam colliquatio; neque enim eum intermissione lotium reddit, sed, perinde atque canales laxati sint, indefinens est profusio; sitis intolerabilis est, potus copiosus, multitudini tamen lotii non respondens; si parvum tempus a meiando abstinerit, intumescunt lumbi, testes, & ilia, postremò cum dolore meit & festina mors adventura est. Urinæ quidem gustus lenis, & minimè, quantum memini, dulcis, paulatim tamen dulcescere in confesso est, quod pri-

primum aquosior feri pars effunditur, & postea ipsa feri pars chylosior: huic autem rei fidem facit, nempe *phthisicorum* plurimorum ultimis mensibus insignis spati dulcedo, ad nauseam usque molesta (lac etiam muliebere; a chylo parvulum discrepans; dulcescit.)

Curatio. *Art. 694.* Conveniunt *amygdalata* & *lacticia*.
 “ Affert exemplum cujusdam ex hoc affectu suo
 „ consilio curati bibendo *vinum* cum *zinzibere*
 „ coctum quantum & quoties pro viribus potuit,
 „ concessio interim haustulo *ex aq. lactis* ad sitim
 „ leniter temperandam.

Etmulleri sententia;

Morbi descriptio.

Art. 695. In Diabete urina quantitate nimis copiosa excernitur, cum siti intensa, debilitate virium, macie, febre continua lenta, ardore circa regionem lumbarem, verbo, symptomatis *hæctica confirmata*; interdum cum urina pingue aliquid excernitur; & tandem ut plurimum mors subsequi solet. Sed hæc est *Diabetes notha*.

Diabetes vera.

Art. 696. Diabetes vera est immutata ingestorum potulentorum per urinam excretio, *caliaca* & *lienteria* similis: In hac specie potulenta redduntur parum mutata quoad colorem, odorem, saporem, &c. sic vinum rubrum mingitur; &c. Exempla hujus sunt rariora.

Alia species.

Art. 697. Est & alia species Diabetis, quæ *caliaca urinalis* appellari potest, nempe quando *chylus* cum urina aut loco urinæ prodit.

Prognosis.

Art. 698. Urina vulgò Diabete laborantium admodum dulcescit; est periculosum malum, & sæpe lethale; post immodicum laborem, nimiam venerem, chronicas febres, plerumque incurabile;
 “ ut etiam quando a prava & diuturna consuetudine liquorum spirituosorum ingurgitationis or-
 „ riginem duxerit.

Art. 699.

Art. 699. Quoad curam temperanda est sanguinis acrimonia: in plurimis convenit cum cura *febris hectica*; inchoanda est cura cum vomitorio, deinde exhiberi potest *antihectic.* *Poterii*, *lapis hematit.* *sacchar.* *saturn.* *croc.* *mart.* *aluminata*, *trochisc.* *de caiahe*, *terr.* *sigillat.* *opiatum hor.* *somni*; præ reliquis *aq. cala.* *lac chalybeatum*, *emulsiones*, &c. Ad Diabetem veram *astringentia*, *martialia*, privatim decoctum *corr.* *aurant.* Curatio.

Vuillisi sententia.

Art. 700. Diabetes apud antiquos fuit morbus rarissimus, at nunc dierum magis familiaris; habet sitim continuam, atque febrem lentam & quasi *hecticam* semper conjunctam. Novi quendam vino Rhenano pro potu ordinario per viginti dies usum Diabetem incurabilem contraxisse. Morbus apud antiquos rarissimus.

Art. 701. Pauci aut nulli ab *astringentibus* curantur. Sæpius in hoc morbo *tincturam antimonii* cum bono successu præscripti, atque *aq. solutionis calcis viv. cum saffsafr. sem. anisi, passulis, liquirit.* &c. Ego, D. *Michelthuvait* & *Vuitherly* pro quodam comite sic præscripsimus; *℥j. Summit. arboris cupress.* *M. viij. alb. ovor.* *℔ij. cinnam.* *℥ss. lact.* *℔viij.* distillantur, &c. bibat æger *℥vi.* ter. in die. *℥j. Gum. Arab. tragacanth. ana* *℥vj.* *sacchar. penid.* *℥j.* f. pulv. dos. *℥j.* vel *℥iss.* bis in die cum *aqua distillat.* haustum *paregoricum* omni nocte; dietam ferè tantum ex lacte. Horum usu indies melius habuit, & intra mensem sanatus est. Curatio.

Art. 702. “*Fœmina quinquagenaria plenioris* Diabetes & salivatio.
temperamenti Diabete & salivatione., nunc
hæc, nunc *illa*, utroque morbo alternatim in-
vadente, tamdiu laborabat, donec vires ferè
exhaustæ fuerunt. Infusum *rhabarbari* in vino
Canariensi quotidie capiendum jussi, & post
paucos dies dosis decoct. catechu composui.

Fulla.

„ *Falleri*, omni nocte propinata fuit, & pro po-
 „ tu ordinario vinum *Florentinum cum aqua Bri-*
 „ *stolensi dilutum* potavit, atque ita duobus vel
 „ tribus septimanis ab utroque malo penitus li-
 „ berata est, & plures annos incolumis vixit.

Sydenhami sententia.

Morbus
adumbratus.

Art. 703. Succī sanguini illati per vias urina-
 rias erudi & incocti exitum sibi quærunt; un-
 de sensim labefactantur vires, colliquefcit corpus
 & quasi substantia ejus per hanc eloacā exina-
 nitur, cum siti, ardore viscerum, lumborum eo-
 xarumque intumescētia, & salivæ spumosæ ex-
 spuitione crebra.

Curatio.

Art. 704. Eadem præscribenda sunt, quæ in
fluore albo, omissis solummodo *venesectione & ca-*
tharsis: nam utrobique *indicationes curativæ* sunt
 eadem, quantumcunque inter se hi duo morbi
 dissidere videantur.

Harrisii sententia.

Curatio
singularis.

Art. 705. Cogitationi clarissimi authoris subiit
diarrhæam esse quasi *diabeten alvi*, & *diabeten*
renum diarrhæam; ideoque felici cum successu
 pro diabete laboranti hunc in modum præscri-
 psit. ℞. *Rhei elect.* ʒß. *santal. alb. citr. ana* ʒj.
cardamom. minor. ʒß. infunde lento igne vase clau-
 so in vin. *Canarin.* ℥ij. sumpsit æger hujus vini
 colati coch. vj. hora 6^{ta} matutin. atque tantundem
 repetebat hora 10^{ma} ante merid. ab illo meridie
 usque ad 10^{am} vespertinam Diabetes penitus siste-
 batur; sitis desiit, &c. (sed hujus rei hoc uni-
 cum habet exemplum.)

Farrago sententiarum .

Art. 706. Rara est mentio hujus morbi apud veteres scriptores ; *Græcis* ferè incognitus fuit ; ^{Græcis incognita fuit.}
Galenus profitetur se bis tantummodo ipsum vidisse ; *de locis affectis* lib. vi. cap. 3.

Art. 707. Præter jam dicta interdum ad curam aliquid faciunt remedia sequentia , *decoct. catechu comp. decoct. incrassans, ichthyocolle, gelatina C. C. oryza, tinct. coralli, trochisci Gordonii, & præ omnibus juxta praxin modernam aqua calida Bristolenses.* Sequens decoctum cum maximo fructu proprinari potest ; *℥. Cort. Peruv. ℥j. tinctur. rosar. ℔℔. coq. ad ℔j. lento igne, colatur. add. vin. rub. auster. ℔℔. syr. Cydon. ℥ij. misce ; dos. ℥ij. bis vel ter in die.* ^{Remedia varia.}

N E P H R I T I S.

Boerhaavii sententia .

Art. 708. Certum est renes vera inflammatione tentari ex dolore ardente, pungente, magno ; ex febre acuta, continua comitante ; ex urina pauca, admodum rubra, & flammea, vel in summo malo aquosa ; stupore cruris vicini ; dolore inguinis, testisque vicini : dolore iliaco : vomitu bilis : ruetu assiduo. ^{Inflammatiō renum.}

Art. 709. Hanc inflammationem producere possunt omnes causæ generales inflammationem parientes, privatim quicquid urinæ transcolationem & transitum in meatibus urinariis impedit. Si summa inflammatio hæc vascula occupat, ita sæpe stringuntur, ut nihil reddatur lotii ; aliquando ut valde parvum, tenue, aquosum, quod pessimum. Infinitæ sunt Nephritidis species, causæque ; ^{Causæ.}

R

que ;

que; & inter eas una a calculo; omnium tamen est fermè eadem curatio.

Curatio.

Art. 710. Sanatur per remedia generalia omni inflammationi sanandæ propriâ, viz. *venæsectionem, avulsionem, dilutionem*; per *decocta lenia, emollientia, antiphlogistica*, magna copia ingesta; per *clysmata, fomenta, balnea ex iisdem constantia: victu humido, leni, quiete, vitatione lecti calidi, & decubitus in dorso*. Si nimia symptomata doloris, vel convulsionis urgent, *opiata* profunt; vomitum autem nimium sæpe ingestu tepidæ mellitæ juvare prodest. Atque hæc sola methodo tutè curatur ipsa *Nephritis* a calculo renibus, ureteribusve impacto orta.

Abcessus.

Art. 711. Si causæ Nephritidis magnæ, nec malum resolvitur, nec sanatur, sed excurrit ultra septimum diem; *abscessus* metuendus; quem fieri docet, remissio doloris, ejus in pulsationem mutatio, horror sæpe recurrens, gravitas stuporque partis; jam factum esse docet prægressus priorum, tum pulsus, ardor, tensio in loco, urina purulenta, fœtida, instar urinæ salis putrefactæ: simulac abscessus ille factus scitur, utendum valde *maturantibus* primò & *emollientibus*, dein purulenta apparente urina, *diureticis puris ex aquis medicatis, sero lactis, similibusque, usurpatis simul balsamicis*.

Effectus
suppurati-
onis &
prognosis.

Art. 712. Si verò suppuratio dicta diu durat, totus ren exesus saccum format nulli usui servientem: tumque frequenter *tabes renalis* insequitur. Si scirrhum hic format, paralytis vel *claudicatio* cruris suppositi oritur, immedicabile malum: unde sæpe lenta *tabes*, *hydrops*, &c. Si autem parva copia materiæ inflammatae coagulata in folliculo urinæ minimo hæserit, basin format, cui apposita sabuli in urina materies crustatim accrescens calculum renalem creat, sicque eundem auget, de quo alibi. Quinetiam aliquando in gangrænam transit,

CAP. VII. *Inflammatio & exulceratio, &c.* 259
transit, quod docet vehementia causæ & sympto-
matum, & subita doloris remissio sine causa ma-
nifesta, cum sudore frigido, pulsu debili intermit-
tente, singultu, utina vel nulla, vel livida, ni-
gra capillota, foetente, carunculis fuscis, nigrisve
fœda, defectu virium subito, ubi nihil juvat,
imò nec ipsa medicina.

INFLAMMATIO & EXULCERATIO Vesicæ.

Estmulleri sententia.

Art. 713. Renum inflammatio & exulceratio, ^{Signa in-}
nephritis quandoque dicitur. Signa sunt ardor u- ^{flamma-}
rinæ, stranguria, urinae interdum suppressio, cor- ^{tionis re-}
poris inflexibilitas, febris, stupor cruris, vomitus ^{num, &}
biliosus, alvi suppressio, &c. Ut ritè distinguatur ^{quomodo}
a calculo, observandum est quod hic semper adest ^{differet a}
febris continua, in calculo non ita; dolor etiam ^{calculo.}
est magis continuus & pulsabilis, in calculo inter-
polatus & periodicus; ischuria in hac, rarè in
calculo. "In inflammatione renum urina in prin-
cipio valde rubescit, morbo autem ad summum
profecto aquosa & limpida evadit; in affectu
calculoso *contrarium prorsus accidit.*

Curatio.

Art. 714. Quoad curam cum reliquis inflam-
mationibus convenit, cum externis secundum cu-
ram *anginae* procedendum est, cum internis se-
cundum *pleuritidis*; *hirudines* venis hæmorrhoi-
dalibus applicatæ profunt. *Diuretica* in princi-
pio sunt nociva; conducunt *nitrata*, *saturnina*,
papaverina, succus *cancerorum fluvialium*, & ex-
ternè *camphora*.

Art. 715. Suppuratio aliquando expectanda est; ^{Suppura-}
rupto abscessu mictus fit purulentus, hinc *ulcus re-* ^{tio, inde}
num; dolor morficans & rodens in lumbis sentitur ^{ulcus se-}
a sero acri, quod in transitu irritat; & rodit cum ^{num.}

260 *Ulcus Renum & Vesicæ.* CAP. VII,
caloris sensu, periculosum est malum, & sæpius
lethale.

Eiusdem
curatio.

Art. 716. Quoad curam, *mundificantia* & hinc
consolidantia utramque faciunt paginam; *vomitus*
a pluribus laudatur; *mercurius dulcis* cum *terebin-*
thina & *balsamicis*; præmissis *mundificantibus*, de-
coctum *hederæ terrestris*, & *e lignis*, succus *canero-*
rum fluviatilium, *trochisci alkekengi* (*trochisci*
Gordonii, *lac asininum*) *acidula*, *aq. spadan.* &c.

Inflamma-
tio & ex-
ulceratio
vesicæ.

Art. 717. In inflammatione & exulceratione
vesicæ pathemata sunt tensio, durities, ardor, tu-
mor, ac dolor in regione pubis, febris plûs mi-
nûs acuta; ægri ut plurimum moriuntur quarto
vel septimo die, vel sequitur *ulcus* curatu difficil-
limum; internè quoad curam cum aliis inflam-
mationibus convenit; externè danda est opera ut
inflammatio *discutiat*ur, aliter expectanda est ex-
ulceratio.

ULCUS RENUM & VESICÆ.

Ulcus
vesicæ
signa.

Art. 718. In ulcere *vesicæ* adest dolor gravis in
pectine & pube, quoties ægri mingunt, urinæ dif-
ficultas accidit; sæpius & tenesmus, & membri vi-
rilis erectio. Si in pene vitium sit, inter meien-
dum dolor percipitur, quod in *vesicæ ulceribus* non
accidit, nisi juxta ejus collum ulcus consistat.
Malum ut plurimum est incurabile. Quomodo
distinguantur ulcera renum & vesicæ. " Inter
,, renum & vesicæ ulcera sic distinguitur (inquit
,, *Lommius*) *renibus exulceratis* non æquè difficul-
,, ter urina redditur, & quod ex his deteritur,
,, rubet, seu tenues trahuntur carunculæ, seu
,, filamenta capillis similia; minor etiam incidit
,, dolor, sæpiusque cruor urinæ permixtus. At ve-
,, rò *exulcerata vesica*, major est urinæ tum cu-
,, piditas tum difficultas; quicquid decedit, al-
,, bum est; dolores magis urgent, minus sangui-
,, nis

CAP. VII. *Ulcus Renum & Vesicæ.* 261

„nis excernitur; si meatus urinaris sive *urethra*
 „*exulceretur*, urina subcrassa est, particeps mo-
 „dici cruoris, vel certè puris. *Ulcera renum* prom-
 „ptius quàm *vesicæ* sanescunt.

Art. 719. Eadem sunt indicationes curativæ ac Curatio
 in ulcere Renum; *trochisci Gordonii* specificè lau-
 dantur; *therma*. Pro injectione convenit *aq. cal-
 tis cum trochisc. alb. rhafis (sacchar. Saturni.)*

Riverii sententia.

Art. 720. *Ulcus Renum vel Vesicæ* a tribus ex- Causa &
signa, &c.
 citatur causis; abscessu rupto post inflammatio-
 nem, humorum acrimonia; (qualis est ea, quæ
 mistum cruentum efficit), aut a calculo aspero
 dictas partes erodente; postrema hæc frequentior
 est; ac ferè ordinaria. Mistio purulenta est si-
 gnum diagnosticon. In ulcere Vesicæ, æt illius
 cervicis perpetua adest dysuria & continuus do-
 lor partem istam infestans, in ulcere Renum non
 ita; raro curantur in junioribus, in senibus nu-
 quam.

Art. 721. *Purgantia* debent esse leniora, ut Curatio.
cassia, rhabarbarum, &c. mercurius eximiam ha-
 bet vim omnia ulcera interna & externa *mundifi-
 candi & consolidandi*, ut etiam *terebinthina* cum
 pulv. *liquiritiæ* exhibiti ad ʒss. post debitas *eva-
 cuationes & revulsiones* ad *detergentia* progredi-
 endum est; inter illa *serum lactis, hydromel te-
 nue, lac asinum*, &c. post horum usum, ubi
 ulcus satis mundificatum fuerit (quod cognosci-
 tur quando pus minore quantitate excernitur,
 idque album æquale æ minimè foetidum) *glu-
 tinantia & consolidantia* exhibenda sunt, in-
 ter quæ *trochisci Gordonii* instar omnium ha-
 bentur, qui dolorem leniunt & ardorem uri-
 næ contemperant; dos. ʒij. vel iij. in hydro-
 mellite; vel dec. hord. præ cæteris *lac vac-*

262 *Ulcus Renum & Vesicae.* CAP. VII.
cinum cum bol. armen. 3ß. haustum singulis ma-
 tutinis testatur *Forestus* maximè conferre ad ul-
 cus expurgandum & consolidandum; *lac tepens*
 recens multum frequenter injectum præstantissi-
 mum est *anodynum* in quo si *trochisci Gordonii*
 dissolvantur omnes scopi tum doloris sedandi tum
 ulceris curandi adimpleri possunt.

Farrago sententiarum.

Prognos. *Art. 722.* Renum affectiones (inquit *Hippocra-*
tes) non vidi sanatas supra quinquagesimum an-
 num. Si quis sanguinem & pus mingat, & squa-
 mas, & odor gravis sit, vesicæ exulcerationem si-
 gnificat. *Hippocr. aphorism.*

Remediis
si. gularo. *Art. 723.* *Rhabarbarum* in parva dosi & diu ex-
 hibitum est remedium singulare ad ulcera renum
 & vesicæ curanda. *Hamilton.*

Pareira
Brava. *Art. 724.* Nescio an virtutes *Pareira Brava i.*
e. radice vitis sylvestris Brasiliensis satis tenta-
 tæ fuerunt, necne; de qua *M. Geoffroy* hæc ha-
 bet; exhibui felici cum successu hanc radicem *Ul-*
ceribus Renum & Vesicæ laborantibus, quorum u-
 rinæ tanto pure refertæ erant, ut meiendi impe-
 dimento fuerit; ex usu hujus remedii statim uri-
 nam liberè reddebant pure propemodum immu-
 nem, & progressu temporis adhibito paulo balsam.
Capiv. ad ulcera detergenda, ex his deploratissi-
 mis affectibus omnino sani evaserunt. In dolore
 etiam *colico & nephritico* mira præstat. Dosis in
 substantia a gr. xij. ad xvij. in decoct. ad ðij.
Hist. de l' Acad. Vol. xiv. p. 75. De virtutibus
 etiam hujus radice vid. *Transact. Philos. N. 365.*
 Ex propria experientia *D. Cheyne* in tractatu suo
 de Arthritide p. 50. testatur *Æthiopem minera-*
lem larga dosi bis in die sumptum, diuque conti-
 nuatum remedium esse certum ad ulcus Vesicæ cu-
 randum.

Æthiops
mineral.

Art. 725.

CAP. VII. Calculus Renum & Vesicae. 263

Art. 725. Ulcus *Vesicae*, quod a calculo fit, Prognosis
non curatur, nisi prius extrahatur calculus. Ulcera *Vesicae* sunt ferè semper incurabilia; Ulcera *Renum* non sunt adeo periculosa.

Art. 726. Remedia sequentia quandoque suo Remedia varia.
loco utilia; *agua calcis*, *decoctum balsamicum*,
decoct. incrassans, *enema terebinth. mistura balsamica nephritica*, *inctura antiphthisica*, *inctura cantharidum*.

CALCULUS RENUM & VESICÆ.

Art. 727. " Calculus definiri potest corpus du- Calculi definitio.
rum ex materia lenta terrestri, vi insita lapi-
descente, concretionem generatum; loco, quo
detinetur, dolorem obstructionem aliaque sym-
ptomata ut plurimum pariens.

Greenfieldi sententia.

Art. 728. Signa præcipua diagnostica *Calculi Renum* sunt quæ sequuntur. 1. in regione lumbo- Calculi renum signa diagnostica.
rum dolor fixus, continuus, gravativus, instar
ponderis in renis substantia cum sensu obtuso; la-
pillo verò e pelvi in ureterem exeunte incipit do-
lor dilacerans, & omnium acerbissimus. 2. infle-
xibilitas spinæ dorsalis extensione & compressione
nervorum. 3. lumborum ardor. 4. stupor cruris
eiusdem lateris ex pathemate nervorum. 5. retra-
ctio testiculi ex eadem causa. 6. urina vel cruen-
ta vel tenuis & limpida & pauca quantitate; at
verò post calculi in vesicam delapsum urina sta-
tim redditur admodum crassa, turbida, subnigra,
& copiosa.

Art. 729. " Ut accuratè distinguatur hic mor- Differentia a colica.
bus a *colica* (vid. *Art. 644.*)

Art. 730. Signa diagnostica Calculi in *Vesica* Calculi vesicæ signa diagnostica.
sunt sensus gravitatis in perineo & regione ingui-
nali,

264 *Calculus Renum & Vesicae*. CAP. VII.
 nali, perpetuum meiendi desiderium insequente
 dolore atroci præcipue in penis summitate cum
 egerendi conatu molestissimo & frequentissimo,
 undè prolapsus ani: "Pruritus molestissimus ad
 „caput penis, ejusdem frequens ac involuntaria
 „erectio, urina post motum vehementiorem cru-
 „enta, nullum levamen ex remediis ad strangu-
 „riam adhibitis, &c. sunt etiam signa Calculi in
 „Vesica; " sed signum omnium maxime indubi-
 tatum est, quod certissimè tactu deprehendatur a
 digito in anum indito: vel cathetere, de quibus
 consulatur auctor.

Excre-
scen-
tia car-
nos-
sa Calcu-
lum men-
tientes.

Art. 731. Interdum in *Vesica* inveniuntur ex-
crescentia carnosæ scirrhusæ vel fungosæ calculi
 symptomata ad amissim mentientes, exempla duo
 aut tria adducuntur. "Ejusmodi scirrhum bis in
 „cadaveribus vidimus, inquit *Baglivius*. Ex
 „testimonio *Lithotomorum* constat Calculum in
 „Vesica semper esse *liberum*, parietibus ejus-
 „dem nunquam adhærentem, neque membra-
 „na unquam involutum, prout a quibusdam
 „falsò perhibetur. *Vid. Lithot. Douglass. p. 6.*
 „Utcunque tamen verissimum est Calculum
 „quandoque inter descendendum a renibus, in-
 „ter tunicas ipsius Vesicæ in transitu hære-
 „re, que hospitari, & in molem grandiore ac-
 „crescere, capsæque inter ipsas tunicas forma-
 „ta, tandem aliquando ulcus deploratissimum
 „ibidem creare. " *Vid. Hist. de l'Acad. des*
Sci. Vol. vj. p. 29. & Memoir. p. 34.

Calculus
grandis in
rene.

Art. 732. Calculus grandior in Rene una cum e-
 jusdem ulcere est casus desperatus; aliquando verò
 natura, dictu mirabile, ultra spem omnem absces-
 sum efficiens per ipsos spinales musculos viam patefecit
 ad Calculum ejiciendum, & tandem Ulcus con-
 solidatum fuit. " Atque hinc quasi charta provoca-
 „toria, natura monstrante viam, ad aliquid ten-
 „tandum ars nostra laceffitur. Audax omnia per-
 peti

„ peti gens humana . Operationem *Lithotomia* Vesicae
 „ calis omni ævo chirurgi exercitarunt ; sed de *Li-*
 „ *thotomia Renali* , quod scio , nusquam omnino
 „ audivimus ante *celebrem Dominicum Marchetti*
 „ *Pataviensem* , qui e rene *Consulis Hobson* calcu-
 „ lum sectione eduxit , ægrumque ad integram sani-
 „ tatem restituit . *Transact. Philos.* No. 223. Unam
 „ adhuc aliam *nephrotomia* instantiam pari succes-
 „ su ex historia Gallicana affert D. *Freind*. *Hist.*
 „ *med.* Volum. 2. pag. 185. Sed , ut cum sagaci D.
 „ *Rutty* loquamur [in eleganti suo tractatu de du-
 „ *ctibus urinariis*] ex consideratione partium secan-
 „ darum est saltem pura puta *possibilitas* , ut hæc
 „ operatio feliciter succedat , *probabilitas* verò vix
 „ aut ne vix quidem .

„ *Art.* 733. “ Quod ad *lithiasin* attinet , *Galenus* Nullum
lithontri-
pticum .
 „ scribit nullum remedium suo tempore fuisse in-
 „ ventum præsidii Calculum Vesicæ frangentis , sed
 „ sola chirurgia seu incisione curari posse . Idem a-
 „ lii recentiores , & præstantissimi medici liberè fa-
 „ tentur . De *lithotomia* operatione , item de extra-
 „ ctione Calculorum in sexu sequiori videatur au-
 „ thor , qui egregie scripsit ; item consulantur *Cel-*
 „ *sus* , *Hildanus* , *Douglafs* , *Cheselden* , &c.

„ *Art.* 734. Sunt tamen remedia nonnulla plurimum Plura sa-
men vulgæ
credita .
 „ decantata , *lithonriptica* appellata (quamvis in re-
 „ rum natura talia non dari admodum probabile sit)
 „ inter quæ nuper aliquando celebriora fuerunt *elixir*
 „ *Dassæanum* , nunc satis vulgatum , *pulvis Rogeri* ,
 „ nihil aliud quam *testæ mytulorum calcinatae* , *liquor*
 „ *Tipping* , (apud authorem , p. 234. descriptus ;)
 „ cum his & aliis quam plurimis ejusdem commatis ;
 „ si mundus vult decipi decipiatur : interim nulla est de
 „ specificis *lithonripticis* hætenus vera fides .

„ *Art.* 735. Homo sexaginta annos natus solo usu Cautio .
 „ ol. amygdal. dulc. cum gt. aliquot balsam. Peruv.
 „ intra dies decem 65. calculos excrevit ; mihi in
 „ frequenti usu est *enema emolliens* seq. ʒi. *Rad. alih.*
 „ ʒi. herb.

℥j. herb. malv. parietar. mercurial. ana Mj. sem. lin. ℥ss. coq. in q. s. aq. font. ad ℥xj. colatur. add. tereb. vitel. ov. solut. ℥ss. ol. lin. ℥j. elect. lenitiv. ℥j. m. f. enema. & totus sequens.

℥. Rad. alth. ℥iv. malv. parietar. char. sol. flor. cham. melilot. ana Miv. sem. lin. ℥j. malv. petroselin. ana ℥iij. coq. in q. s. aq. font. ad ℔ij. pro solu. Quando diuretica indicantur, pulvis sequens diureticus cum apozemate subsequente vel cum sero lactis vel vin. alb. vel Rhenan. exhibitus multum valet;

℥. Sal. prunel ℥ss. cochin. ocul. cancror. test. ov. calcinat. sal. sambucin. vel sal. stipit. subar. ana ℥j. croc. opt. gr. xv. ol. junip. gr. vi. m. f. pulv. pro chart. iij.

℥. Rad. anonid. sænic. petroselin. liquirit. ana ℥ss. sem. alth. malv. cicer. rub. ana ℥ss. sem. q. frigid. maj. ℥j. ficuum ping. N. v. sebesten. N. iij. hord. mund. ℥j. gran. alkekng. N. vij. coq. in aq. pluvial. q. s. ad ℔ij. Ex observatione liquet diuretica multo melius operari cum illis, qui seipsos acri frigido exponunt & leviter se exercent.

Lithon-
triptica
alia decem
sunt.

Inter lithontriptica dicta *virga aurea* multum laudatur a *Matthiolo*, *Dodonæo*, &c. item *tinctura pil. Matth. pulv. milleped. lignum nephriticum*, *sanguis hirci*, *sp. nitri*, &c. Hæc sunt remedia in suo genere valde proficua, sed si quis existimet illa revera esse *calculus frangentia*, sciat illa esse merè nugamenta, & res nullius pretii. “Desperandum non est [inquit *Boerhaave*] de inveniendo aliquo menstruo contra calculum vesicæ, quod tamen tam blandum & molle sit, ut non lædat vesicam, & solvat tamen calculum in vesica. Habui menstruum, quod solvebat omnia saxa durissima in manu, manu interim illæsa; conficitur autem hoc ex *pane Secalino*. Sic illud menstruum quod distillatur ex ovo nullum in oculo dolorem facit, & tamen dissolvit myrrham, quæ per magnum & validum ignem dissolvi nequit;

CAP. VII. *Calculus Renum & Vesicae.* 267
 „quit; ideo procul dubio tale quid per industriam
 „humanam inveniri potest contra calculum.

Listeri sententia.

Art. 736. Calculi inveniuntur sub lingua [1245.]
 in palpebris, (1001.) in ductibus pituitariis, in
 cerebro, in hepate, in pulmone, in Vesiculis se-
 minalibus, in utero, in ventriculo, in intestinis,
 in articulis, tum manuum tum pedum, at multo
 frequentius in Renibus & Vesica. Calculus est
 quid verè lapideum a sale lapideque Calcario, &
 interdum a ferro metallo humoribusque quibusli-
 bet corporis concretum, calculi materiam ab escu-
 lentis & potulentis, quæ hujusmodi salibus lapi-
 deisque particulis abundant, provenire constat: si
 corpus benè se habeat, foras ejiciuntur, neque in
 Renibus aut Vesica retinentur; si Renes imbecilli
 fuerint & Vesica labefactetur, in lapidem coire
 apta sunt. Profectò robur inæquale partium est Cal-
 culorum præcipua ratio; ita Renum alter Calcu-
 los parit altero sano. Nisi vitientur tonus & vigor
 Renis expulsivus, Calculi vix nascuntur, nec supra
 modum arenularum concrevit materia lapidea.

Calenli
 in omnia
 bus ferè
 corporis
 partibus;

Causa;

Art. 737. Calculus *hereditarius* est incurabilis;
 facilius est enim uterum a pariendo prohibere,
 quàm Calculosos Renes Calculis vacuare. *Trochi-*
sci alkekengi somnum conciliant & Calculum pel-
 lunt. Dos. ʒj. “ Fœminæ rariùs quàm masculi Ve-
 „ sicæ Calculo laborant propter *viâ patentiam ac*
 „ *brevitatem*. Calculi Vesicæ dolores licet intole-
 „ rables, in longum tamen trahunt, per multos
 „ scilicet annos; *fròis* demum viribus, & vesti-
 „ ca magnitudine & asperitate lapidis attrita, mors
 „ sequitur, ni urinæ facta suppressione maturius
 „ tollantur ægrotantes.

Curatio
 difficilis.

Estimui-

*Ettmulleri sententia.*Calculo-
rum diver-
sitas.

Art. 738. Calculus in se non est morbus, sed productum morbosum; morbus propriè dicitur *lithiasis*, quæ est dispositio Renum vel Vesicæ ad Calculum generandum. Triplex ut plurimum est diversitas Calculorum, alborum, rubrorum; vel flavorum, qui ultimi sunt frequentiores. Calculi insigniores interdum in Renibus latent quieti sine ullo præternaturali symptomate; cum verò in motu sint, varia & gravia symptomata producant; & paroxysmum *nephriticum* faciunt.

Morbi hi-
storia.

Art. 739. In principio motus oritur dolor acutus, modò intensior modò remissior in regione lumbari, minùs tamen pungens, dolor est gravativus & obtusus; ubi verò Calculus movetur ex pelvi in ureteres, tunc dolor lancinans, pungens, & tensivus excitatur, nec antè cessans, quàm Calculus ad *Vesicam* descenderit, aut in *Renem* remeaverit. Sub paroxysmo ingruente urinæ sunt paucæ, aquosæ, acres tamen & stimulant. In paroxysmo ægri non possunt se erigere, nec corpus incurvare; stupor adest cruris frequenter in primò paroxysmo, sed non ita in assuetis & hoc morbo sæctis; testiculus etiam aliquando alter sursum dolorosè spasmò retrahitur, interdum adest tenesmus, & præterea nausea & vomitus, & non tardè difficilis respiratio, quasi cingulo constriunguntur costæ inferiores, item tormina, colica acerbissima spasmodica ex consensu nervorum. Omnia hæc symptomata in omnibus promiscuè haud reperiuntur.

Curatio.

Art. 740. Quoad curam *diuretica* imprimis fortiora in principio fugiantur, dum urgent dolores & spasmi, quoniam malum exasperant, *mitiora* sunt exhibenda cum *opiatis*, ut & *alvum* la-

laxantia, & *emulſiones*, *clyſteres emollientes*; aut cum *terebinthina*, minori quantitate injiciendi, & diu retinendi; *balnea* uſurpari poſſunt & *inunſtiones emollientes* ex *ol. cham. ſcorpion. junip. petrol. campbor. ſem. hyoſcyam. opio*, *unguent. dialth. nervin. &c.* Decoctum ſtorum *cham.* ſingulariter excellit in paroxyſmo *nephritico*, item *ſal volat. ſuccin. perſicaria* & *ſemen dauci lithontriptica* audiunt, item *millepedes*, & *ſimus columbinus* benè præparatus, & quod præſtat *ſal ejus volatile*.

Art. 741. Ineſt plerumque *nucleus lapideus* in Calculo *Veſicæ*; qui in initio ex *Renibus* deſcendit, & exinde augmentum lamèllatim acquirens. Sentiunt imprimis ægri obſtaculum, quod ſe opponit meatui urinario inter meiendum ita ut interdum urina in medio ſui curſu ſupprimatur, unde aſſiduum meiendi deſiderium, ſumma difficultas, & urinæ ſtillicidium, anus quoque in conſenſum trahitur, & tenefmo affligitur, quod eſt unum ex potiffimis ſignis; obtuſus eſt dolor in *Veſicæ collo*, & ſi grandior ſit Calculus, pondus in perinæo, dolor & pruritus in glande penis, & frequens erectio. Calculus aliquando *Veſicæ adnaſcitur*, & tanquam in *capsula* continetur, quod in caſu difficillimus eſt cognitu. In malo diuturno materia mucilaginofa, neq̃ non luſta ac argilloſa cum urina excernitur, quæ tanquam productum morbi agnoſcenda eſt ex nutrimento læſæ *Veſicæ*.

Art. 742. Cura eadem ferè eſt, ac calculi *renum*, prodeſt *aq. vel decoctum perſicariæ, betulæ, dauci*, &c. *urina hirci & tauri*, *millepedes in vino Rhenan.* Longo uſu mirabilia præſtant; pro uſu externo *petroleum*, *ol. ſcorpion. &c.* ut & enema ſequens, *℞. Ol. lin. amygd. dulc. ana ꝑiv. ſcorpion. ꝑj. tereb. ꝑß. m. ſ. enema.* (Si calculus ſit prægrandior curam non recipit niſi ex ſectiōe;)

Bagli-

Calculi
veſicæ hiſ-
toria &
ſigna.

Curationis
difficultas.

Baglivii, sententia.

Signum
pathogno-
monicum.

Calculi
in rene in-
terdum
diu sunt
sine dolo-
re.

Art. 743. In calculo *vesicæ* adest dolor in glande penis, pruritus, & irritatio continua, quod inter pathognomonica, ac certissima calculi vesicæ signa est. "Sectione defunctorum planè constat calculos interdum per longum tempus silere sine in-
signi dolore; immo quandoque per annos aliquot non est dubitandum. Heurnius refert se
reperiisse in uno rene defuncti calculos 80. & in altero 70. nihilominus homo dum vixit *dolores nephriticos neutiquam sentiebat*. Antonius Pozzis de calculis occultis in renibus ait se invenisse in hominis alterutro rene calculum non minus quàm sex uncias pendentem *sine ullo tamen calculoso affectu*. Et in quotidiana praxi observamus calculos ingenti mole excerni diutius in renibus priùs commoratos, quàm ad istud incrementum assurgere potuissent; excretos tamen *nullo praeunte dolore excepto in exclusionis paroxysmo* vidimus.

Cura ra-
tionalis.

Art. 744. Existente calculo in renibus, motu, quem facit descendendo per ureteres, irritatis, crispatisque vicinarum partium fibris, sæcum & urinæ secretiones sistuntur: tota igitur curatio dirigenda est ac impendenda in tollenda morbo-
sa irritatione & crispatura renum per *balnea oleosa, anodyna, & laxantia remedia*; nam ea ablata impeditæ tolluntur liquidorum secretiones. Quin imò sæpè observavimus, quod si calculus post x. vel xv. dies non descenderit ad vesicam, imprudenti *diureticorum* usu & nimia remedium præscriptione, ut vulgò faciunt medici, aucta in dolente renum loco majori oscillatione magis magisque figitur ibidem calculus, & multo difficilius educitur, quo in casu, crede mihi, lector, unicum remedium est *abstinere a*

re-

CAP. VII. *Calculus Renum & Vesicae.* 271
remediis, nam sola quiete calculus tandem profiliet.

Deckerfii sententia.

Art. 745. Nitrum pulverizatum & calculo affusum ignique moderato impositum ipsum consumit, primo quidem in viscidam mutat materiam, de-
Nitrum neque spiritus illius calculum frangit.
in aquosam; ast proh dolor! ab externis ad interna non valet consequentia; saltem expectationi non satisfacit *verus nitri spiritus*. In omnimoda urinæ suppressione *testæ ovorum calcinatae* ad ℥ij. vel 3j. assumptæ omnia reliqua medicamenta præcedunt. *Cochinel* in *vino Rhenano* ad ℥j. assumpt. est mite & suave medicamentum, sed magræ efficaciar. Omnibus commendamus *spir. sal. armoniaci* tanquam specificum *cum vino Rhenan. spirituve diuretico* ad præsertionem, ut & curationem ipsam. Nota bene. „Curationis scopus primarius est *dolorem* „*lenire*, alter *vias reddere patulas* tum urinæ tum „*sæcum*. Optabilius est, ut *natura* expellat calculum, quàm *medicus*.

Farrago sententiarum.

Art. 746. Arenas multi mingunt, & tamen non sunt calculosi; quoniam illæ non coguntur in lapidem, nisi viscido aliquo & crudo humore superveniente, ad quod itidem & tempore opus est. *Hollerius*. Symptoma illud scorbuticum mendaci specie calculum præ se ferens (de quo *Draviscius*) non solum scorbuticis, sed hypocondriacis familiare est. Tartarus sub specie sabuli rutilantis ut plurimum in urinæ subsidentia se prodit, quandoque in atomis adeo subtiliter divisus, ut visum fere effugiat, lateribus verò matulæ firmiter adherere solet; tormina *nephriticis* æmula concitat, & his comitem se adjungit stranguria ferè continua.

nua. Parum levaminis a calidioribus diureticis expectandum est; malum enim exasperant. *Spiritus salis communis* strenuum hic se præstat averruncum, ut & *spiritus lumbricorum terrestrium*, *essentia item nephritica e ligno nephritico cum spiritu salis extracta*. (vid. Art. 906.)

Observatio
D. Cypriani.

Art. 747. D. Cyprianus lithotomus celeberrimus inter 1400. quibus operationem celebravit, oinopotas quàm plures; sed ne unum quidem *zythopotam* calculosum invenit. *Cerevisiam blandam ac mitem*, & quo recentiore eo meliorem, omnibus calculosis in potum ordinarium commendavit. *Catherwood*.

Virtus ol.
lini, &c.

Art. 748. Oleum *seminum lini* intus sumptum per aliquot septimanas calculos ferè indolenter ejicit. *Hamilton*. (Multum etiam laudatur infusum *seminum lini* more *Thæ* diutius epotum.) *Oleum sem. sinap.* per expressionem [inquit *Boerhaave*] ut maximum remedium commendatur in *nephritide*, & *calculo vesicae & renum*.

Aqua persicaria.

Art. 749. Aq. *persicaria* valdè commendatur a D. Boyle. Julap. sequente quandoque in praxi usum; ʒi. Aq. *persicar. vin. Rhenan. ana* ʒvj. sp. *carmin. sylv.* ʒij. *test. ovor. præparat.* ʒij. *syr. de alth.* ʒiſs. m. f. otus sive balneum tepidum, emolliens & laxans ad calculum ureteribus hærentem movendum & expediendum maximum adjuvamentum præstat; usum ejus suo calculo ipse *Hippocrates* comprobavit lib. de affect. intern. sec. 15. Experientia enim evincitur a blando ac leni medicamento in *semicupio* sedenti exhibito plus auxilii provenire quàm ex mille lithontripticis vana ostentatione propinatis. Vires supereminentes

Semicupium.

Aqua Bristolensis.

Aquarum Bristolensium circa medium superioris seculi innotuisse ex memorabilibus D. *Maples M. D.* litteris *Decano Vvellenſi* anno 1665. datis satis liquet. "Ad *Rupem Vincentianam* tibi conſugiendam esse arbitror, e qua profiliunt aquæ
,, renibus

CAP. VII. *Ischuria Renalis & Vesicalis.* 273

„renibus & vesicæ calculosis sive exulceratis succurrere, nec non sanguinis massam contemperare, & ab illa segregandam urinam lenire & edulcorare aptæ natæ. “ *Aq. flor. spin. alb.* in frequenti usu fuit apud D. Radcliff, unde forsitan aqua nephritica Pharm. Londinens. Vires hujusce remedii a multitudine insectorum verno tempore istos flores incolentium oriri videntur.

Art. 750. Ad prophylaxin hujus effectus magna habenda est ratio ventriculi; quoniam ex illius cruditatibus materia generandis calculis suppeditatur; ideoque post debitas evacuationes remediis appropriatis roborandus est ventriculus; & frequenter potandæ sunt *aque minerales acidule ac sulphureæ*; potus ordinarius sit vinum tenue cum decocto *rad. eringii marini*, quod commendatur a Cratone.

Prophylaxis

Art. 751. Præter jam dicta, sunt & alia nonnulla remedia, quæ pro symptomatum horum affectuum diversitate saltem opem aliqualem ægris afferre possunt. *Aqua omnium florum, cerevisia de dauco, decoctum nephriticum, emulsio cum insus. vel decoct. fol. theæ facta, enema e quatuor oleis, enema terebinth. mistura balsamica nephritica, nitrum saturnizatum, pil. Marth. pil. testac. sp. juniperi, sp. nitri dulcis, semicupium Hildani, &c.*

Remedia varia.

ISCHURIA RENALIS & Vesicalis.

Etmulleri sententia.

Art. 752. Ischuria & urinæ suppressio totalis differunt saltem gradu; quandoque in ipso sanguine hæret causa, sed frequentius accidit ob renum vel vesicæ vitium; ob prius quando nulla urina sit in vesica, nullus tumor circa regionem pubis, nulla gravitas perinæ, ubi immisso cathetere uri-

Ischuria quid.

Causæ &
si impro-
mota.

na nulla extrahi possit. Causæ sunt vel calculi vel renum *æroia*, symptomata sunt angustia præcordiorum & anxietates, aliquando sudor foetidus & urinosus, torpor sensuum, vomitus, &c. Ferè ad 10^{am} vel 11^{am} diem supprimi potest ante mortem, aliquando die 14. moriuntur, rard ad 20^{am} vivunt; si tamen adsit sudor copiosus, interdum diutius supervivunt: quæ ab *æroia*, vel resolutione renum fit, ferè semper lethalis evadit.

Curatio.

Art. 753. In hoc affectu laudantur succus *rad. raphan.* & succus *limonum* (*sp. cochlear.* vel *succ. ejusdem*) item succus *parietaria* in antiquis parietibus nascentis, præ omnibus *sal succini*; si malum sit (spasmodicum *cinnab. antimon. millepedes, cantharides* in substantia & tinctura, infusum *fimi equini* in vin. Rhenan. egregium remedium, ut etiam *stercoris columbini*. Pro usu externo linimentum sequens, *℞. Unguent. dialth. ol. scorpion. ana ʒʒ. petrol. ʒij. tereb. [junip. ana] gt. xxx. m. f. liniment.* pro regione lumborum.

Ischuria
vesicalis.

Art. 754. *Ischuria vesicalis* a vitio vesicæ provenit, & a variis causis pendet; ut plurimum die 11. necat; pessimum est signum, quando nullum sentiant dolorem.

Curatio.

Art. 755. Si adsint causæ impediētes transitum urinæ, hæ sunt imprimis removendæ; si casus sit paralyticus, usurpanda sunt nervina internè, & externè, laudatur *oleum succini, clysteres terebinth. cataplasma ex parietaria cepis sub cineribus coct. & ol. scorpion.* convenit etiam *femicupium* ex *emollientibus* & *nervinis* exhibendo paulò ante incessum *blanda diuretica*. Immersio subitanea pedum ægri in *aqua frigida* urinam provocat.

Fulleri sententia.

Art. 756. Suppressio urinæ totalis, quæ fit, non a renibus, ductibusve urinariis lapide, sabulo, mucove obstructis; sed a sanguine ipso confuso, nimis stricto, & aded obferato, ut laticem aquosum intimius permixtum e sinu suo agre demittat: cujusmodi casus retulerunt *Riverius*, *Vuillius*, *Sylvius*, atque inter medicinam faciendam implemet etiam aliquoties observavi; exindeque cum agnovi, quodd nullus dolor vel lumborum vel pubis præcesserat; & vesica (teste cathetere) urinæ omnino vacua fuisset: hæce inquam notabilis & (nisi tempestivè & ritè tractetur) lethalis urinæ suppressio curatur (D. *Baynard*. monstrante viam) per *spiritum vitrioli nitivæ* in vehiculo idoneo liberaliter propinatum, atque eo certius, ut opinor, si *venæsectio* præmittatur. Hujusce instantias apud *Philos. Transact.* N. 215. lectu & observatu dignissimas videre licet. Sæpius in praxi, experimur (inquit *Vvaldschmidius*), quodd *senes* *huic morbo sunt proclives.* *nes urinæ suppressione* corripiantur, quandoque cum alio graviore morbo, quandoque sine eo, & talis urinæ suppressio plerumque solet esse lethalis; oritur enim a deficiente secretionem tum spirituum in cerebro, tum fermentorum in visceribus, ut & feri in renibus, ut rectè totalem viscerum obstructionem & lymphæ coagulationem hic accusamus: si enim esset a calculo, tum dolor lumborum adesset, & reliqua ealeu- li symptomata.

Farrago sententiarum.

Art. 757. Nullus hoc morbo laborans supervivit diem xvij. non *supervivunt.* *ut hoc in mea praxi observavi.* *Greenfield.*

Remedia
singulare.

Art. 758. In ancipiti calu & moribundo ex *ischuria* plurium dierum, aliis medicis dimissis hominem sic restitui, *℥. Succ. limon. recens express. ℥vj. succ. cochlear. hortens. ℥iv. hepatic. plantag. ana ℥ij. syr. violar. ℥ij. m. hujus ℥iv. tertius quibusque horis siccavit, & post die urinam copiose reddidit. Lister.*

Pulvis
apum.

Art. 759. *Apes siccata* in pulverem redactæ propinentur *vino albo*, urinam pauld post provocant, N. iij. sufficiunt ut plurimum. In seipso *Ischuria* laborante sæpius expertus est *Hibernia primarius Armaghanus. Mayerne.*

Remedia
alia.

Art. 760. *Bals. capiv. ad ℥j. vel ultrà, decoct. incrassans, haust. diuretic. acid. & pil. diuret. Fulleri* ului esse possunt, item *expressio diuretic. seq. Vvillissii. ℥. Milleped. viv. tinct. sal. tart. ana ℥ij. contunde & fortiter exprime Dos. gt. xl. vel l.*

STRANGURIA.

Ettmulleri sententia.

Stranguria
quid

Art. 761. Stranguria, Latinis urinæ stillitidum, est quando urina guttatim excernitur cum acerbodolore & continua stimulatione ex acore urinæ; ulcus vesicæ interdum pedetentim sequitur.

Curatio.

Art. 762. Exhibendum est *emeticum* cujus vires magnæ sunt in affectibus urinariis, item *laxantia cum mercurio dulci, rad. liquiritiæ cum sol. malv. in jure pulli, decoctum cort. aurant. opiat. Pro euporisto decoctum raparum* remedium sine pari, decoctum *sem. cannab. ol. amygd. dulc. syr. de alsh. succus cancrorum fluviat. decoctum bacc. alkekengi cum passulis.* Conveniunt *clysteres emollientes, injectiones* in vesicam ex lacte cum *ol. amygd. dulc. &c. Therma* etiam profunt.

D Y S U R I A.

Ettmulleri sententia.

Art. 763. Dysuria est excretio urinæ cum conatu & dolore, & ardoris sensu; ut plurimum fit „ ab abrasione mucis naturalis ductuum urinario-
 „ rum, quos isto munimine orbatos urinæ acrimo-
 „ nia irritat, & vehementer lædit; quandoque
 „ causatur ab excoriatione vel exulceratione vesicæ
 „ colli vel urethræ; excernitur materia crassa vel
 „ mucilaginosa, nutrimentum partium læsarum; ma-
 „ lum est, perquam molestum, non tamen per se
 „ lethale, interdum diuturnum, unde periculum est,
 „ ne exulceretur tandem vesica, aut urinæ inconti-
 „ nentia superveniat.

Dysuria
quid.

Art. 764. Remedia ad stranguriam hinc conveniunt, ut *ol. amygd. dule. decoct. malvæ, terebinthinata & balsamica, antimon. diaphor. cum tereb.* in forma pil. *clysteres emollientes, injectiones*, de quibus vide locum, p. 738. “ Sequens mucilago „ valde commendatur, *℞. Gum. Arab. ℥ij. tra-*
 „ *gacanth. ℥ij. aq. cinnam. ten. ℥x. syr. de alth. ℥ij.*
 „ *f. Mucilago cochlearum sumenda.*

Remedia
nonnulla.

U R I N Æ I N C O N T I N E N T I A.

Ettmulleri sententia.

Art. 765. Involuntarii urinæ profluvii causa est deficiens sphincteris vesicæ contractio a paraly-
 „ si, contusione, diuturniori mora in aqua frigida,
 „ partu difficili quandoque in ultimis gestationis
 „ mensibus. (*Lectissimi* plerumque sunt vel infan-
 „ tes vel senes sub cura medica haud cadentes.)
 „ Affectus est difficilis curatu, qui vigilantibus con-
 „ tingit; in senibus immedicabilis, nisi interdum

Inconti-
nentia u-
rinæ cau-
sa.

iis *therma* succurrunt, in morbis acutis malè omi-
natur.

Curatio
difficilis.

Art. 766. Pro scopo curativo in genere conve-
niunt *astringentia*, *nervina* & *antiparalytica*; spe-
ciatim decoctum *e lignis sudoriferis*, *calamintha*
& *mentha*, *pulv. mastic. thus*, *gum. Arab. castor.*
&c. laudantur: *specificum* audit *guttur galli rostum*
ad ʒj. in vino rub. propinatum, item *pulv. tunic.*
stomach. gallin. pudendum seu vulva suis quocun-
que modo præparat. in vigilantium ac dormien-
tium affectibus singulare experimentum, *mures ex-*
siccatis vel in butyro elixati.

MICTUS CRUENTUS.

Ettmulleri sententia.

Mictus
cruenti,
causa va-
ria.

Art. 767. Sanguis, qui tingit urinam, frequen-
ter a renibus effluit, interdum ex ureteribus, in-
terdum ex vesica, aut ex arterioli penis; est hæ-
morrhagiæ species, præcedere solet dolor gravati-
vus & tensivus in loco affecto; aliquando est *cri-*
ticus; a diureticis fortioribus interdum causatur,
item a nimia venere, a contusione, vel casu ab
alto, equitatione, saltatione, &c. *urina* sangui-
nolenta semper est opaca, turbida, & crassiuscu-
la plus minus, prout plus minus sanguinis est per-
missum, ex opaco nigrescit, ita ut linteum im-
mersum suo rubore sanguineo inficiat, si aliquam-
diu steterit, crassamentum deponere solet nigre-
scentis sanguinem grumosum exactè referens.

Indicatio-
nes cura-
tivarum.

Art. 768. In genere tollenda est sanguinis acri-
monia; remedia ad *hemoptysin* dicata conducunt;
venesectio interdum locum habet; *cathartica* non
conveniunt excepto *rhubarbaro*; semen *hyoscyami*,
sicut in aliis hæmorrhagiis, vim singularem ob-
tinet.

Mayer-

Mayerii sententia.

Art. 769. In mictu cruento intentiones sunt, ut humorum acrimonia, si adsit, obtundatur, aut impetus minuatur; inflammatio si adsit, tollatur, & vasa consolidentur & constringantur.

Art. 770. Vidi quendam, annorum circiter 40. qui a retentricis renum imbecillitate & vasorum laxitate tantum cruoris fundebat cum urina, ut corpus macilentum, exangue & penè tabidum evaserit, pulsus habens languidum ac febrilem. Eo usque res devenerat, ut refrigerata urina, inconcoctus sanguis in ea concreveret albicans, & gelatinæ potiùs quàm sanguini affinis. Vano labore assumptis & adhibitis omnibus remediis, tandem intra tres quatuorve dies convaluit, hausto quotidie mane lacte vaccini. recens multo supra ramum menthe rubre, eoque calente ex animali dulcorato satis syrupo cydon. & cinnamom. plures annos supervixit.

Farrago sententiarum.

Art. 771. Interdum aucto corporis motu cruentum lotium absque labe renis vel calculi præsentis suspicione potest accidere. *Boerhaave.*

Art. 772. Lac ovillum maximè laudatur a *Fo- resto*; sæpe, inquit, sanguinis mictum solo lacte ovillo, nempe sumendo lactis ℥iv. & bol. armen. ver. ℥j. curavi. Idem etiam laudant *Hollerius* & *Duretus* ex *Hippocr.* & *Avicenna.*

Art. 773. Constat mictionem cruentam statis periodis recurrentem ob hæmorrhoides suppressas quibusdam sine sanitatis detrimento accidere; hinc verum est illud *Hippocr.* quando ait, quod sanguinem mingere rarè quidem, & sine febre ac dolore nihil mali significet, sed lassitudinum solutio fiat.

Intentiones

Curatio singularis.

Quantumque accidit nullo existente calculo Lac ovillum

conis ac fe- doque accidit.

Remedia
varia.

Art. 774. Remedia ad hunc affectum curandum a capite de *hamorrhagia* petenda sunt. *Stercus porcinum* apud rusticos est remedium certissimum pro jumentis sanguinem mingentibus. *Radix symphyt. in lacte chalybeato coct.* quibusdam prodest. *Elektuarium Boyleanum, decoct. catechu, decoct. incrassans, haustus japonicus, nitrum saturnisatum, trochisci Gordonii, &c.*

DE URINIS.

Inter legendum & ex observatione.

Uinarum
composi-
tio & di-
versitas.

Art. 775. Urina præcipue ex aqua, sale, & terra conflatur; & quo plus salis respectu aquæ in se continet, eo rubicundior est, & quo minus, ed pallidior; & quo plus terræ, eo magis contentis saturatur, & contrà; si itaque terra & sale multo abundet, dicitur urina crassa, si parvo, tenuis: atque hinc quidem oriuntur maximæ urinarum diversitates, ex quibus deducuntur judicia, scilicet, a *consistentia, colore, & contentis*; aded ut quicquid de urina aliqua particulari pronunciaripotest, huc tantum redit; scilicet hanc urinam plurimum salis continere & terræ parum; secundam multo salis & terræ abundare, tertiam ex modico sale & terra & plurima aqua conflari, & sic de reliquis.

Colores
vari.
Urina al-
ba.

Art. 776. Colores urinarum sunt albus, fulvus, flavus, rubens & niger. *Albus* est vel *tenuis lymphida & aquosa*, vel *crassior & subalbicans*; quæ juri carniū semicoctarum assimilatur; & hujusmodi lotium plerumque reddunt pueri, dum febricitant, & etiam ii, quorum viscera lumbricis scatent, & non solum hi, sed etiam pueri sæpissimè, qui optima valetudine fruuntur, adulti quoque nonnunquam, ut taceamus fluore albo vel gonorrhœa laborantes, in apparatu variolarum, ut ipse

ut ipse sapissime observavi, excernunt *albicantem* urinam. *Alba remissior*, ut *lactea*, & *glauca*, incipientibus, & incrementibus febribus reddita, copiam materiæ putridæ, naturæque laborem demonstrat; quod si autem diutius fertur, longi frigidiq[ue] indicium morbi præbet.

Art. 777. Urina *tenuis & aquosa* in plurimis morbis occurrit; talis redditur in affectibus ventriculi, & indigestiones ac cruditates plerumque denotat; item in chlorosi, cachexia, hypochondriacis & hysteriis affectibus; hujusmodi urina tenuis & aquosa copiosa quantitate non raro est signum animi perturbationum, & sapissime paroxysmorum hysteriæ vel affectuum quorundam spasmodicorum prodromus, unde conicere licet hos affectus a salibus urinosi provenire, vel saltem iisdem foveri. Tenuis urina quoque conspicitur in diabete, hydropse, aliquando in apparatu variolarum, frequentius in declinatione. In nephriticis pauld ante paroxysmum, denique a computatione aquarum mineralium aliorumque liquorum tenuium, spirituosorum, diureticorum, &c. In febribus male ominatur; a turbida & crassa in tenuem & aquosam mutata est signum imminenti phrenitidis, scilicet, per materiæ febrilis in cerebrum merathesin.

Tenuis & aquosa.

Citrina.

Art. 778. *Fulvus* sive *citrinus color* in urina statum naturalem ut plurimum denotat. Et quoad quantitatem urina debet esse in proportionem aliquanto minori (foras subtriplo) liquidorum assumptorum: ab hac norma verò non raro deflectit, nunc superabundans, nunc deficiens.

Art. 779. Urinæ *flavæ* sive *aureæ* duo sunt gradus, viz. *flammea*, quæ in febribus tertianis, ut etiam in variolosis, & non raro in benevalentibus cernitur: Et *crocea*, quæ hysteriis, scorbuticis, hypochondriacis, ut etiam iis, qui rahabarbi. crocum, folia sennæ, &c. comederunt, plerumque cernitur.

Flava sive aurea.

Art. 780.

Rubicunda.

Art. 780. Urina *rubicunda* est signum febricitantium, sed non proprium; nam in scorbuto diuturno urina tam intensè rubescit, ut non magis in febre ardente, in arthritide quoque urinæ intensa rubedine saturantur.

Viridis ac nigricans.

Art. 781. Urina *viridis* ac *nigricans* est signum plerumque morbi cuiusdam virulenti aut venenati, aliquando in febribus quartanis conspicitur, ut etiam in puerperis, & his, quæ menses habent obstructos (teste *Galeno*), in calculosis etiam post calculum foras eliminatum, in melancholicis purgatio non operans urinam facit nigram; cassia & alia quædam pharmaca intus sumpta lotium atrum reddunt.

Urinarum contenta.

Art. 782. Contenta urinarum respectu locorum in matula tria nomina sortiuntur, viz. in summitate *nubeculam*, in media *enzorema*, in ima parte *hypostasin* vocamus.

Art. 783. Nubecula in urina in morbis tam chronicis quàm acutis est signum redeuntis in stomachum fermenti, & recuperatæ plus minus digestionis.

Bullæ & spuma.

Art. 784. In summitate urinæ interdum conspiciuntur *bullæ* & *spuma*; talem urinam vidi in mania laborante, in qua spuma & bullæ per integram nycthemeram manserunt, & eadem urinâ hypostasin valde nigricantem deponebat. *Cremor innatans* in urina phthysicorum plerumque cernitur, sed frequentius in hypochondriacorum. Urina in summitate *caudam* pavonis repræsentans ut plurimum est signum scorbuti. *Pinguedo* aliqualis & *guttula* quædam *oleosa* frequenter apparent in urinis febre ardente, colliquativa, aut etiam hæctica, ulceribus renum, & similibus afflictorum.

Enzorema.

Art. 785. *Enzorema* in praxi quandoque occurrat, sed nihil peculiare, quod scio, indicat; nisi quod in febribus plenioris concoctionis appropinquantis indicium sit.

Art. 786.

Art. 786. Hypostases sive sedimenta in Urinis sunt vel alba, vel nigra, vel rubra, aut saltem his vicina; *album sedimentum* in benevalentibus occurrit, *nigrum* in Urinis nigris, de quibus antea. *Rubrum & crassum* sedimentum ad instar pulveris laterum in febribus intermittentibus, & remittentibus, & etiam in scorbuto, & colica frequentissimè occurrit. Quibus febricitantibus, in Urinis subsidentiæ fiunt crassiori farinæ similes, longam infirmitatem significant (inquit *Hippocrates in Aphorif.*)

Sedimenta varia.

Art. 787. Sunt & alia in Urinis contenta, quæ præternaturalia & quasi accidentalia dicta sunt; talia sunt arenæ, calculi, pus, sedimenta fursuracea, sanguis, &c. Arenæ in scorbuticis; *caruncula & sedimenta fursuracea* in Urinis calculo laborantium, necnon in vesica & renum ulceribus excernuntur *fursuracea*: sedimenta aliquando etiam in morbis cutaneis, ut pruritu, scabie, &c. occurrunt. Materia *purulenta* non tantum a renibus, verùm aliquando a vesica & meatu Urinario ulcere affectis in lotio deponitur; quandoque e vasis & locis genitalibus sanies, semina corruptum, & fluor albus Urinis suffunduntur, & subsidencias purulentas efformant; postremò sedimenta purulenta in Urinis peripneumonia aut empyemate laborantium reperiuntur, quæ etiam morbum solvunt. Urina *cruenta* non tantum in calculosis occurrit, sed etiam in plerisque scorbuticis multo cum levamine modò limites non excedat; nec defuerunt quædam scemina, quæ sua catamenia per vias urinarias inter lotium per multos annos innocuè emisissent, hujusmodi historiam habemus apud *Hollerum*, &c.

Contenta præternaturalia.

Art. 788. Post omnia vero quotquot dicta fuerunt (ut proverbiali utar dicto), urina est meretrix & mendax; nihilominus urinarum inspectio in praxi medica est usus eximii, modò cum reliquis

Cessellium.

liquis symptomatis diligenter pensatis conjungatur, tum ad judicandum ægritudines earumque statum, tum etiam ad curandos morbos. Ideoque periti & fidelis est medici operam dare, ut, quod artis est de Urinis, haud temerè negligat, neque artis suæ limites transiliat.

C A P U T VIII.

Sive Fasciculus Morborum octavus.

C O R P U L E N T I A N I M I A.

Ettmulleri sententia.

Corpulentia sive obesitas.

Art. 789. **C**orpulentia nimia sive obesitas nimia; est, quando corpus totum tam venter quàm artus in tantum augentur, ut actiones, imprimis motus ac respiratio, aut omnino impediuntur, aut insigniter vitientur. *Sennertus* refert mulierem 450lb. item virum 600lb. pendentem. Prostant exempla apud *Schenckium* corpulentorum obesorum suffocatorum. "Obesitas nimia corpus reddit variis morbis obnoxium, speciatim apoplexiæ, asthma, hæmorrhoidibus, calculo, ulceribus crurum, hydropi, &c.

Difficile tollitur.

Art. 790. Ad obesitatem tollendam non datur præstantius remedium quàm acetum scilliticum jeuno stomacho haustum. Semen fraxini seu lingue avis ad ʒi. manè in haust. vini propinatum insigniter commendatur ad evacuandam urinam, ratione cujus & hydropicos curat & crassos emaciat.

Valde obesi quam.

Art. 791. "Borellus commendat masticationem
,, sol.

„ *fol. tabaci*, sed in omnibus minùs convenit, doque subito moriuntur.
 „ ne ad *tabem* disponat. Qui natura sunt valde
 „ crassi magis subito moriuntur, quàm graciles; “
Hippocratis Aphorism.

C A C H E X I A .

Art. 792. “ Cachexia ita dicitur a corporis ma- Cachexia causa.
 „ lo habitu; nascitur plerumque ex intemperan-
 „ tia ægrotantis, vel alicujus morbi prægressi ma-
 „ la curatione; a tumore scirrroso jecoris vel lie-
 „ nis, vel a fluxu hæmorrhoidum nimis longo &
 „ profuso, vel aliis hæmorrhagiis; ex febribus
 „ continuis diuturnis, vel intermittentibus malè
 „ curatis; ex crapula, vel nimia spirituosorum li-
 „ quorum ingurgitatione; ex chlorosi, catamenio-
 „ rum obstructione vel fluxu nimio, & ex innu-
 „ meris aliis causis.

Art. 793. “ Signa diagnostica sunt pallor su- Signa dia-
gnostica.
 „ balbidus, aliquando etiam plumbeus color, de-
 „ bilitas ac piger corporis motus cum inflatione
 „ aliquali, in quibusdam ventris fluor cum feбри-
 „ cula vesperi recurrente, pulsus creber ac den-
 „ sus, cibi fastidium, & vini magis appetentia,
 „ urina biliosa, interdum verò rubicundissima,
 „ frequenter autem cruda & pallida.

Estmulleri sententia.

Art. 794. Cachexia est affectus in quo natus Cachexia descriptio.
 & floridus cutis color, ac imprimis faciei nitor,
 perit, mutaturque in pallidum, lividum, luteum,
 virescentem, intensè rubicundum, &c. frequen-
 ter cum corporis habitu subrumido, lassitudine,
 &c. adest sæpe febris lenta, ægro vix sensibilis.

Art. 795. Principium curæ a vomitu faciendum Curatio-
nis me-
thodus.
 est: attamen ante vomitorium consultum erit, ut
digestiva salina præmittantur cruditates solventia,
 ut *crem.*

286 *Leucophlegmatia & Anasarca.* CAP VIII.

ut crem. tartar. tartarum vitriolatum, sal digestivum hypochondriacum. Col. a ʒi. ad ʒß. bis in die; sal. absynth. tinctura sal. tartar. &c. item pulveres absorbentes dicti, antimon. diaphoretic. antihectic. Poteri; & tunc propinandum est vomitorium, vel, si minus conveniat, catharticum; deinde his ita præmissis fit accessus ad *martialia*.

Remedia
singulare,

Art. 796. " In tota republica medica vix datur
,, præstantius remedium quàm *mistura ecphracti-*
,, *ca Fulleri*.

LEUCOPHLEGMATIA,
& Anasarca.

Estmulleri sententia.

Leuco-
phlegma-
tis unde.

Eiusdem
signa,

Art. 797. " Quoties in toto habitu pinguedinis
,, subcutaneæ lymphæ stagnat, vel effunditur, hy-
,, drops oritur ἀνὰ σάρκα, ὑπὸ σάρκα, λευκοφλεγ-
,, ματία, qui & circa abdomen & circa scrotum.
Boerhaave. Signa Leucophlegmatiae sunt totius
corporis tumor albus, mollis, laxis, reverà œde-
matofus in pedibus ac cruribus potissimum & ma-
nibus, bibendi desiderium, urinae tenues, albæ,
&c. incipiente cachexia (inquit Lommius) vitia-
,, tur cibi concoctio, incolumi etiam appetentia:
,, progressu verò temporis hæc quoque offenditur:
,, spiratio debilis ac rara, alvus varia ac inæqua-
,, lis est, atque huiusmodi *cachexia crudæ* seu *pitui-*
,, *tosa* nominatur, hydropis speciem antecedit,
,, venturamque prænunciat; quam λευκοφλεγματία
,, Græci nominaverunt.

Curatione

Art. 798. Præter purgantia & martialia, &c.
in cura cachexiæ superius laudata, hic conveniunt
sudorifera & diuretica, speciatim decoctum ligni
guaiacæ. &c. Lixivium ex ciner. absynth. genist. &c.
post martialia, amara (& stomachica) utramque
faciunt

CAP. VIII. *Leucophlegmatia & Anasarca*. 287:
faciunt paginam : In *Anasarca* conveniunt *folia*
virid. bardane plantis pedum & juncturis appli-
cata : nam mirum est quantam fuliginem extra-
hant cum ægrorum levamine.

Vuillistii sententia.

Art. 799. *Anasarca* est totius corporis exterioris *Anasares* :
ris, aut quarundam ejus partium, tumor albus,
mollis, tactui cedens, & foveam a compressionem
relinquens.

Art. 800. In curanda *anasarca* *lixivialia* cæteris *Curatio.*
diureticis longè præstant. *℥. Ciner. genist. ad*
albedinem calcinat. & cribrat. *℥iv. ponantur in*
lagena vitrea cum vin. alb. ℥iij. digerantur clau-
sè & calidè per hor. iij. vel iv. dein coletur vi-
num dos. coc. vj. vel viij. bis in die. ℥. Ciner.
genist. alb. & mundat. ℥ij. rasur. lign. sassaf.
℥iij. rad. galang. ℥j. bacc. junip. sem. dauc. ana
℥iβ. f. saccul. pro cong. iv. cerevis. post 7. vel 8.
dies hauriri incipiat. Chalybeata in hoc morbo
sæpenumero egregie profunt, & aliis præstant
præparata, quæ sulphure non spoliantur; *℥. Ra-*
sur. lign. sanct. sassaf. ana ℥iv. rad. irid. florent.
calam. aromat. galang. minor. enul. campan. ana
℥iβ. bacc. junip. laur. ana ℥ij. sem. anis. carui,
fœnic. dulc. coriandr. aneth. ana ℥iβ. piper. long.
cubeb. ana ℥iβ. caryoph. N. M. zinzib. ana ℥iβ.
piper. Jamaic. ℥ij. sol. sic. salv. scordon. calamenth.
agrimon. ana m. liquirit. ℥iij. incis. & contus. coq.
in aq. font. cong. iv. ad mediet. colatura servetur
in lagenis vitreis ad usum; hujus potu constanti
plures Anasarca ferè deplorata laborantes convaluis-
se novi, p. 254. Medicamentum sequens fuit præ-
scriptum Radcliffeanum: ℥. Cort. interior. sam-
bus. mij. summit. absinth. Roman. mβ. rad. gen-
ian. ℥β. sem. finap. dauc. sylv. ana ℥iij. infund. in
vin. alb. Gallie, ℥ij. Bibat. haustul. ter in die.

HY.

H Y D R O P S.

Sydenhami sententia.

Hydrops
historia.

Art. 801. Foveæ a digitorum impressione in surarum parte inferiori, sub noctem imprimis conspicuæ & manè evanescentes, primum hujusce morbi indicium præbent, maxime si adsit dyspnœa. Paulatim crescit morbus, & abdomen quoque intumescit, & reliquæ corporis partes emaciantur. Tria hunc morbum stipant symptomata, *dyspnœa, urina paucitas, & sitis intensa*. Causa hujus mali in genere est debilitas sanguinis.

Indicationes
curativæ.

Art. 802. Indicationes curativæ sunt tantùm duæ, viz. *aquæ evacuatio* & sanguinei roboris *instauratio*. Magni interest, an æger faciliè vel difficulter purgetur. *Cathartica fortiora*, & quæ celeriter operantur, mitioribus & segnioribus sunt præferenda, & repetenda sunt, quoties ægri vires ferre queant. Duò sunt medicamenta palmaria, nempe *elaterium*, & infusio *crocii metallorum*. Quinam sint meatus isti, per quos aquæ ex abdominis cavitate in intestina deducuntur, incertum est; experientia verò constat a dicto emetico sursum ac deorsum potenter evacuâri, & quasi ruptis repagulis pleno alveo effundi. Est etiam aliud medicamentum, quod hunc morbum expugnat, vomitionem ac catharsin ciens pariter ac *crocus metallorum*; viz. *℥i. Cort. interior. sambuc. miiij. coq. in aq. & lact. ana ℥ssj. ad dimid. colaturæ capiat ægrotus dimidiam vesperi & reliquam manè, repetatque quotidie, donec convalescat*.

Sanguis
ne viscera
corroboranda
sunt

Art. 803. Fatendum est tamen quòd in quibusdam casibus *emetica* & *cathartica* malum non tollant, sed potius augeant; rebus itaque sic se habentibus totus curationis cardo in sanguine ac visceribus

scribis omni ope *corroborandis firmandisque* omnino vertitur; ad hoc autem magnopere conducunt *aeris mutatio* atque *exercitium*. Ii quorum crases sunt debiliores, quàm ut purgantibus ferendis pares sint, *diureticis* evacuandi sunt; illa optima sunt, quæ e salibus *lixivialibus* fiunt, nec quicquam refert e quorum vegetabilium genere cineres petantur: sequente infusione uti soleo;
℥l. Ciner. genist. ℥ij. sol. absynth. mjj. vel ij. vin. Rhenan. ℥iv. infunde frigide; dos. *℥iv.* manè hor. 4^{ta}. pomerid. & serò.

Diuretica
 usupanda

Art. 804. Aquis his modis eductis ad *corroborantia* deveniendum est; in hunc finem ægrotus bibat vinum & liquores generosiores, item capiat *invigorantia*, *stomachica* & *amara*; primum locum obtinet *chalybs*, *allium* quoque multum confert. Semper recordandum est, quum sanguinis corroborationi navatur opera, quòd tota res in eo solum cardine vertatur, & æger nullo modo expurgandus sit. Morbus ad supremum gradum proventus artis subsidia spernit.

Stomachica
 & amara

Etzmulleri sententia.

Art. 805. *Hydrops primarius* per se incipiens plerumque vitio læsæ in primis viis digestionis ortum debet; *secundarius* ex variis causis oriri potest, ut hæmorrhagia, febre intermittente, &c. *Hydrops* superveniens morbis chronicis, & ætate gravescentibus rariùs curatur. *Sudor* in *ascite* plus nocet quàm prodest; evacuationes per alvum & urinam sunt magis proficuæ. In initio *Hydrops* tanquam *cachexia* curatur. Rectè dicit *Lindanus* qui vult curare *Hydropem*, rarò debet purgare, dare tamen tunc debet ea quæ certò ac vehementer purgant, sed rarò; intermedio tempore propriatis & aperientibus, ac massæ sanguineæ vitia ex cruditatibus orta, ac reliquorum humorum

Methodus
 medendi.

T

corri-

corrigentibus, & in naturalem crasin reducentibus, debet insistere. Instituantur purgationes decrescente luna. " Qui cachexia laborant inveterata (inquit *Dolaus*) & qui sunt quasi eviscerati, iis non conducunt *cathartica* nec *diaphoretica*, aut alia ulla remediorum genera a quibus exhauriendis accommodata, sed solis *corroborantibus* utendum. Hujusmodi itaque in casibus serò nimis accersito medico aliud nil quicquam restat faciendum, nisi ut prudenter præmisso permagni illius, in quo ægroti versantur, discriminis prognostico, experimentum faciat, quantum auxilii sit sperandum ex usu *cardiacorum martialium*. Et si scorbuti labes simul adsit, cum *antiscurbuticis* commixtis res peragenda est.

Diuretica
& purgantia.

Art. 806. In Hydropse curando *diuretica* sunt omnium optima, sed semper præmitti debent universalia *attenuantia*, *aperientia* & *laxantia*, aliàs non tuto ad *diuretica* acceditur. *Purgantia* sunt *cort. sambuci*, *ebuli*, *rad. irid. resin. jalap. gum. gutt.* præ omnibus *elaterium* teste etiam *Lindano*, denique *colocynthis*; inter mineralia, *pilul. lunares*, *mercurialia*, &c. cæterùm his purgantibus semper interponenda sunt *stomachica*, inter quæ eminent *absynthium*, *marrhubium*, &c. proximo loco *diuretica* in usum revocanda sunt, *radix alii* multùm laudatur (in quibusdam verò intolerabilem capitis dolorem excitat) item *bacc. juniperi*; sed præ reliquis omnibus succus *herbæ kali* ad ℥ss. bis in die in haustul. vin. tribus tantùm diebus singulis septimanis usurpetur, aliàs nimis urinam pellit; item eodem modo cineres *busonum* ad ℥j. vel ultra. " Hoc remedio *Romæ* sanatus fuit *Hydropicus* diu decumbens, cui ejus uxor, sumptuum pertæsa, de eo dederat, venenotollere cogitans, unde copiosum reddidit lotium, iterùmque dato pulvere, ut mortem præcipitaret, ret f

„ ret; sed multò uberius reddita præter spem sã
 „ natus est vir ejus, ut habetur in lib. Vvieri de
 „ Lamiis. Helleborus niger (monente *Avicenna*)
 „ urinam potenter movet. Hujusce remedii
 „ (inquit D. *Fernelius*, Hist. Med. p. 105. vol. 2.)
 „ vires frequenter expertus sum; & in Hydrope;
 „ confiteor, effectus plus admirandos, observavi;
 „ quàm ex alio qualicunque diuretico.

Vuillifii sententia.

Art. 807. Ascites *anasarca* superveniens est fa- *Ascites.*
 cillioris curationis, quàm morbus iste *solitarius*
 propter tumores circa viscera, vel propter vasa
 lymphatica, aut lactea disrupta eveniens. Si quan-
 do in Ascite, a cathartico exhibito, aqua copio-
 se cum *Apoëia* per sedem evacuat, indeque
 abdominis intumescencia quidpiam minuitur, de
 curatione non desperandum erit; si verò venter
 plus intumescat, & velut *tympaniticus* evadat;
 morbi eventum non nisi funellum expectare li-
 cet.

Art. 808. Fœmina ascite gravissima, ac; uti *Cutatio.*
 mihi videbatur, deplorata laborans, medicamine
 seq. per vj. dies continuos assumpto, multo me-
 lius se habuit, & brevi postea integrè convaluit;
℞. Gum. gutt. Gamb. gr. xij. ol. cinnam. gt. j.
conserv. ros. rub. q. s. s. bolus; dosis indies augea-
 tur ad gr. xx. *jalapium* & *elaterium* potentissima
hydragoga habentur. *Diuretica* quoque in hoc mor-
 bo conveniunt; & si cum *tympanite* complicatur,
 applicari potest *empl. diasaponis*, & injici enema ex
urina sani, &c. infra descript. (829.)

Boerhaavii sententia.

Art. 809. Hydrops in genere producitur ab o- *Causæ hy-*
 mní causa, quæ valet r. liquidum serosum ita co- *dropis in*
 T 2 erce- *genere.*

Signa.

ercere, ut stagnare faciat in vasis, vel 2. ipsa vasa rumpat ita, ut intra membranulas effundatur, vel 3. vasa reducentia a cavitatibus ita obstruat, ut liquida non exhalent, nec resorbeantur. Causæ hæ sunt variae, aliquando morbi acuti; tumores scirrhusi alicujus visceris insignioris, evacuationes quæcunque nimiae, præsertim hæmorrhagiæ, &c. Signa sunt tumores, primò pedum ac crurum, & postea abdominis indies crescentis, hujus extensi sonus in *tympanite*, si pereutiat, in *ascite* strepitus fluctuantis aquæ; at in *ascite* ab aquis clausis in suis cistis, fallit. Adest insuper dyspnœa, sitis, gravitas, torpor, alvus dura, urina pauca, febricula lenta, sudor nullus, macies, vultus livor, &c.

Intentiones curativæ.

Art. 810. Ad curationem primò fluor conciliandus est lymphæ *cardiacis*, *roborantibus* & *stimulantibus*, quæ, si sitis valida non urgeat, petuntur ex *aromaticis*, *salinis*, *oleosis*, & *calidis* sub variis formis, inter quas eminet *vinum medicatum* & *infusum nostrum*. Si verò morbus erit validior, & sitis vehementer urgeat, adhibenda sunt *cardiaca reficientia*, *acida grata*, & leniter *aromatica*, videantur remedia. (In hoc casu *tartarus vitriolatus* est proficuus, item *aqua Spadana*, *Tunbrigenses*, &c. cum vin. Rhenan.) Secundò liquidi nimia tenacitas (si adsit) tollenda est *salibus alcalinis*, *volatilibus* & *fixis*, item remediis *mercurialibus*, *antimoniatis*, & e *cupro* præparatis. Tertiò aquæ in cavitates congestæ educuntur, interdum *Paracentesi*, de qua operatione vid. locum, *emissariis* arte factis, *causticis*, *lanceolis*, &c. (sed huic praxi adversatur *aphorismus Hippocratis*; Hydropicis ulcera in corpore orta non facile sanantur.) *Diureticis*, *vomitariis*, quæ mirabiliter in hoc morbo prosunt; *catharticis*; *dissipatione*, *calore foci*, *hypocausti*, *furni*, *arenæ*, *solis*, *salis*, *fimi*, &c. tum maximè pertinaci abstinencia a potu, victu panis biscocti cum paucò sa-

le ex

le ex pauxillo vini oleosi. Labes viscerum debilitatorum emendatur *chalybeatis* & *roborantibus*, victu sicco, vino veteri merato, & exercitio. Egregium est vinum chalybeatum, stomachicum nostrum. ℞. *Limatur. chalyb. cort. Peruv. crassè pulv. ana* ℥j. *rad. rhei pulv.* ℥ß. *vin. hocco-morenf.* ℔ij. *infunde frigide; dos.* ℥ij. *vel iij. ter in die.*

Mayeri sententia.

Art. 811. Mercurius dulcis exteris intactis quavis causas morificas aggreditur, & si superari possint, prosternit; sed dandus est iste athleta in debita dosi: scio aliquando hoc succedere *ptyalismum*, qui præcavebitur addito *cathartico* satis activo; sed si nihilominus moveatur sputum, nihil est periculi, imò *salivatio* in Hydrope, quamvis semper sit molestia, attamen sæpissime est salutaris. Nihil majus dat Hydropicis levamen, quàm larga *urinarum profusio*, idque cum minima virium dejectione. Sales omnes sunt diuretici, verùm *nitrum* omnibus præfero, quod sitim, intolerabile in hoc morbo flagellum, extinguit, & calorem præternaturalem visceribus in hac muria mersis impressum egregiè temperat. *Ova formicarum* in lacte ebutyrato cocta copiosè urinam movent. ℞. *Ovor. formicar. coch.* j. coq. in lacte ebutyrato, exprime & dulcora paucosacchar. detur manè superambulando hor. 4. ante prandium per octiduum. Mulier Hydropica, cui hæc ova præscripsi, mirè commendavit, dixitque movisse ingentem flatuum copiam, & prolixos crepitus magno cum levamine; dixit etiam frequens primò ortum meiendi desiderium, tandem se fuisse copiosas urinas, ita ut una vice totam repleverit matulam sæpius.

Laus mercurii dulcis

Nitri.

Ovorum formicarum.

Listeri sententia.

Abstinencia a potu.

Art. 812. Quædam Hydropica ab omni potione ex toto abstinuit per mensem; ad sitim autem fallendam sic fecit, tenuem ac parvam particulam panis tostii cum *spiritu vini* intincti super linguam detinuit ad salivam potenter movendam, & convaluit.

Abstinencia a potu.

Art. 813. "Pharmacopola quidam, habitus ob-
 ", besioris, vir equidem haud mediocris ingenii,
 ", neque inhonestæ existimationis, in Hydropem
 ", incidebat; valde intumuerunt crura, & venter
 ", quoque turgescere incepit. Hic ex lectione *præ-*
 ", *cedentis sectionis* animum obfirmavit, & secum
 ", decrevit ab omni potu per 30. dies abstinere,
 ", & abstinuit; unde a morbo gravissimo libera-
 ", tus est. Idem vir probus (ut nuper aliquis
 ", mihi retulit) in eundem morbum lapsus *eidem*
 ", *experimento* spem omnem sanitatis recuperandæ
 ", iterum crediturus est. Huic affinis est Historia
 ", *Samuelis Ongly Equitis aurati opulentissimi*,
 ", civibus Londinensibus, dum vixit, satis noti.
 ", Hic, cum septuagenarius esset, in Hydropem
 ", incidit deploratissimum, medicis celeberrimis
 ", (quibus fretus) prorsus incurabilem. In hoc
 ", rerum statu animo secum statuit *se a potulen-*
 ", *tis quibuscunque ex toto abstinere*: sitim vix
 ", tolerabilem forti animo aliquot menses susti-
 ", nuit, ac convaluit; & vixit sex vel septem
 ", annos ab isto morbo immunis, & non nisi
 ", biennium circiter abhinc, dum hæc scribo mor-
 ", tuus est. Atque hic reticere nequeo (*utunque*
 ", *me forsitan ludibrio sibi quis habuerit*) *expe-*
 ", *rimentum*, paucis credo adhuc notum, curandi
 ", intumescentiam crurum equorum mediante ni-
 ", mirum *potus eorum decurtatione*. Hic morbus
 ", Hippiatratis vulgò *The Grease* appellatur, equi
 ", hoc

„ hoc malo affecti decumbere omnino respuunt ,
 „ unde intumescencia valde augetur , & insupera-
 „ bilis quandoque evadit . Methodus medendi
 „ breviter sic se habet . Qui curam equi attendit ,
 „ duas tantum aqua libras ad potandum equo
 „ præbere solet , manè & vesperi , ad dies 6. vel
 „ 8. quo tempore curatio efficitur ; crura detu-
 „ ment , & equus ad dormiendum procumbit ,
 „ &c.

Art. 814. Quod ptarmica faciunt in naribus , i-^{Latus elat.}
 dem elaterium aut euphorbium in intestinis effice-^{terii.}
 re videtur , pituitam vehementer movendo . Illud
 notandum est , elaterium (quæ istius medicamen-
 ti summa est commendatio) dejectiones movere ,
 authore Dioscoride , citra stomachi injuriam , e-
 xhiberi potest ad gr. x. ℥. Elater. gr. x. sal. gemm:
 ℥j. mir. cydon. q. s. f. bolus . In casu ancipiti &
 moribundo ex dysuria plurium dierum , aliis me-
 dicis dimissis , sic hominem restitui ; ℥. Succ. li-
 mon. recenter express. ℥vj. cochlear. borten. ℥iv. he-
 patie. plantag. syr. violar. ana ℥ij. m. hujus ℥iv. o-
 mni trihorio siccavit , postridie urinam copiose red-
 didit , & postea modicis hydragogis detumuit ven-
 ter & convaluit . Hydropsiceato aq. absynthii stil-
 lat. in quæ habarbarum maceratum est , est usus e-
 ximii ad confirmanda viscera . (Virtutes elaterii per
 totam exercitationem summopere extollit author ,
 & reverà laudem omnem exsuperat .) “ Hoc re-
 „ medium equidem successu vix credibili aliquo-
 „ ties exhibui . Anno proximè elapso , verno tem-
 „ pore , seni asthmaticæ , diuturnitate morbi con-
 „ tritæ , cui pedes crura & femora valde intume-
 „ bant , quod moribundis ferè semper evenire so-
 „ let , elaterii dosin unam & alteram atque ter-
 „ tiam , interpositis debitis intervallis , effectu pla-
 „ nè admirando propinavi . Prima vice humoris
 „ setosi per sedem evacuata sunt duodecim pondo ,
 „ secunda purgatione decem , & tertia demum

„ vice solummodo duo vel tria. Atque ita a tu-
 „ moribus Hydropicis omnino liberata est, & va-
 „ letudine mediocri vixit usque ad initium hye-
 „ mis, cum, ingravescente asthma, colica vel
 „ iliaca passione correpta est, ex qua, postquam
 „ ultra hominis ætatem vixisset, tandem naturæ
 „ satis fecit.

HYDROPS VESICALIS.

*Hydrops
 Vesicalis.*

Art. 815. Hydrops abdominis Vesicalis est *ascitis* quædam species, in qua quidem inclusa aqua tumorem abdominis facit, non verò in ejus cavo fluctuans, sed in vesiculis sive hydatidibus innumeris variz magnitudinis contenta; quæ hydatides nihil aliud sunt, quam portiones vasorum lymphaticorum alicujus visceris, in quibus motus lymphæ est impeditus; unde spatiola inter valvulas, liquore prædicto distenta, in figuras oblongo-sphæroidales efformantur, & totam cavitatem adimplent; ita ut post abdominis apertionem quandoque nihil aut parum aquæ extravasatæ effluerit. Hic morbus in brutis animantibus frequentius occurrit, præcipue in ovibus. In corporibus humanis exempla prostant apud *Sennertum*, *Tulpium*, *Bartolinum*, &c. Valde curiosum est illud in Collectaneis Gallicanis Acad. Scien. *Memoir.* p. 215. anno 1722.

Historia

Art. 816. Sexennium abhinc historiam mihi communicavit D. *Richardus Blinck pharmacopola Bidsfordensis* juvenis cujusdam nautici, qui ex febre ardente, in qua permagnam frigidæ copiam potasset, in ingentem abdominis intumescenciam incidebat. Applicata erant emplastra, & cataplasmata, ex quibus parum utilitatis: cæmum loco prominenti ad latus sinistrum umbilici caustico imposito apertum est foramen, ex quo *hydatides* quamplurimæ prodierunt, aliæ ova gallinæ æquant, nonnullæ grandiores, plurimæ minores, omnes

omnes

CAP. VIII. *Hydrops Peritonæi.* 297
mnes numero ad minimum octoginta. Homo
convaleuit, & adhuc vivit ab omni morbo immu-
nis.

In Transactionibus Philosophicis N. 370. extat Alia:
historia cujusdam hominis hujusmodi Hydrope la-
borantis, e cujus abdomine facta paracentesi exivit
ingens hydatidum copia, figura & magnitudine di-
versarum N. septem vel octo millium; una cum
his etiam evacuata erat magna quantitas materiæ
gelatinosæ, coloris grisei & lutei, albumine ovo-
rum aliquanto spissioris. Vid. locum.

HYDROPS PERITONÆI.

Art. 817. Hydrops Peritonæi est collectio aquæ
inter abdominis musculos & Peritonæum, maxi- Hydrops
Peritonæi.
mè inter hoc & tendines musculorum transversa-
lium, unde ex errore quidam authores, anatomi-
æ ignari, hunc morbum *Hydropem duplicaturæ
peritonæi* falsò nominarunt. Humor abdominis a-
liorsum æquabilis circa umbilicum minùs promi-
net, ob strictam ibidem tendinum muscularium
peritonæo adhæSIONem; atque hoc *propriam mor-
bi hujusce diagnosi* constituit. Aqua sive lymphæ
eò loci comprehensa, ibidemque moram ducens,
carnem muscularem corrumpit, & hinc ulcus for-
didissimum internum progressu temporis procrea-
tur. Hic Hydrops *tempestitiva paracentesi* forsan
sanari potest. D. *Cheselden* verò aliter sentire vi-
detur, Anat. p. 126.

Art. 818. Operatio Paracenteseos cum historia
ipsius medicinæ est cœtanea, ab *Hippocrate* me- Paracen-
tesis.
morata, & ab *Albucasi* æquè accuratè descripta
ac in nostra ætate. Experientia recentiori doce-
mur aquas una vice ad siccitatem tutò depromi
posse, quod praxi in nostris nosocomiis & Lute-
tiæ Parisiorum confirmatur.

Art. 819. Memorabilis est historia apud D. *Che-
selden*

selden Anat. p. 187. &c. cujusdam ascite laborantis, qui novies vigesiesque in uno anno paracentesin subivit, & deprompti fuerunt plusquam septuaginta aquarum congi. Tribus ultimis septimanis ante obitum *rheumatismo* laborabat, & frequentiori *narium hæmorrhagia*, quæ immediatæ rationes vel causæ mortis ejus videbantur; aperto cadavere jecur repertum est sanum.

Art. 820. Operatio paracenteseos non molienda est in corporibus valde macilentis, vel senio vel tabe confectis, nec [nisi in Hydropse subito exorto] in ægris, qui non respirandi difficultate laborant, & quorum partes nobiliores adhuc ferè sanæ & integræ sunt. De operatione, & ejusdem difficultatibus, vide *Barbette* & alios scriptores chirurgicos.

Farrago sententiarum.

Tussis in
Hydrope.

Art. 821. Qui ex morbofo jecore oritur hydrops, vehementissimam, sed inanem tussim conjunctam habet, quæ in aliis hydropum speciebus vix aut raro apparet. *Baglivius*.

Prognosis
sic. varia
ex Hipp

Art. 822. Hydrops (inquit *Hippocrat. in Coac.*) qui medicinæ concedit & revenit, desperatus est. Hydrops omnis [inquit idem] qui ex acutis morbis oritur, malus & lethalis. Hydrope detentus (addit) curari potest, si robustis sit visceribus, si bene concoquat & spiret, sine dolore sit, & extrema colliquefacta non habeat. Omnes ferè Hydropici circa plenilunium moriuntur. *Tycho Brahe*. " Diarrhœa in Hydrope, quæ non juvat, est, pessima; pravam enim in visceribus diathesin ostendit.

Cor mag-
num.

Art. 823. In Hydropicorum cadaveribus [inquit *Cheselden*] semper observavi cor solito majus, fibrasque ejusdem valde laxatas, & vasa sanguifera plurimum distenta, & præterea concretio-
nes po-

nes polypofas, interdum in ambobus auriculis & ventriculis, sed frequentius in dextris.

Art. 824. Stomacho & visceribus rite emundatis *infusum theæ viridis* in vino Rhenano evadit ^{Infusum them.} medicamentum laudabile, non modò diureticum & stomachicum, sed etiam sanguinem exagitans, & ejus motum adaugens. *Vvaineuvright.* Ex vegetabilium classe [inquit *Dolæus*] pro arcano in hoc morbo revelo succum *brionæ* sequenti modo collectum; luna crescente, tempore imprimis verno, radicem *brionæ* terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte abscissa paratum, & singulis manè invenies coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matutinis horis Hydropico a coch. j. ad ij. vel iij. quo solo vili medicamine plures, Deo adjuvante, curavi. Deploratissimum Hydropicum curatum vidit Dr. *Beefton* medicus *Bathoniensis* celebris, nuper defunctus, ut mihi retulit, per radicem *brionæ* circumforaneo quodam exhibente, cum ex aliis remediis quoruncunque a peritis medicis exhibitis nullum juvamen acceperat. Sequens infusum diureticum fuit præscriptum celeberrimi *Lovveri* & in sua praxi frequenter usurpatum: *℞. Rad. lapathi acut. ℥ij. taraxac. ℥j. flor. sambuc. mʒ. summit. abiet. sol. cochlear. becabung. nasturt. aquat. ana mʒ. raphan. sylv. ℥ij. sem. sinap. ℥j. infund. in vin. alb. ℔ij. clausè & calidè per hor. 4. coletur pro usu, dos. coch. iv. vel v. bis vel ter in die.*

Succus
rad. brion.
nim.

Art. 825. Inter remedia reliqua melioris notæ recensentur *pil. hydropicæ Bontii*: *℞. Aloes opt. ℥iij. gum. gut. gam. ℥iij. diagrid. ℥j. gum. ammoniac. ℥iij. tart. viiriolat. ℥ij. syr. ros. solut. q. s. f. massa pil. dos. a ℥ss. ad ℥j. Electuar. hydragogum Sylvii. ℞. Bacc. junip. in aq. coct. express. & ad pulpæ consistentiam redact. pulp. tamarind. ana ℥iv. rad. jalap. ℥iij. scammon. elect. ℥j. cinnam. acut. sem. fœnic. dulc. ana ℥ij. sacchar,*

Remedia
varia,

facchar. clarific. ℥x. m. f. electuarium; dosis in adultis a ℥iij. ad ℥℥. Potio hydragoga Listeri; ʒ. decoct. sennæ Gereon. ℥iij. syr. c. spin. cervin. ℥℥. succ. limon. ℥℥. elater. gr. iv. m. f. potio Tinctura allii vino absynth. extract. tinctura cochlear. compos. cataplasma Hydropicum pil. hydragoga, cerevisia Hydropic. cerevisia purgans hydrop. haustus hydragogus, lixivium de calce, vinum Hydropicum. Sapo Castiliensis, express. diuretic.

T Y M P A N I T E S.

Boerhaavii sententia.

**Tympani-
tes.**

Art. 826. Tympanites iisdem mediis, & eadem methodo, tollitur, ac *anasarca* & *ascites*, si ortum duxit a rarefacto vapore humoris extravasati, & putrefacti; tum enim, causa ablata, tollitur: Si verò ortum duxit ex aere per membranas intestinorum putrefactorum perforatas in cava delapso, retroire non potente, sed calore corporis rarefcente, tum cuncta citò putrescunt aere juvante, malumque ex posita causa est ferè semper insanabile: unde *hydrops siccus humido* longe magis immedicabilis habetur; *punctura* sæpe solatio, raro sanationi, sufficit; *fasciæ* post puncturam locum habent.

Vuillissii sententia.

**Quomodo
generatur.**

Art. 827. De hujus morbi *ætiologia* præ reliquis audiendus est *Vuillissius*. *Tympanites* est tumor ventris; sed quæ sit materies morbifica tumorem istum inducens, quomodo in ventre aut progignatur, aut aliunde illuc adveniat, planè nescitur. In *ascitem* degenerare solet. Non a flatibus

tibus intra vel extra intestinorum cavitates conclusis excitatur, verum exoritur (quantum conjectura assequi possumus) quatenus in imo ventre spiritus animales ad viscera membranacea spectantes, ab incongruo quodam in ἀναξίας adapti, fibras ubique nerveas tumultuariè irruunt inflantque, nec statim denuò ab iis recedunt: hinc peritonæum extumescit, intestina ampliata & distenta velut inflantur, mesenterium, aliaque viscera membranacea spiritu impetuose turgida, velut in molem attolluntur; porro dum hæc fiunt, ut vacuitates a viscerum concavorum extumescentiis factæ impleantur, humoris statim cujusvis intus contenti portio in vapores rarefacta, illicò in flatus spatia isthæc inania oberrantes cedit.

Art. 828. Spiritus animales potius quam flatus ejusmodi ventris intumescencias saltem breves & transitorias, quales in paroxysmis colicis & hysteriis contingunt, excitant: atque hinc evenit, quodd, qui affectibus *hypochondriacis*, *colicis* aliisque imi ventris *spasmodicis* diu obnoxii fuerunt, demum *tympanitici* fiant.

Quinam
huic morbo
sunt
obnoxii.

Art. 829. Hic affectus raro per se interficit, quin longo tempore protractus, quo demum certius jugulet, sibiimet *ascitem* lethi prænunciam adsciscit. A *catharticis*, præsertim fortioribus ferè semper exacerbatur hic morbus, saltem non alleviatur. *Enemata* crebrò injecta eximii sunt usus, & hoc præ cæteris; ℞. *Urin. sani* ℥j. *sal. prunel.* ℥j. *tereb. Venet. cum vitel. ovi solut.* ℥ij. *m. f. enema.* Applicetur *empl. de sapon.* toti abdomini. Ad sitim intolerabilem in hoc morbo; ℞. *Conserv. lulul. per cetaceum trajecl.* ℥ij. *pulp. tamarind.* ℥ij. *sal. prunel.* ℥j. *syr. e succ. lulul. q. s. f. Eclegma molle*, de quo sæpius lambat æger.

Curatio.

Art. 830. " Tympanites est flatuosa abdominis, moles, rugitu strepens, dumque percutitur, instar *tympani* resonans, Vix differt ab *ascite*; raro enim

Vix differt
ab
ascite.

enim

Remediū
empiricū .

„ rō enim flatus absque aqua reperiuntur , nisi
 „ in ipsis morbi primordiis . Experientia didici
 „ hoc malum tractari debuisse remediis *antihyste-*
 „ *ricis* , *antiscorbuticis* , & *corroborantibus* , prius-
 „ quam in ascitem demigraverit : Sequens est re-
 „ medium *empiricū* valde decantatum ; *℥. Succ.*
 „ *folior. porri* & *sambuci ana ꝑ. ꝥ.* analyticē mi-
 „ sceantur ; capiat æger coch. iij. vel iv. bis vel
 „ ter in die ; hoc valet aliquādo in extremis
 „ post alia omnia incassum tentata . *Antihysteri-*
 „ *ca* , *chalibeata* , *empl. de cicuta cum ammoni-*
 „ *co* , *sotus ad tympaniten* , &c. sunt valde pro-
 „ ficua .

M. L I T T R E.

Essentia
morbi-
dam de-
gitur.

Art. 831. Scriptoribus de Tympanite inter se
 minus convenit , quippe qui neque causam morbi
 neque sedem designarunt . Ex cadaverum Tympa-
 nite mortuorum sectionibus patet ventriculum &
 intestina , præ reliquis crassa , mirum in modum
 distendi , ac ingenti mole vix sanè credibili am-
 pliari . Frequenter [*souvent*] observavi *cacum* &
colon semur humanum crassitie æquantia , reliquo-
 rum viscerum in abdomine contentorum dimensio-
 nem ultra naturalem nusquam inveni . In recenti-
 bus Tympaniticis humiditatem tantūm aliqualem
 in abdominis cavo reperi , & in inveteratis non nisi
 duas vel tres libras aquæ ; quantitas adeo exigua
 neutiquam pro morbi causa haberi potest : ideoque
inflationi ventriculi & intestinorum monstrosa ista
 ventris moles soli debetur . Ventriculus & intesti-
 na quasi musculus cavatus spectari possunt , cui ær
 inclusus est antagonista . Parietes intestinorum &
 ær internus sunt tanquam duo *γλασρα* se mutuo in-
 desinenter impellentia . Quamdiu hæ duæ potesta-
 tes æquipollent , ventriculus & intestina alterna-
 tim se contrahunt & dilatant salva dimensione na-
 turali

turali, suoque officiis suis obeundis paria, manente scilicet æquilibrio: si autem laterum ventriculi & intestinorum systole vim elasticam aeris inclusi superat, fistula intestinalis supra modum coarctabitur: e contra si quando fibrarum intestinalium vires elasticæ quoque modo imminuantur, aer inclusus canalem plus justo dilatat, & quo debilior est intestinorum elasticitas, eo major evadit eorum capacitas, unde *Tympānites ortum ducit*; qui affectus ut plurimum est incurabilis ob amissam aut valde diminutam istorum viscerum elasticitatem; fibræ nimis laxatæ sese contrahere rursus nequeunt, aut saltem admodum debiliter: & proinde ventriculus & intestina non nisi imperfecta admodum officia sua peragunt, in quantum præcipua earundem energia & operatio a contractione, dilatatione, & motu peristaltico magnopere pendunt. *Memoir. de l' Acad. Vol. 17. p. 314.*

HYDROCEPHALUS.

Schenckii sententia.

Art. 832. Hydrocephalus est morbus adultis raro accidens, infantes vero sunt magis obnoxii, & frequenter fit a violenta obstetricatione. Est tumor capitis aquosus; colligitur autem humor vel inter cutem & cranium, aut inter cranium & cerebri membranas; *Actius* addit inter membranas & cerebrum; [*Boerhaave* addit inter cerebri pliegas, & in cavitatibus;] sed hæc posteriores species sunt incurabiles; externa & evidens causa est plaga aut contusio in puerperio. (Ex tumore intus sub cranio neminem convaluisse vidi; sed ab externo tumore facile sanescunt.) “Caput in
„ tantam molem turgescit, ut quandoque inte-
„ grum corpus præponderet. Insignis historia ha-
„ betur in *Transac. Philos. p. 407.* Infantis biennis
„ hoc

Hydroce-
phalus.

„ hoc malo mortui , e cujus capite sectione pa-
 „ tefacto exivere *aquarum decem pondus* : humor
 „ erat tenuis, pallidus, & insipidus, in intersti-
 „ tiis meningum & cerebri ventriculis recondi-
 „ tus; de reliquis circumstantiis vid. locum.

Methodus
 medendi.

Art. 833. Oppugnandus est hic affectus primo
resolventibus; sed si id fieri nequeat, facienda est
incisio vitato temporum musculo, & humor ex-
 primendus est, (*Ambr. Paræus*) *℥. Ol. cham. ℥iv.*
sulph. ℥j. m. f. s. a. ungt. in hoc affectu magnarum
 virum. “ Hydrocephalus secundum *Boerhaave* le-
 „ vi *inustione*, *trebratione*, *punctura*, prudenter,
 „ lentè, adhibitis, simulque *hydragogis* & *robo-*
 „ *rantibus* internis curatur: vel externis *discu-*
 „ *tientibus* dissipatur excepta ista specie incurabi-
 „ li, quæ in cerebri cavitatibus formatur.

Remedia
 varia.

Art. 834. “ Inter cætera ad hunc morbum op-
 „ pugnandum *psycrolousiam* emolumento fuisse
 „ animadverti. Inter evacuantia & corroboran-
 „ tia eadem sunt ac *in ascite*. Pro usu externo
 „ lixivium calcis vivæ egregium admodum est
 „ in discutiendo Hydrocephalo teste *Aquapenden-*
 „ *te*, & linimentum sequens a *Foresto* commen-
 „ datur; *℥. Ol. cham. ℥iv. flor. sulph. ℥j. digere f.*
 „ *a.* Hydrocephali curatio (inquit *Barbette*) o-
 „ mni tempore experientissimis medicis insignem
 „ creavit molestiam. Purgantia, sudorifera vel
 „ diuretica rarè aliquid conferunt: cauteria,
 „ vesicatoria, fonticuli, setacea, immò plerum.
 „ que ad incisionem vel ustionem impellimur,
 „ quæ tamen media quosdam in vita conserva-
 „ runt.

M. P E T I T.

Accurata
 morbi de-
 scriptio.

Art. 835. Hydrocephalus est tumor capitis aquo-
 sus adultis rarè accidens, infantes verò in pri-
 mis annis a nativitate, immò interdum ante na-
 tivita-

tivitatem occupat; & caput infantuli ex utero nondum educti tam grande existit, ut *puncturam vel sectionem capitis* facere ad partum facilitandum chirurgus incumbat. Aqua secundum auctores colligitur, vel externè inter cutem & cranium, vel internè 1. inter cranium & duram matrem: 2. inter duram & piam matrem, 3. in ventriculis ipsius cerebri; atque hanc ultimam speciem solam in praxi vel in cadaverum sectionibus unquam observare posui; credo itaque reliquas rarissimè occurrere. Hoc morbo affecti sunt languidi, tristes, & pallidi, oculi illorum luridi & prominentes pupillis dilatatis; ossa cranii tenuia & mollia evadunt, & figuras irregulares induunt, nasus depressus, frons valde elatus, capitis magnitudo planè monstruosa, & gravitatis non sustentandæ, non raro crepat & disrumpitur, & mors non multo post insequitur. In cadaverum sectionibus notavi duram meningem plus solito cranio adhærentem, crasin cranii valdè prolatam, & quasi ubique contractam, ossium margines membranis è longinquo connexos, cerebrum minimè corruptum, ventriculos cerebri adeo in immensum distentos, ut substantia ejus corticalis & medullaris extrorsum detrusa digiti vix duas lineas crassitie æquabat, & multis in locis a protrusione aquarum penitus divisa aquis usque ad meninges pertingentibus, vasa sanguifera prolongata & crassa, in pluribus *glandulam pituitariam schirrhosam*, quod inter causas hujus morbi locum habere videtur. Paracentesin quod attinet, tam diu procrastinari solet, ut vix ullum ista operatione servatum vidi; intra 4. vel 5. horas plerumque moriuntur, si una vice aquas ad siccitatem depromant; sin verò tardius progrediantur, non ultra quadraginta horas supervivere solent.

HYDROPS PECTORIS.

Sponii sententia.

Hydrops
pectoris.
signa dia-
gnostica.

Art. 836. Si Hydrops in pulmone accidat, juxta *Hippocratem*, febris & tussis vexant, æger confertim respirat, pedes intumescunt, ungues incurvantur, & velut empycus afficitur, sed remissius & diutius. Hæc signa diagnostica Hydropis pectoris apprimè sunt scitu necessaria; est enim morbus satis frequens, nec tamen satis cognitus; sed qui ista ad unguem tenebit, hunc morbum aliis faciliè distinguet. Plurima habet cum *empyemate* signa communia; ea tamen symptomata sunt remissiora, quia serum sive aqua minus impedi-
menti in pulmonum *bronchiis* & pectore afferunt quam pus ipsum; at diutius durat affectus, quia sero non ita corrumpitur aut opprimitur pulmo, ac purulenta ibidem collecta materia. *Sponii Aph.* p. 145. &c.

Etmulleri sententia.

Symptoma-
ta.

Art. 837. In Hydrope pectoris præter pectoris tumorem & sensum fluctuationis, adest tussis sicca, difficilis respiratio, orthopnoea, palpitatio cordis, febricula. Ex ruptis vasis lymphaticis oritur, & curatur ut aliæ Hydropis species. De *paracensesi* vid. locum, p. 766.

Vuillisii sententia.

Hic affe-
ctus in o-
vibus val-
de frequens.

Art. 838. In Hydrope Pectoris lymphæ in compagem pulmonarem stagnante sæpenumero accidit vesiculas hydatidas dictas, in extima hujus visceris superficie excitari, quæ postea disruptæ *ascitem in thorace* producant. Hujusmodi affectio
in ovi-

in ovibus, quando ob tempestatem humidiorē, & pascua aquosa ab Hydrope gregatim intereunt, passim cernitur. Morbus dignoscitur ex aquarum fluctuatione. Author historiam producit Hydropis Pectoris per *paracentesin* curati; & aliud affert exemplum cujusdam juvenis curati per *cathartica* & *diuretica*.

Art. 839. De Hydrope ovarii, Hydrope uterino, & uteri inflatu alibi in morbis mulierum dictum est.

ICTERUS.

Inter legendum & ex Observatione.

Art. 840. Signa hujus morbi & symptomata præcipua sunt lassitudines totius corporis, anxietas præcordiorum, difficilis respiratio, virium dejectiones, faciei pallor, pulsus debilis & lentus, urinæ tenues, aut crassæ, coloris flavi ad rubrum vergentis, croceo colore pannum immersum tingentes, interdum adsunt vomitus biliosus, dejectiones albæ, pruritus totius corporis, & ariditas & veluti exustione solis aspera cutis superficies, flavedo per universam cutem, maximè in oculorum albis, quo quidem colore interdum objecta omnia apparent tincta.

Icteri signa diagnostica.

Sydenhami sententia.

Art. 841. Icterus interdum est proles colicæ. In tali casu solo *rhaborbaro* purgandum est & morbus plerumque sponte sua sensim facessit; sin vero non nisi ægrè discedere videatur, convenit sequens apozema; *℞. Rad. rub. tinctorum curcum. ana* *℞ij. chelidon. maj. cum toto, summit. centaur. min. ana* *mj. coq. in p. a. aq. font. & vin. Rhenan. ad ℞ij. colatur. add. syr. e quinque rad. ℞ij. m. f. apo.*

Icterus ex colica.

℞ij. ℞ij. curatio.

zem. capiat ꝑꝑ. calidè manè & serò usque dum convaluerit.

Curatio
in genere.

Art. 842. At ubi icterus per se invadit, colica neutiquam prægressa, *cholagoga*, quæ per alvum bilem subducunt, ægro sunt exhibenda, & alia *antiictERICA* usurpanda. His denique morbum non subigentibus ad *aquas ferreas*, quales sunt *Tumbrigenſes*, adeundum, quæ ex ipso fonte sunt bibendæ.

Ettmulleri sententia :

Sympto-
mata.

Art. 843. Icterus est totius corporis *cachexia* flavedinem inducens, ut plurimum cum cardialgia, hypochondriorum dolore, præcipuè dextri, alvi segnitie, lassitudine, &c. Si flavedo ad viriditatem, vel ad cœrulitatem, vel ad obscurum livorem inclinet, Icterus niger vocari solet; febris interdum conjuncta est, interdum abest. Tristitia aliquando inducit Icterum. Icterus *flavus* diuturnior semper in *nigrum* degenerat, unde *essentialiter* non differunt. Anxietas in præcordiis, dolor præcordiorum compressivus, virium dejectiones, lipothymia, &c. ante eruptionem Icteri frequentissimè occurrunt. Urina ictericorum succussa spumam flavam ostendit, & linteum tingit colore croceo, sed non semper, sedimentum croceum dimittit; fæces alvinæ sunt plerumque albicantes, vel cineritii coloris, & hoc postremum ut plurimum est signum *calculi in vesica fellea*. Urina crassa turbida & nigerrima est signum solutionis morbi. Quo magis flavus existit Icterus, eo facilius est curatu, quo verò magis niger, eo difficilius. Cum *hydropse* conjunctus raro curatur. “ Si
„ sudor erumpat [inquit *Sylvius*] citior plerum-
„ que curatio expectanda erit, sin verò urinis plus
„ deponatur materiæ rubentis & paulo post sub-
„ sidentis, segenior erit expectanda.

Prognosis.

Art. 844.

Art. 844. Quoad curam vomitoria, *martialia*, Curatio
& hinc *amara*, totam absolvunt paginam. Præ-
missis universalibus usurpentur *stomachica*, *mar-*
tialia [*limaturæ crudæ* in Ictero nigro] *rhabar-*
barum, *lumbicalia*, *viperina*, *alcalina*, *volati-*
lia, *amara*, *aquæ acidulæ*, *gum. ammoniacum*.
Venesectio & *catharsis* vix locum habent. Specifi-
ca sunt (omnium optimum) *chelidonium majus*,
marrhubium, *flor. hyperici*, *crocus*, *genista*, *ab-*
synthium, *sem. cannabis in lacte coctum*, *rad. cur-*
cum, *rub. tinctor. urinæ potus*, *stercora* serè omnium
avium & *animalium*, *pediculi*, *lapis in folliculo*
fellis tauri. In genere moneo in curando Ictero
insistendum esse ad tempus medicamentis *antiicte-*
ricis, quia morbus est chronicus & contumax : &
quidem quandiu *urina* mingitur tenuis & splendi-
da, tamdiu illis insistendum, donec signa coctio-
nis apparent, usque dum *urina* sit crassa & turbi-
da, & cum sedimento repleta ; his tamen appa-
rentibus spes est salutis. Cura peracta, ad abigen-
dum cutis flavum colorem conveniunt *frictiones* &
balneatio.

Vuillisi sententia.

Art. 845. Curatio Icteri inchoanda est cum vo-
mitorio ; ʒj. *Fol. asari* N. 9. *incis.* & *contus. af-*
fund. vin. alb. ʒiij. exprimatur succus & detur cum
regim. Remedium vulgare & *empiricum* apud no-
strates est, ut ix *pediculi vivi* sumantur manè, per
5. vel 6. dies, quo remedio (cum alia minus ef-
ficerent) plures sanatos audiui. *Chalybeata* ut in
aliis *cachexiæ* affectibus, ita in hoc juvamen præ-
stant, atque hinc est quod *acidulæ* frequenter post
omnia profunt. “ Cum apozemate sequente [in-
,, quit *Dolæus*] semper initium curationis facere so-
,, leo ; ʒj. *Rad. tarax. chelidon. maj. ana* ʒj. *berb. ci-*
,, *chor. fragar. ana* mß. *marrhub. alb. mß. tartar. alb.*

Vomito-
rium & a-
lia seme-
dia.

310 *Icterus.* CAP. VIII.
 „ *sol. fenn. ana* ℥ij. infund. in vin. alb. & aq. font.
 „ *ana p. x. coq. ad* ℔ij. cola, &c.

Velſchii ſententia.

Et affe-
ctus in
prægnan-
tibus ſatis
frequens.

Art. 846. Mulieres ſæpe geſtationis tempore fiunt *Ictericæ*, præſertim in ultimis menſibus; an quoddam tunc temporis viſcoſior evadat, & ita in glandulis hepaticis non ſecernatur; an quoddam uterus tumens comprimendo inteſtina in cauſa eſt, quod ductus choledochus nimis compreſſus bilem in inteſtina non tranſmittat: notandum eſt, quoddam hic morbus in prægnantibus poſt partum ſtatim evaneſcat.

Sampſonii ſententia.

Sapo Ca-
ſtellienſis.

Art. 847. *Saponis Caſtellienſis* ℥ß. in hauſtul. vin. alb. ſolut. valet ad urinas provocandas in Ictero & Hydropo experimento domus *Bedfordienſis*, ubi pro magno ſecreto habetur. *Sylvius* hoc idem medicamentum laudat, ſed in lacte ſolutum ob ſalem fixum & oleoſamejus ſubſtantiam. Ego quoque in nonnullis *Ictericis* expertus ſum, in hiſeum fructu, in illis aliter. Ubi acidi humores vel in *Ictericis* vel in *Hydropicis* abundant, credo hoc medicamentum valere, quoniam ab acri ſale fixo temperantur, ſubiguntur, & per vias urinarias expelluntur: & e contra ubi acres humores dominio potiuntur, acre medicamentum nihil valet, metuo, ut noceat.

Farrago ſententiarum.

Dubitatio. *Art. 848.* Dubitatur, an Icterus ſemper oriatur ab obſtructione bilis; quoniam neque in ſanguine vel urina iſtericorum ulla eſt amarities: Icterus etiam generari poteſt ſine hepatis obſtructione, reſte

ste Sylvio, & obstructions in hepate non semper pariunt Icterus, *authore Estmullero*. Aliquando oritur ex animalium quorundam morbu. Ictericorum alvus & aperta & fæces flavo colore tinctæ (interdum) conspiciuntur. *D. Gailard. in Thesi apud Cantabrigienses*.

Art. 849. Si sit suspicio *hepatis scirrhi*, apprime conveniunt fots & empl. seq. ʒj. Fol. malv. alth. absynth. flor. melilot. chamæm. ana mj. sol. meliss. chamæpit. ana mß. sem. sænugr. ʒß. coq. ex aq. ʒvj. sub finem add. vin. alb. ʒij. &c. cum pannis laneis foveatur latus, deinde superimponatur empl. de cicuta cum ammoniac. vel de ranis cum mercurio. *Pincarnius* in MS. Si verò jecur durum sit, i. e. scirrhosum, res est desperata. *Hippocr. Aphor.* Si morbus diu duret, *hydropem* minatur.

In hepatis
scirrho.

Art. 850. Candidum ex avium fimo est eorum urina, ideo confert Ictero, qui morbus inflatio est: album in anserino stercore diligenter abrasum siccatumque privatim ad icterum facit. *Listerus*.

Avium
stercosa.

Art. 851. In Ictero pertinaci, medicamentis usitatis minus cedente, ex repetitis experimentis omnibus commendo *Æthiopem mineralem* tanquam remedium in hoc affectu potentissimum. Icterus in ultimo stadio sanguinem fundens per sedem, per urinam, per ipsam cutem, per sputum, vel stillidium ex naso, &c. vix unquam curatur.

Art. 852. Instar omnium religiosè consulendus est praclarissimus *Boerhaave*, qui de Ictero multiplici, & de hepate egregiè scripsit, p. 201.

Boerhaave.

Art. 853. Stercus ovinum in cerevisia infusum pro pauperibus est laudabile medicamentum. Decoctum sem. cannabin. sapo Venet. flores sal. armoniaci martiati, ens veneris, &c. sunt remedia optatissima; ut etiam sequentia, cerevisia ictERICA, decoct. berber. decoct. ictERIC. expressio milleped. ictERIC. haust. saponac. pil. ictERIC. [probatissimum medicamentum] vinum chalybeat.

Remedia
varia.

CAPUT IX.

Sive Fasciculus Morborum nonus.

RHEUMATISMUS

Sydenhami sententia.

Rheumatismi historia.

Art. 854. **N**ULLO non tempore, maximè autumno cum rigore & horrore & cæteris febris symptomatis adoritur, elapso uno vel altero die [citiusve] dolor adest atrox nunc in hoc nunc in illo artu, in carpis, humeris, & genibus præsertim; vicissim hos relinquens & illos occupans, frequentius eum rubore & tumore. Febris sensim evanescit, manente dolore: est morbus diuturnior, aliquando per menses aliquot durans, & annos non continuè, sed paroxysmis repetitis.

In *lumbagine Rheumatica* immanis dolor adest circa lumborum regionem fixus, *nephriticæ* mentiens, nisi quod æger non vomituriat. In Rheumatismo sanguis pleuriticorum similis est.

Lumbago Rheumatica.

Curatio:

Art. 855. *Sanguis mittendus* est ad tertiam quartamve vicem, habita ratione virium, alternis vel tertiis diebus. *Victus* admodum *tenuis* præbendus est; æger quotidie e lecto ad horas aliquot exurgat. Potus ordinarius sit cerevisia tenuis vel potius prisana ex *hordeo rad. liquirit. acetos.* &c. vel *emulsio*; parti dolenti applicari potest cataplasma ex *pane albo* in lacte coct. cum tantillo *croc.* diebus a venæsectione liberis injiciendum est *enema* ex lacte saccharato, vel ex decocto communi pro *clystere*, &c.

Alimentandi methodi.

Art. 856. Si imbecillitas ægri *phlebotomiæ* repetitionem non ferat, tum post secundam vel tertiam

tiam venæsectionem curatio alia methodo tentanda est, viz. capiat alternis diebus potionem *purgativam* communem, donec convalescerit, & iisdem noctibus *paregoricum* ex *syrupo de mecon.* his minùs ad votum conducentibus, *antiscorbuticis* morbi reliquiae fugandae sunt. In juvenibus, atque iis, qui temperatè vixerunt, vino non plùs æquo dediti, Rheumatismus *dieta simplici* admodum *refrigerante*, & *mediocriter nutriente*, æquè feliciter, ac repetitis *venæsectionibus* profligari potest, nempe *dieta* ex solo *sero lactis*.

Schmitzii sententia.

Art. 857. Per Rheumatismum vulgè intelliguntur dolores erratici externum corporis habitum occupantes; crebri quandoque ac leviusculi horrores adsunt; febris si quæ adsit, mitis, noctu plerumque recrudesceus. Sede, nocturna exacerbatione & contumacia *luis venereæ* cruciamina æmulatur. Lubricus est Rheumatismi in *arthritin* transitus, nam communis est utriusque morbi materia, hinc *arthritis universalis* nonnullis appellatur.

Rheumatismus est quodam modo arthritis universalis.

Art. 858. Commodius *sudoribus* solvitur. *Venæsectio* semper in hoc affectu curando est necessaria; est enim remedium *ῥυμιονικόν*, neque sine magna sanguinis jactura & virium ruina domari potest; post venæsectionem *emetica* fortiora sunt propinanda, hinc *purgantia* leniora, ut pulv. *Comitiss. Vuarvicens.* &c. Partes affectæ soventur tepidè cum *lapide medicamentofo* in aq. pluviali solut.

Indicationes curativæ.

Musgravii sententia.

Art. 859. In Rheumatismo ab aeri sale alcalico, lentor in quam ab acido, lentorem fieri longè probabilius, *Baynardi* experimento liquet, viz. ex Rheumatismorum

Lentor in sanguine a sale alcalico provenit.

eorum urina, salis alcalici ejus, quem habent sani bonaque utentes valetudine, pars quasi trigesima; nec quidem suprà, distillando elicitur: unde con-jicitur salem istum in sanguine retentum pituita (forasan adjuvante oleo, veluti in *sapa* composi-tione) irretiri involvique, & ad viscidum in Rheu-matismo faciendum, ad dolores & tumores infe-rendos opere quidem maximo contribuere. Serum quoque sanguinis Rheumatismo laborantium *sy-rupo violarum* admixtum viridescit, & cum mer-curio sublimato albißimum deponit concretum.

Vomito-
riorum
præstas-
tia.

Art. 860. De magna efficacia vomitorii aliquo-ties repetiti in hoc morbo debellando dignus est, ut consulatur auctor, p. 26. *Balsamo sulphuris terebenthinato* artus motu privati bis die superilli-nantur, vel etiam vernice terebinthinat. oleum te-rebinthina & camphora sunt remedia interne & externe proficua.

Etmulleri sententia.

Rheuma-
tismus
cum ar-
thritide
convenit:

Art. 861. Arthritis vaga scorbutica seu Rheu-matismus reverà cum *Arthritide vera* convenit, accidentibus saltem variat, terminatur nunc per sudorem aut urinam aut per eruptionem cutane-am instar purpuræ relicta cutis asperitate: adsunt interdum gravissimæ præcordiorum anxietates, fi-tis clangosa, sudores, dolores lancinantes & pun-gentes; imbecillitas ad motum, locorum dolenti-um tumores, &c. fundamentum hujus morbi est sal scorbuticum fibras vellicans.

Curatio.

Art. 862. Vomitus in principio convenit: *venæ-sectio* in principio & incremento: *volatilia* non debent exhiberi in principio, sed *alcalia* & *testa-cea*, ut etiam *antimonium diaphoretic.* *cinnabaris antimonii*, speciatim *arcanum duplicatum Mynsi-chii*; postmodum fiat accessus ad *volatilia* cum *antis scorbuticis* mixta; *lumbrici terrestres* sunt re-medium

medium sine pari in vino infusi, vel in sero lactis cocti, vel pulverisati; *millepedes* etiam commendantur. Declinante morbo conveniunt remedia ex pino vel abiete (*scobs abietis in sero lactis coct.*) *rob. bacc. junip. sambuc. decoct. e lignis. Decoct. strobilorum pini* curam ferè absolvit. Externè locis dolentibus applicandi sunt *lumbrici terrestres*, donec moriantur.

Farrago sententiarum.

Art. 863. Miasma rheumaticum quandoque cerebrum, pulmones & viscera obsidet cum dolore & ægitudine exercians. *Boerhaave.*

Partes nobiliores quandoque obsidet. Vires terebinthinae.

Art. 864. Dedi nonnunquam *terebinth. Venet.* ʒvj. vel ʒj. (& tantam ejus quantitatem veteres vulgo adhibebant) cum vitello ovi solut. in haustu quodam, non modo in *paralysi*, verum in *arthriticis* & *rheumaticis* affectibus cum optimo successu, sed in hoc postremo affectu *venesectione* debet anteire, &, si opus fuerit, repeti. *Harris.*

Art. 865. Infusio *stercoris equi masculi* in vino tenui vel liquore posset. facta, ad ʒiv. vel vj. bis in die propinata, est medicina in hoc affectu minimè contemnenda. *Vuillis.* " Et nunc quoniam, de medicamentis sordidis sermo agitur, prætereunda non est *urina vaccae* apud *Parisienses*, & etiam non ità pridem *Londinenses*, perquam celebrata, non modò in rheumatismo, sed etiam in arthritide, hydrope, asthmate, ictero, &c. curandis. *Memoir. de l'Acad. Vol. XI. p. 41.*

Stercoris equi.

Art. 866. Lini *sylvestris* cathartici herba integra cum caulibus & capitulis vino albo leni calore infusa satis validè purgat serosos humores, indeque in *Rheumatismo* valde prodest; sed non nisi robustis propinanda est quorum plurimos, ruri degentes, solo usu istius remedii curatos vidi. Non novi præstantius remedium quam *rhabarbarum*.

Linum sylvestre.

Rhabarbarum.

rum

Lac Asini-
num.

rum diu continuatum ad hunc morbum contumacem oppugnandum. Et si malum sit habituale, ejusdem *masticatio* non modo morbum tollit, sed etiam *recidivationem* præcavet. In corporibus languidis & emaciatis, hujus morbi diuturnitate, nec non medicamentorum farragine, fractis & detritis, *lac asinum cum pulveribus testaceis*, saltem *diata lactea* plerumque felici adjumento esse potest.

Infus.
them la-
ctea.

Art. 867. Ad rheumaticos lumborum dolores potum *lactis* cocti cum aqua decoctionis *theæ* & manè sumptum ad ℥j. circiter, felicissimè sum expertus. *Baglivius*.

Remedia
varia.

Art. 868. Remedia *antiarthritica* & *antiscorbutica* ferè omnia hic conferunt, præcipuè declinante morbo & in intervallis. *Pil. volatil. epithema saponaceum, unguent. salino-volatile, &c.*

SCORBUTUS.

Barbetti & Deckerzii sententia.

Scorbutus
qualis
morbus.

Art. 869. Scorbutus est aliqualis *cachexia* species ab humore melancholico peculiariter corrupto ortus; in *calidum* & *frigidum* plerumque distinguitur; sed reverà omnis provenit ab unica causa, nempe *lymphæ* vel *pituitæ* crassa; unde tot symptomata pro temperamentorum & locorum diversitate, ex variis obstructionibus & humorum stagnationibus: Quadraginta novem diversa enumerat *Eugalenus* in suo tractatu de *scorbuto*; sed illa omnia nunquam concurrunt in uno eodemque corpore. Conqueruntur de dolore interdum punctorio, plerumque gravativo capitis, de cordis palpitatione, angustia, inflatione ventriculi, tensione ventris; tussunt, putant se interdum suffocari, difficulter respirant, vomunt, febriçant; appe-

Sympto-
mata va-
ria.

appetitus prostermitur; singultu, ructibus, flatibus, convulsionibus vexantur, tremunt, lassi sunt artus, maculis rubris vel purpureis aspersi, (quæ tamen non sunt multi faciendæ, nisi degeneraverint in ulcera, vel elevatæ sint) adest plerumque oris pruritus, gingivarum erosio, cum sanguinis effusione, dentium vacillatione ac nigredine, halitus gravis, immò cum teterrimo aliquando odore; salivatio adest multa, urina cruda & tenuis, jam vero crassa & rubra, immò ferè nigra; pulsus semper inæqualis, ac ut plurimùm debilis; dolores vagi, imprimis crurum, præcipuè noctu ingravescentes; ulcera maligna, tumores varii generis plerumque œdematosi, sudores copiosi, ipsa atrophia, viriumque defectus, earus, & sopor profundus.

Art. 870. His regionibus aded familiaris est ut nullus ferè reperiatur morbus, cui non aliquid scorbuti sublit; vere & autumnomaximè infestat, in adultis & senibus gravior est; inveteratus & hæreditarius difficillimè curatur; solvitur aliquando per alvum, per hæmorrhoides, vel per urinam; aliquando in alios morbos degenerat, scilicet, *hydropem*, *atrophiam*, *apoplexiam*, *epilepsiam*, *stuporem*, aut *convulsionem*; interdum Scorbutici subitò moriuntur; dysenteria rarissimè laborant; plerumque *diarrhœa* vel *lienteria*, quæ difficulter curantur, longo temporis tractu ægros necant *hydropicos* vel *tabidos*; respiratio difficilis non aded periculosum est malum quàm vulgò putatur. “ Scorbutus fixam habens sedem (inquit *Vvaldschmidius*) rare curatur, nisi quandoque pal-

Est mor-
bus fre-
quencissi-
mus &
diurnus,
&
difficilis
curationis;

liativè: impossibile enim est sanguinem totaliter corruptum ad statum naturalem reducere. “ *Dieta* in hoc malo est optima medicina, de qua videatur *Sennertus* in praxi.

Art. 871. Exactissima *dieta* medicamentis præstat, sine qua Scorbutus sensim fit incurabilis;

Curatio.

venæ-

venafectio non prodest; *purgantia* fortiora nocent; sufficiunt suo tempore leniora; præparandi sunt humores *incidentibus*, inter quæ *salia volatilia* quæcunque *primarium* obtinent locum. *Antiscorbutica simplicia primaria* sunt, *radix raphan. sylv. oxylapath. petasid. scorzon. taraxaci, zedoar. angel. polypod. helenii, lignum guaiac. sassafr. sem. sinap. fol. cochlear. becabung. nasturt. aquat. trifol. paludof. acetos. persicar. mala aurant. acidor. pom. citri, bacc. junip. sem. dauci, gum. ammoniac. lacc. crem. tartar. vitriolat. chalybs, &c.* Saccharum & saccharata omnia *Scorbuticis* nocent. "Omnem Scorbutum (inquit Do-

Vires
mercurii
gulis.

„ *laus*) feliciter intra xij. dies, diis faventibus, tollam per *mercur. dulc.* & revera dulcificatur „ singulari & peculiari motu sublimatum, ut dum „ taxat sudorem moveat, & nullam efficiat salivationem, „ cujus ope omnes scorbuti humores „ intra prædictum tempus consumuntur & educuntur, „ sed durante hac cura nihil bibendum, „ nisi decoctum appropriatum, & ab acidis & „ carne suilla abstinendum.

Art. 872. Singulorum symptomatum curam peculiarem videre licet apud *Eugalenum*, cujus hæc summa est; quæd omnibus *specificis* parti affectæ dicatis admiscenda sunt *antiscorbutica*. In difficili *respiratione* *sp. salis armoniac. cum tinctura croci & aq. cochlear.* specificè prodest. (875.)

Gingivarum
laxitas.

In gingivarum laxitate & putrefactione *tinctura gum. lacc. sp. cochlear. &c.* pro lotionem, item *mistura* sequens. ℞. *Pulv. rad. ireos florent. gum. lacc. ana ʒi. alum. ust. ʒi. mel. ros. q. s. sp. salis parum* pro grato acore, *m.* (883. 892.)

Dolores
vagi.

In doloribus vagis crurum, &c. inter externa topica *epithema saponaceum Fulleri* maximè commendatur. (884. 994.)

Termina
ventris.

In torminibus ventris convenit *sp. sal. armoniac. cortic. aurant. infus. cumque sp. junip. vel sem. anisi*

anisi mixtus : externè lotus , & linimentum seq.
24. Ol. lumbricor. terrestr. chamæm. sp. cochlear. anq
p. a. (877.)

In convulsione & contractione internè convenit **Convulsio**
sp. sal. armoniac. cortic. aurant salu. & roremari-
no effusus , item ol. hyperic. & cochlear. pro inun-
ctione tendinum. (878. 901.)

In erysipelate (1167.) præter externa exhibe-
 antur sudorifera , ut *rob. sambuci , sp. ejusdem ,* **Erysipe-**
bezoar. mineral. sp. sal. armoniac. cochlear. &c. **las.**

In atrophia non datur præstantius remedium **Atrophia**
 quàm *lac caprillum spiritu aliquo antiscorbutico*
piùs ipsi instillato. (879.)

Charletoni sententia .

Art. 873. Scorbutus in his regionibus septen-
 trionalibus est morbus *endemicus* , & maximè fre- **Scorbuti**
 quens in locis Boreæ patentibus , uliginosis , pa- **causæ in-**
 lustribus & maritimis ; hæc faciunt quoque insa- **signiores**
 lubres ædium calæc recens obductarum expiratione-
 nes ; & in carcerum , fornicum speluncarumque
 angustis conclusus , nec solutus syderum luce aer .
 Scorbuto præ aliis maximè tentantur ii , quibus
 alimenta sale ac fumo indurata , crassa , viscida ,
 terrestria , nautica , atque id genus alia , quæ nec
 facile digeri , nec ad statum summæ fluxilitatis ei-
 us perducere norunt , diutino in usu sunt ; item qui-
 bus vina oligophora , & spiritus ardentes sunt in
 delitiis , utpote ex quibus confertim seaturientes
 particule salinæ & sulphureæ sanguinem succum-
 que nutrimentum foeda ranciditate inficiunt ; adice
 & illos , qui oxigari , omphacii , acetariorum , a-
 ceti , &c. ejusdem commatis condimentorum lan-
 guenti per luxum stomacho malè consulunt ; aci-
 da quippe omnia strenuè faciunt ad productionem
melancholia hypochondriacæ , quæ scorbuto aded af-
 finis est , ut non nisi gradibus quibusdam ab eo
 differ-

differre videatur; sub eodem censu cadunt insalubres potus, aquæ nimirum corruptæ, crassæ, fæculentæ, graves, subsalsæ, cerevisiæ, & vina vitiosa. Qui delicatè vivunt magis Scorbuto obnoxii sunt, quàm qui laboriosè, scæminæ viris, urbani agricolis, studiosi obtusis, &c. Plures sibi Scorbutum *contagio*, quàm ex aliis ullis causis forinsecus advenientibus contrahunt. "Causa Scorbuti (inquit *Dolæus*) est sal fixum acre in massâ sanguinea, in qua latent multæ particule vel acidæ vel muriaticæ; *acidæ* quando sanguis crassior & nigricantior apparet, *muriaticæ* verò ubi consistentia amissa tota diffluit; certum est utunque Scorbutum non semper ab una aliqua singulari & simplici causa proxima ortum suum habere ac dependere, sed sæpè a multiplici: tot enim Scorbuti species seu differentiæ dici possunt, quot sunt vitiosæ sanguinis tincturæ & salibus diversis (quæ propemodum infinitæ sunt) & horum diversimoda combinatione ortæ.

Causa
Scorbuti
secundum
Dolæum.

Remedia
ad Scorbutum
acidum.

Art. 874. Acido scorbuto affectis nullum (spondemus) siue præsentius, siue certius adhibueris remedium, quàm *lactis emulsionum ex amygd. dulc. decocti china, juseulorum consummatorum & cæter. antiacidorum & analepticorum* ulum ad plures septimanas productum.

Dyspnœa.

Art. 875. Difficilis respiratio oritur plerumque vel a sanguine grumescente vel ab irritatione spasmodica a salium stimulis; in priore casu conveniunt *incidentia, spiritus & salia volatilia, viperina, fimus equinus, &c.* aliquando *venæsectio* est necessaria; in posteriori casu *antispasmodica, spiritus castorei, lavendulæ, interdum opiata.* (872. 890.)

Diarrhœa.

Art. 876. In diarrhœa Scorbutica pluribus indicationibus satisfacit rhabarbarum modicè tostum, quo præmissio, cæteris omnibus meritò præfertur *crocus martis astringens cum conserva ros. rub.* (882.)

Art. 877.

Art. 877. In torminibus ventris *lac asininum*, *caprillum*, aut *serum lactis vaccini*: adhuc a coagulo tepidum, sunt remedia proficua: his enim mitigata post tormina primarumque viarum purgationem propinatis, non alvina tantum regio, sed totum etiam corpus perfectum *neoterisum* consequetur; sed omnium instar sunt *aquæ minerales catharticae*, ut *Ebshamienses*, harum virtus est planè admirabilis [nec minores sunt vires *aquarum Bathoniensium*.] [872.]

Tormina
ventris.

Art. 878. In paralyti, stupore, tremore, &c. conveniunt remedia *invigorandis corroborandisque cerebro & nervis* appropriata cum *antiscorbuticis generosioribus* conjuncta, item *Balneatio in thermis sulphureis* [& earundem *aquarum potatio*.] [879.]

Paralyti,
stupor.

Art. 879. Atrophia Scorbutica partium nutriendarum crimine contingit. Inter *deobstruentia* haud scio an quicquam utilius datum sit *acidulis*, quæ facile in adyta mesenterii & glandularum sese penetrantes vias chylicas omni ab infarctu liberant, nec tamen ullum interim relinquunt sive caloris sive acrimoniæ vestigium; locum etiam habent *lac asininum*, *caprillum*, *juscula instaurantia ex limacum, cancerorum astacorumve fluviatilium carnibus*, &c. [872. 901.]

Atrophia.

In atrophia scorbutica interdum contingunt dejectiones unguinosæ, quasi adipe vel oleo persusæ, nimirum solidarum partium colliquationes sunt: ægroti *hecticorum* more sunt tractandi, advocatis simul in subsidium *antiscorbuticis temperatioribus*.

Dejectiones
unguinæ
nosæ.

Vuillisi sententia.

Art. 880. Scorbutus non est affectio simplex, sed potius morborum *legio*; secundum vulgares appellationes dicitur *biliosus* sive *calidior exanthematis*.

Scorbutus
est morbo-
rum legio.

matius aliisque symptomatis apertioribus se prodens, vel *melancholicus*, cujus virus quasi sub cineribus latet. Dolor ventris Scorbutico aded familiaris est, ut juxta *idioma Germanicum Scheurbuyck* exinde nomen acceperit; hoc symptoma nonnullos, in mitiori licet gradu ferè continuè affligit; in quibusdam verò dolores valde acuti sunt, & tanquam affectiones *colicae* frequenter eveniunt; paroxysmo autem diutius persistente cruciatus sæpenumero in lumbos & dorsum propagantur, cujusmodi affectioni non rarè *paralysis* succedit; ratio est, quoniam nervi lumbares & mesenterici intimè communicant, ac pluribus in locis inosculantur. Dolores etiam alibi frequenter sentiuntur, ut in capite, pectore, cruribus &c. Novi plures Scorbuticos dolore molestissimo subter *sternum* excitato perquam diu vexatos, ut in quibusdam nihil minus quàm *abscessum* in mediastino latentem suspicarer. Cephalalgia sunt frequentissimæ & intolerabiles, & tibiarum dolores atrocissimi.

Cathartica & digestiva.

Art. 881. Si ægrotantis constitutio sit calidior, *aloetica & diagridiata* vitentur, & temperatiora ex *senna, rhabarb. &c.* exhibeantur pro *catharsi*. Inter medicamenta *digestiva* meritò recensentur *crem. tartari, tartar. vitriolat. tinct. salis tartar. elix. propriet. mixtura simplex, &c.* Tincturæ cum menstruo sequenti melius ac facilius conficiuntur, quàm vulgari modo: *℥. sp. vitriol. rectific. 3vj. sp. vin. alcalisat. 3xvj. m. & distilla in retorta vitrea cum ternis cohibitiis.*

Diarrhoea.

Art. 882. Præter scorbuti curam radicalem medicus symptomatis gravioribus sublevandis subinde operam navare debet. In Diarrhoea inveterata methodo sequenti sæpe bono cum successu usus sum; imprimis purgatio cum *infuso rhabarbari, aromaticis astringentibus adjectis*, instituat, & aliquoties iterata intervallo trium & quatuor dierum: cæteris diebus sumatur dosis elect. seq.

bis

CAP. IX.

Scorbutus.

323

bis in die: ʒj. *Conserv. absynth. vulgar.* ʒij.
spec. diarrhod. abbat. ʒij. *santal. alb. rub. ana* ʒj.
croc. mart. opt. ʒβ. *syr. chalyb. q. s. m. s. elect.*
 (876.)

Art. 883. Quoad oris vitia, quando caro gingivarum intumescit & fungosa evadit, valet gargarisma scorbuticum nostrum: quando gingivæ putrescunt & corrumpuntur, medicamenta fortiora adhibeantur, imprimis infusio lapidis medicamentosi, & astringentia in dentium vacillatione. (872. 892.)

Art. 884. In artuum doloribus sudorifera cum Artuum dolores. julap. ex aq. cochlear. & sp. lumbricor. & diuretica, item lumbrici terrestres quocunque modo usurpati frequenter juvamen præstant, aliquando tamen phlebotomia convenit. " Infusum stercoris e-
 „ qui masculi, decoct. e lignis, gum. guaiac. &c.
 „ hic locum habent. " (872. 894.)

Art. 885. Crepitus ossium medelam vix admit- Crepitus ossium. tit. " Nec mirandum; nam ex cadaverum sectionibus patet epiphyses ab ossium extremitatibus sejungi & penitus separari; unde sonum crepitantem inter movendum edunt. *Memoir. de l'Acad.* Vol. III. p. 238.

Pitcairni sententia.

Art. 886. Scorbutus est congeries plurium morborum natura diversorum. Ut febris est vitium sanguinis, sive omnium excernendorum, intra arterias dum fluunt, ita Scorbutus est vitium omnium aut multorum simul excretorum, dum per excretoria fluunt sua: vel est defectus aut augmentum in excretoriis canalibus. Pulsus in omnibus Scorbuticis est tardus (inter signa pathognomonica) ideoque generaliter *nassturgia* & *antiscorbutica* dicta pro sunt; quia talia remedia pulsui frequentiam conciliant.

Cutatio.

Art. 887. Scorbuti cura optimè eruitur resolvendo ipsum in symptomata, quibus constat, quorum remedia sunt nota.

Maculæ.

Art. 888. Pro maculis in Scorbuto exhibe *antischlerica*; nam maculæ istæ sunt lividæ & ferè nigrae, ut in ictero nigro. [893.]

Estmulleri sententia.

Signa
Scorbuti
primaria.

Art. 889. Præ aliis *Belgæ & Angli* Scorbuto sunt obnoxii, urina plerumque est nimis flammea, vel cum arenulis illis rufis imprægnata, in summitate vari-colorata instar caudæ pavonis; jejuno stomacho frequens est pyalismus. Sequentia ceu signa primaria Scorbuti recenset *Lindanus*, colorem purpureum semilunarem sub concavo oculorum apparentem, cruentationem gingivarum, fœtorem oris, maculas in femoribus & tibiis, vacillationem genuum, phlogosin & exæstuationem per totum corpus.

Respiratio
difficilis.

Art. 890. Maximè observatu dignum est prognosticon *Sennerti* de Scorbuto: Respirationis [inquit] difficultas & pectoris angustia periculosum est malum, ob quam si medicus & adstantes suum officium non faciant, sæpè ægri *syncope* præter expectationem intereunt; sin verò fortior natura morbum diutius tolerare possit, plerumque in *hydropem* incidunt, præcipuè ii, qui purgantibus fortioribus subinde uti solent. Scorbutus calidus difficilioris est curationis quàm frigidus; imprimis Scorbutus cum diarrhœa est periculosissimus, inquit *Eugalenus*. [872. 875.]

Curatio.

Art. 891. Basis curandi mali hypochondriaci & Scorbuti est *vomitus* in majori dosi; *purgantia* fortiora nocent; *laxantia* conveniunt; alvus enim semper servanda est aperta: de usu *martialium* notabilis est cautela *Tachenii*; in iis, quibus viscera tumida & infarcta jam ad schirrhosam naturam dege-

degenerant, minùs proficua. *Acetum* est nocivum, non tamen *succi acidi* vegetabilium & fructuum. *Lac* & omnia *lacticia* in Scorbuto, præmissis universalibus, quamdiu stomachus adhuc digerendo aliquid valet, sunt optima. *Mercurialia* sunt vitanda ob metum salivationis, *antimonialia* potius sunt eligenda. Ad curam conducunt *martialia* omnia, præmissis *digestivis* & *vomitoriis*, ut *sal digestivum hypochondriacum* [i. e. caput mortuum sp. *salis armoniac.* per solutionem, chrysalisationem, &c. factum] *tartarus vitriolatus*, *sal absynthii* [pulv. *hyster. Batean.*] *antihæctic.* *Poterii*, *bezoar. min.* *elixir. proprietat.* &c. Præmissis ita *digestivis*, propinandum est *vomitivum*, inter quæ eminent *antimonialia*, *tart. emetic.* dos. a gr. iv. ad vj. & postea per alvum *laxantia*, inter quæ *gum. ammoniacum*, *extract. hellebor. nigr.* *rhabarbarum*, *mercur. dulcis* [sed parcè.] Demum accessus fiat ad *martialia* & *acidulas naturales*, *amara*, & *stomachica*, arcanum duplicatum *Mynsicht.* *Antiscorbutica* *specificæ* sunt, *cochlearia*, *nasurt. flammul.* *Jovis, trifolium palustre, radix raphani, oxylapath. bardan. ari.* *sem. sinap. abies, junip. chin. sarsaparilla, sassafr. cort. Vvinteran. citri, aurant. sp. cochlear. rob. sambuci, juniperi, sp. sal. armoniac. & sal. volat. ejusdem.*

Art. 892. In gingivarum pathematis succus *salviae*, *cochleariae*, *rorismarini*, *gum. lacc. myrrh. alum.* utramque faciunt paginam, cui addi potest *cremor aque calcis* supernatans. [872. 883.]

Art. 893. *Maculæ cutaneæ* sunt semper bonum signum malæ causæ foras erumpentis; internè conveniunt *diaphoretica*, *antihæctic.* *Poterii*, *cinnab. antimon. tinct. coral.* &c. item *decoctum summit. pini* expectando sudorem.

Art. 894. Ad dolores crurum internè *sudorifera decoct. e lignis*, &c. Externè *sp. junip. camphorat.* item *sal armoniac. in sp. lumbricorum solut.*

lus. *Balneum quoque ex formicis earumque cubile est egregium.* (872. 884.)

Colica
scorbutica

Art. 895. "Est & colica quædam Scorbutica", (inquit *Vvaldschmidius*) ubi ægri queruntur
 „ de intenso dolore circa lumbos, & non in in-
 „ testinis, sed in musculis abdominis; ibi mesen-
 „ terium afficitur, & causa morbifica hæret in
 „ plexibus nervorum succo nutritio depravato,
 „ sæpè terminatur in paralyfin, & cessante para-
 „ lyfi redit dolor consuetus. Conveniunt *antiscor-*
 „ *butica & nervina, diuretica, sudorifica, &c.*"

Colica &
nephritis.

Ad colicam & nephritin norham ol. amygd. dulc.
 in jusclo gallinaceo, item *sperma ceti, & opiata*
 cum *catharticis, clysmata terebinth. stomachica &*
carminativa. (906.) De arthritide vaga Scorbuti-
 ca vide infra.

Capitis
dolor.

Art. 900. Ad cephalalgiam *sal volatile succini,*
cinnab. antimonii, & usus lactis.

Paralysis,
&c.

Art. 901. Paralysis Scorbutica, ut & convulsio-
 nes & contracturæ curantur *vomitariis, antipara-*
lyticis, & antispasmodicis cum *antiscorbuticis* per-
 missis. (872. 878.)

Febris
scorbutica

Art. 902. Febris Scorbuticæ signa sunt omnia
 ea quæ per se Scorbutum significant; palmarium
 interim notetur signum, quodd in febre hac adsint
 notabilia circa appetitum vitia, v. g. adest nimis-
 us, ut plurimum autem cum vomitu, aut deprava-
 tus, ut ad omnis generis falsa appetitus feratur,
 obstructions alvi contumaces, &c.

Curatio.

Art. 903. Febres hæ curantur, ut aliæ, adhibi-
 tis etiam *antiscorbuticis, arcanum duplicatum* est
 optimum remedium, & *sp. sal. armoniac.*

Farrago sententiarum.

Sydenha-
mi senen-
sia de scor-
buto.

Art. 904. Scorbutus non ita frequens est mor-
 bus, ac vulgò putatur; nam multi ex iis affecti-
 bus, qui Scorbutici audiunt, sunt vel effecta mor-
 borum

horum fientium, vel reliquæ nondum perfecte devictorum, quod facile probatur exemplo *arthritidis*, *podagræ*, atque *hydropis*: rebus ita se habentibus, methodus medendi non adulterinis illis symptomatis, sed ipsi morbo, qualiscumque is demum fuerit, seu perfecte formato, jamque actu existenti accommodanda est. *Sydenhami* videatur locus m. 307.

Art. 905. Succus *limonum aurantiumve* sunt *antiscorbutica* nunquam satis laudanda. "Peritissimi, inquit *Piso*, nonnulli *Indiæ* medicalium, plus præsidii in *limonibus* ponunt, quam in *lapid. bezoart.* aut *theriaca* contra malignos morbos, & pestilenciales febres atque ipsa venena: Ego autem sine jactantia affirmo, me ex nullo alio aliquo remedio simplici tot felices effectus, in tota praxi mea observasse, quam ex *limonibus*. *Lister*.

Vires limonum
& aurantium

Art. 906. Sabulum rutilum tartareum in urinis Scorbuticorum excerni solitum nephritidem spuriam sæpius inducit, quatenus angulis acutis ejusdem atomi gaudent (quod patet ex adhæensione ejus tam firmæ matulæ lateribus, ut non nisi vi inde ablui possit) quibus partes nervosas vellicant, & tormenta ipsis nephriticis graviora excitant, unde quoque sæpius in stranguriam inducunt, in quo casu omnia *diuretica* calidiora malum exasperant, *sp. salis dulcis* tamen hic multum præstat. *Ephem. German.* Anno 30. obs. 44. (895.)

Stranguria.

Art. 907. Usus remedium sequentium peritus non ignorat. *Æthiops mineral.* aqua *limacum* Scorbut. aq. omnium florum, aq. *raphan. comp.* aq. *scelotyrbica*, *cerevisia* Scorbutica, *cerevisia* Scorbutica attemperans, *epithema de calce*, expressio Scorbutica calida, expressio Scorbutica temperata, *fotus podagricus*, *fotus spirituosus*, *galbanetum Sennerii*, *gargarisma contra fætores*, *gargarif. myrrhyssatum* 1. 2. *Gargarisma prunellorum*, *mistura*

Remedia varia.

cephractica, pil. cathartic. Scorbutic. serum sinapium, succi antiscorbutici 1. 2, tinctura cantharid. 1. 2, tinctur. gum. lacce, tinctura antimonii, tinct. virginiana, pulv. ari comp. vinum viperinum, vitriol. Martis.

A R T H R I T I S.

Sydenhami sententia.

Podagm
hîstoria
accurata.

Art. 908. Podagra, exeunte *Januario* aut incipiente *Februario*, derepentè & nulla ferè præsentatione antecedente ingruit, nisi quodd ventriculi cruditate, aut apestia ad septimanas aliquot æger laboraverit; corporis interim intumescencia quasi ventosa & gravitate; quæ indies augetur donec tandem detonet paroxysmus; quem paucis diebus præit torpor & quasi flatuum descensus per femorum carnes cum affectione *παραμυηδὴ*, tum etiam pridie paroxysmi appetitus voracior, non tamen naturalis. Sanus lecto somnoque committitur, hora verd secunda post mediam noctem excitatur a dolore *pollicem pedis* ut plurimum occupante, quandoque verd *calcaneum*, *suram* aut *talum*: hic dolor eum refert, qui ossium dictorum dislocationem comitatur, cum sensu quasi aquæ tantum non frigidaæ partis affectæ membranis affusa. Mox sequitur rigor cum horrore & febricitatione aliquali. Dolor autem hic primo remissior gradatim intenditur [pari passu rigor & horror recedunt] idque in singulis horis donec tandem sub noctem ad apicem pervenerit, se ad varietatem ossiculorum *tarfi* & *metatarfi*, quorum ligamenta obsidet, perbellè accommodans; nunc tensionem violentam, vel ligamentorum istorum dilacerationem, nunc morsum canis rodentis, quandoque pressuram & coarctationem exprimens: adhæc, ita vivum exquisitumque habet sensum pars affe-

affecta, ut nec linteorum superineumbentium pondus, nec cubiculi a fortiori ambulatione concussionem ferre valeat; hinc mille conamina, situs tum ipsius corporis, tum membri affecti mutatione assidua, doloris sedationem incassum exambit; quæ tamen non contingit ante horam secundam tertiamve matutinam (decurso scilicet *nyctihemeri* spatio a primo appulsu paroxysmi); quo tempore æger post materiæ peccantis modicam digestionem & difflationem aliqualem, subitò a dolore respirat. Jam leni madore perfusus somno concedit, a quo evigilans, dolore multum immينو, partem affectam tumore recenter occupatam cernit. Intra paucos dies alter pes eodem dolore torquetur, easdemque excitat tragœdias; nonnunquam etiam ambos pedes in initio occupat; postquam utrumque pedem exercuerit, qui sequuntur paroxysmi abnormes sunt; tum quoad tempus invasionis, tum etiam quoad durationem, hoc tamen ubique servant, quod dolor noctu recrudescat, manè verò remittatur; atque ex serie horum paroxysmulorum constat paroxysmus, qui dicitur podagræ, diuturnior breviorve pro ægri ætate, &c. quod in vegetioribus, & iis, quos podagra rariùs invisit, diebus sæpè quatuordecim fit; in senioribus, atque iis, quos sæpius afflixit, duobus mensibus; iis verò qui aliquot annis podagrici fuerunt, non priùs valedieit, quàm ætas adultior eam fugaverit.

Ari. 909. Ad quatuordecim primos dies urina coloratior est, quæ post separationem sedimentum rubrum, & quasi arenulis refertum deponit; nec æger ut plurimum nisi tertiam potulentorum quæ assumpsit partem per vesicam reddit, alvus item ad dictos ferè primos dies constipata est. Appetitus prostratio, rigor totius corporis sub vespèram, partium etiam non affectarum gravitas & molesta sensatio integrum paroxysmum comi-

Paroxysmi progressus & terminatio.

comitantur. Recedentem paroxysmum excipit pedis affecti pruritus vix ferendus, maximè inter digitos, unde decidunt furfures, & pedes ipsi quasi ab epoto veneno desquamantur.

Symptomata morbi post annos aliquot insistentis.

Art. 910. Atque hoc modo se habet podagra *regularis*, cum verò vel indebita medicatione turbetur, vel diuturnior invaserit jam per annos aliquot, phænomena sunt multùm diversa a jam descriptis; jam manus, carpos, cubitos, aliasque regiones occupat; quandoque digitos distorquens, motu paulatim privans, tandemque concreciones, circa articulorum ligamenta, tophaceas generans, cretam vel oculos cancerorum æmulantes, nonnunquam in cubiti tumorem subalbum ciet, ferè ad ovi magnitudinem, qui sensim inflammatur; nonnunquam femur occupans, sensum exhibet, quasi ingentis ponderis appensi, sine dolore tamen notabili; at genu exinde petens, id acrius urget, artus jam habet æger ferè undequaque contractos & impeditos, ita ut claudicet, & permolestè prorepat.

In morbo inveterato minuitur dolor & augetur ægritudo.

Art. 911. Animadvertendum est, quòd ubi quis ad multos annos podagra laboraverit, dolor singulis paroxysmis gradatim imminuitur, tandemque *ægritudine* potius afficitur, quàm *dolore*; *dolor* & *ægritudo* quasi alternatim laceffit; DOLOR IN HOC MORBO EST AMARISSIMUM NATURÆ PHARMACUM, qui, quòd vehementior est, eò citius præterlabitur paroxysmus, atque insuper & longior erit intermissio, & magis perfecta, & vice versa.

Neque venæsectio neque catharsis ullatenus prodest.

Art. 912. In podagricis quamvis qui educitur sanguis pleuriticorum & rheumatismo laborantium sanguinem ut plurimum referat; attamen *venæsectio* haud minùs insigniter in hoc morbo officere ægro, quam in duobus prædictis prodesse cernitur; *catharsis* etiam justissimis de causis damnatur. Tam in hoc, quàm in aliis morbis quibuscunque,

cunque, dempta sola peste, sudores prolicere non tam medici quàm naturæ provincia est; ideoque curatio medicamentis *diaphoreticis* incassum tentatur.

Art. 913. In hoc morbo curando duæ sunt causæ principales præcipuè spectandæ, prima est *causa antecedens*, viz. humorum indigestio a caloris & spirituum defectu orta, altera est *causa continens*, viz. humorum calor & exæstuatio; hæ duæ toto cœlo discrepant, atque hinc quæ huic prosint remedia alteri obsint, unde hic affectus tam difficilis est curato.

Art. 914. Quæ *ventriculum roborant & concoctionem* adjuvant, medicamenta *digestiva* appellata, intentioni adimplendæ conferunt; hujusmodi sunt *radix anglic. enul. campan. & antiscorbutica*, e medicamentis vulgò cognitis *theriaca Andromachi* concoctionibus roborandis præ cæteris confert. Inter simplicia *cortex Peruvianus* primas obtinet, cum sanguinem corborat vegetumque reddit, si ejus grana aliquot manè & serò assumantur. Medicamenta *digestiva* modò laudata præcipue in paroxysmorum intervallis; idque longissimè a paroxysmo insecuturo in usum revocanda sunt majori cum fructu. Liqueor sequens, utpote qui gustu ac colore jucundo est, auctori maximè arridet; *℞. Rad. sarsaparil. ℥vj. chin. lign. sassaf. ras. C. C. ana ℥ij. glycyrrhiz. ℥j. coq. in aq. font. cong. ij. per hor. dimid. deinde stent clausè super ciner. calid. per hor. 12. postea ebulliant ad tertiæ partis consumptionem, cum primùm ab igne amoveatur, infund. sem. anis. ℥ß. post hor. ij. coletur liquor & per residuum deputetur.*

Art. 915. Tollere nodosam nescit medicina podagram; exercitatio tamen *tophorum* generationem præscindit, & etiam generatos & induratos solvit; si cuivis innotesceret medicamentum, quod & celare vellet, æque efficax in hoc morbo, ut chronicis

Unde difficilior est curatio.

Præcipua indicatio curativa.

Tophia

chronicis plerisque , ac est *equitatio* constans & assidua , opes ille exinde amplissimas facillè accumulare posset. [931.]

Languore.

Art. 916. In debilitate & languore ventriculi aut ventris torminibus neque *vinum gallicum rubrum* vel *theriaca Andromachi*, neque aliud quodlibet e *cardiacis* mihi hætenus notis pares habet vires , ac *vini Canariensis* haustulus subinde deglutitus languore atque ægritudine urgentibus .

Arthriticis retrocessio.

Art. 917. Sin autem gravius aliquod symptoma ex retrocessu materiæ podagricæ subito ingruat , & mortem ægro minuetur , neque vino neque exercitio suprâ laudatis fidendum est , verùm modo non caput , at partes vel naturales vel vitales ejusmodi malum impetat , ad *laudanum* cum *cardiacis* permistis statim confugiendum . Signum *retrocessionis* materiæ Arthriticæ , ægritudo ingens cum vomituritione & aliquali ventris dolore ; in hoc casu congium unum *liquoris posset* vel aliejus istiusmodi devoro , & cùm totum per vomitionem rejecerim , tum ebibo haustum *vin. Canarin.* cum *laudan. liquid.* gr. xvij. in lecto ad quietem me componens . *Schedul. monit. p. 120.* (934.)

Diarrhoea.

Art. 918. Ad diarrhœam , si *laudano* non obtemperet , unicum remedium est , ut *sudor* provocetur methodo & medicamentis huic usui destinatis ; quod si fiat ad biduum triduumve per duas tresve horas continuas , sistetur ut plurimum diarrhœa , & morbi fomes magna vi in artus detonabit. (937.)

Peripneumonia.

Art. 919. Metastasis materiæ peccantis in pulmonum lobos pari modo tractanda est , quo peripneumonia absoluta , viz. *venesectione*, &c. [941.]

Nephritis.

Art. 920. Si podagricis superveniat *nephritis* (quod sæpissimè accidit) posthabitis aliis bibat æger magna copia *liquor. posset* cui *radix* (& *sol. alth. & malv.*) incoct. sunt . Et injiciatur *enema* ,

ma, & postremò exhibeatur *laudani* dosis grandior. [938.]

Art. 921. *Therapia radicalis* podagræ adhuc in *Democrisi* puteo latet: neque temerè curanda est arthritis; quid enim est nisi naturæ providentia ad depurandum senem sanguinem, atque expurgandum corporis profundum, ut cum *Hippocrate* loquamur.

Therapia radicalis adhuc desideratur.

Lisleri sententia.

Art. 922. Ductus humori pituitoso in artubus excernenda dicati, aliquo modo labefactati, i. e. vel laxati ab improbo aliquo exercitio, maximè a cibo, ex nimia Venere, a qua tot motus articularum convulsivi, ex frequenti usu vini, &c. quibus iidem ductus vehementer resolvuntur; vel ex naturali quadam imbecillitate, qua contractioni impares sunt; vel obstructi ex aliqua longa hæmorrhagia, ex crapula & otio, humor ille ex crudo jam & lento sero confectus, in ductibus articularum excretoriis moram trahendo, faciliè putredinem & acrimoniam conceipit, & ichorofus tandem fit; ipsa denique ossa rodendo, illa in tophos dissolvere potis est; quod satis constat ex ossibus cariosis vermiculato quodam opere profundè insculptis. Unde primum atrox dolor: nempe a continua distensione & dilatatione ductuum, a corrumpente humore, ex nativa autem partium istarum conformatione dolor acerbior evadit: atque hinc illi sensus stricture infinitæ, compressionis, ponderis, caloris urentis, lincinationis, punctiionum, rosionum, ut humor putrescens in angustis & vix dilatabilibus ductibus impactus viam sibi faciat.

Arthritidis causæ.

Art. 923. Ad dolorem mitigandum (932.) sequens cataplasma præscripti; *℞. Mic. panis sili-ginei ex lacte cocti, ℥j. croci ʒj. aloes succotrin. ad pulv.*

Ad dolorem & stricture in arthritide

laborantibus.

pulv. sicc. & friabilem ustulat. ℞ij. ol. lilior. q. s. m. f. cataplasma. &c. alio paroxysmo atroci *Emplastrum viride glyconis* apud Scribonium Largum descriptum adhibui non minori cum successu; 24. *Æris ust. erugin. ana* ℞vj. sal. gem. gum. ammoniac. thur. ana ℞ß. aristol. rotund. ℞j. alum. ℞ß. myrrh. galban. aloë. ana ℞j. cera ℞ij. terebinth. chire ℞ß. ol. ℞bj. m. f. s. a. empl. Decursu morbi ad sitim leniendam convenit huiusmodi *aq. limac. ad.* ℞vj. ter in die; 24. *Cochlearum bortenſ.* NM. ℞j. lact. recent. ℞xij. cautè distillantur evitando empyeuma ad medias. Sing. ℞bj. adde *succ. limon. matur. ℞ß. sacchar. cand. q. s.*

Quantum valet abſtinentia.

Art. 924. Unica illa aurea regula de abſtinentia mihi certè maximè arridet; nempe ut iis, quibus aut integra sanitas, aut longiora valetudinis bonæ intervalla cordi sunt, PARVA CIBATIO SUMMÆ CURÆ SIT: atque hoc omnibus hominibus, quocunque ſtatu & conditione ſint cum ipſius quoque EXERCITII loco eſſe poteſt, etiam *pedibus ex toto captis.*

Estmulleri ſententiâ.

Signa arthritidis appropinquantis & ſymptomata præſentis.

Art. 925. Arthritis ſerè per paroxysmos affligere ſolet, extra quos, niſi in inveterato malo, ſanè commodè habent ægri; quoties imminet paroxysmus, alvus ſerè ſegnius evadit, ægri moleſtiam quandam haud benè explicabilem circa præcordia ſentiunt, conſuetum excrementum intra pedum digitos non reperitur, & circa articulos tenſio percipitur, hinc dolor pungens, lacerans & pulſans, interdum ardens in Arthritide *calida* dicta, in hoc ſymptomata ſunt aciora, ſed breviores ſunt paroxysmi; in *frigida* tumor plus minus cedematofus, nec niſi poſt longum tempus evaneſcens; in incremento paroxysmi conqueruntur ægri de æſtu circa regionem ſtomachi, hinc ſitis, & appetitus proſtratus. Hæc ſerè ipſa ſymptomata

tomata in dolore *ischiadico* occurrunt; si crebrius redeant paroxysmi; & vehementius affligant, insigniter debilitantur articuli. *Bacchus dicitur pater, Venus mater, & Ira obstetrix Arthritidis.*

Art. 930. Inguente podagra convenit vomitus, & forsan blanda purgatio, quæ omnino vitanda est in statu morbi. *Opiata* nunquam ferè sunt proficua, malum contumacius reddunt, & motum naturæ impediunt. Optimè conducunt *fixa acida absorbentia, volatilia, &c.* *Venesectio* minus convenit, nisi in *ischiadico* dolore, in principio paroxysmi, decoctum e lignis. *Spiritus cochlear trifolium palustre, &c.* laudantur. *Topica*, non nisi præmissis universalibus, locum habent; *narcotica* fugienda sunt; symptomata adjuncta sunt consideranda, ardor, dolor, tumor, &c. *Topica* non nisi in statu morbi sunt applicanda; laudatur *sp. lumbricorum cum camphora, sale armoniaco, &c.* *sp. theriacalis camphorat.* misturæ ex calce viv. & *sal. armoniac.* affundatur *sp. vini*, & huic distillato adde *camphoram*, & sic optimum habetur specificum in inflammationibus podagræ. *Flores sambuci* in lacte cocti dolorem leniunt. *Caro bubula* sine pinguedine manè & serò mutata dolorem compescit, & omnibus præfertur; item *stercus bubulum cum urina humana putrefacta*, in qua calx viva extincta est; *sapo Venetus in spiritu vini solutus* cum additione olei *juniperi & petrolei* insigne facit unguentum.

Art. 931. *Vesicatoria* in malo *ischiadico* multum *Ichias.* conducunt. Ad tophos (915.) caseus vetus & putridus cum decoct. *suilla* est proficuus. In malo *ischiadico* omnibus encomiis dignum est *Poterii* emplastr. de pice sulphuratum; ℞. Pic. naval. ℥iv. zerebinth. ven. ℥ss. mastich. succin. ana ℥ij. sulphur. commun. ℥ss. m. f. empl.

*Pitcairniſſi ſententia.*Pitcairniſſi
methodus

Art. 932. In Arthritide nihil ages urgendo phar-
 maca *purgantia*; vomitoria profunt, poſt illa *mer-*
curius ſenſim datus. Parti dolenti (923.) appli-
 care licet *balsamum Guidonis*, aut lintea liquore
 ſequenti madentia; ℥ſ. *Aq. font. fervent.* ℔viiij. *ar-*
ſenic. alb. vel flav. ℥ij. *calcis viv.* ℥vj. digere per
 hor. 24. lento igne. [Sed de ejus ulu incidit mi-
 hi ſuſpicio.] Si dolor accedat in ventriculo, ute-
 re *NM. condit. pulv. rad. ſarſparil. cort. Peruv. ol.*
cinnamom. zinzib. condit. &c. Proderit etiam in po-
 dagra decoct. ſequens ℥ſ. *Vin. alb. vel. cereviſ.* ℔viiij.
lact. fervent. ℔iv. ablato coagulo immitte *bacc.*
oxyacanth. ℔j. coq. per hor. dimid. bibat æger ℔j.
 mane & velperi.

*Muſgraviſſi ſententia.*Sedes ar-
thritidis
Propria in
artubus.

Art. 933. Sedes Arthritidis propria & exopta-
 tiſſima eſt in artubus, non in trunco corporis,
 poſteriori autem caſu, non priori mortem mina-
 tur: “ quid agendum ſit, brevi comprehenditur
 „ in divini *Hippocratis* effato, nimirum, revel-
 „ lenda ea, quæ quo non oportet, repunt; ſin
 „ autem quo convenit, iis viam ſternere oportet,
 „ ut ſingula ed vergant. “ Quando *reſceſſus* fiat
 miasmatis Arthritici in partem aliquam internam,
 morbum iſtius partis aded exquisitè imitatur, ut
 de exiſtentia ipſius minimè conſtaret, niſi Arthri-
 tis regularis præceſſerit.

Indicatio
generalis
in arthri-
tide ano-
mala.

Art. 934. Medendi indicatio generalis eſt, ut
 Arthritide anomala pars affecta quàm citiſſime,
 quàm tutiſſimè levetur; accuratè itaque perpenſo
 morbi genio, juxta partem, quam occupat, & ſa-
 ctis neceſſariis *evacuationibus*, optimè ſeliciſſime-
 que curatio perficitur per materiæ in artus tranſ-
 latio-

lationem; hoc enim est ipsum naturæ propositum. Medicamenta huic intentioni inservientia interna, *expellentia* dicta, sunt plerumq; *cardiaca*, quæ satis nota sunt; ad extrudendam autem Arthritidem nihil potentius aut efficacius invenitur quàm *chalybs nutritus* (præparationem vide sis apud auctor.) *Topica*, quæ Arthritidem artubus invitant, sunt emplastra ex *gum. carran.* vel *oxycr.* vel *cephal. cum pice Burgund. dimid.* vel *triente*, vel *ceratum viridè* vulgo *Hatcase*, &, si vires ægri ferant, & res in dubio versetur, *Phœnigm.* seq. 24. *Ferm. vet. part. ij. sem. sinap. rad. raph. sylv. allii, cacumin. rut. fim. columb. ana p. j. contunde cum aceto vin. alb. q. s. & redige ad spissitudinem cataplasmat.* (917.)

Art. 935. Si Arthritis ventriculum occupet, ibique commoretur, indicatur lene *emeticum* ex decocto *sol. theæ viridis*, vel *cardui benedicti*, vel ex *sale vitrioli*; &, finita operatione, *paregoricum*; convenit etiam interdum *catharsis*, & demum Arthritis in artus omni vi depellenda est, ut ante ostensum est.

Arthritis
in ventri-
culo.

Art. 936. In colica Arthritica propinari debet *ca-tharticum* huic morbo idoneum, & tunc *podagram expellentibus*, unà cum *anticolicis*, utendum est; *fo-tus* etiam & *linimenta* suum habent locum; sed (quod maximi est momenti) probè animadvertendum est, & recordandum, quod *vana & frustra arthritidis regularis in artubus excitanda sit spes omnis, quamdiu intestina fuerint immunda, facibusque onerata.*

Colica ar-
thritica.

Nota bene.

Art. 937. In diarrhœa vel dysenteria arthritica *laudano* sensim cohibendus est fluxus, & postea expellendus est cum cautela inimicus. (918.)

Diarrhœa

Art. 938. In paroxysmo arthritico & nephritico simul *paregorica* sunt necessaria: *adept cuniculi* externè inunct. dolorem mirificè lenit ex senis calculosi experimento. (920.)

Nephritis.

Art. 939. In asthma arthritico cura variè instituenda est pro diversitate morbi vel *sicci* vel *humidi*; arthritis [si fieri possit] in artubus excitanda est; interim in spirandi difficultatibus omnium ma-

Asthma.

ximè certissimèque inflationem mirum in modum ei.
curat compescitque *potio Coffee*.

Angina.

Art. 940. In angina arthritica plurimum valet sequens gargarisma; *℞. Aq. hord. ℥ij. diamor. ℥iij. sp. sulph. per camp. quantum lingua ferre poterit. m.* nihil verò pulvere sequenti præstantius efficaciusve novi; *℞. Cryst. min. sacch. crystal. ana p. a. misce, teneatur in ore ℥j. donec saliva abundaverit, tunc expuatur, & repetatur frequentissimè, mirum quantum hinc saliva, &c. (931.)*

Pleuritis
peripneumonia, &c.

Art. 941. "In pleuritide, peripneumonia & angina arthritica non novi præstantius remedium, quam infusum vel decoctum *stercoris equini*; est enim medicamentum non modo iis affectibus primariò proficuum, sed etiam arthritidis in artus expulso fortissimum; expertus loquor." [919.]

Arthritis
caput petens.

Art. 942. Arthritis caput petens, varios ac periculosos producit affectus, cephalalgiam, vertiginem, apoplexiam, convulsiones, paralyin, &c. in his affectibus cerebrum quàm citissimè allevetur *evacuatione, revulsione, & in artus amandatione*; in hujusmodi casibus ægrotantium pedes in *aquam fontan. fervidam* immitti curo, ibidemque ad tempus detineri, unde capiti juvamen præsentaneum obtinetur.

Congulendus est
auctor.

Art. 943. "Si doctissimum auctorem inspicere haud graveris, ille tibi plura amplissime suppeditabit de arthritidis anomala ætiologia & curatione.

Farrago sententiarum.

Temperantia.

Art. 944. Omnia remedia calculosis & podagricis præscripta inutilia propemodum erunt, nisi *vinum, venus, otium, & crapula* temperantijs usurpentur. *Baglivius.*

Dieta lactea.

Art. 945. Novi quosdam insigne levamen accepisse ex *dieta lactea* per tres aut quatuor menses sine ullo alio alimento: alios verò ex *lactis* usu deterius habuisse, viscerum obstructions contraxisse; ideoque sine prudentis medici consilio utrum conveniat, necne, haud temerè ineatur. *Vossius.*

Art. 946.

Art. 946. Cum ego olim articulorum doloribus vexarer [inquit *Sennertus*] & varios de ea re auctores legerem; in eo omnes consentire animadverti; in arthritidis curatione, plus spei in *bona diæta*; quam in medicamentis ponendum esse.

Art. 947. Summarium præscripti celeberrimi D. B — e pro Nobili quodam Anglicano ad *arthritidem eradicandam* hujusmodi fuit.

— Lac novum cum duplici aqua commista repudiatis aliis quocunque liquoribus solummodo ad potandum concedendum est; utcunque tamen *coffee* & *thea* modica quantitate interdum permittenda sunt, his verò sorbitionibus lac semper conjungendum est. Mane cum primùm expergiscaris, coctionibus plenè ac perfectè absolutis, libram aquæ fontanæ bibas, suadeo; & deinde elapsis duabus horis ad jentaculum accedas; cui sufficiat lac coctum addito exiguo pane, jusculum avenaceum, cum vel sine lacte; interdum *coffee*, *thea*, vel *chocolata* cum lacte temperata, panis butyratus, &c. Prandio nihil edendum est, nisi ex avenis, hordeo, oryza vel seminibus millii paratum fuerit, radices dauci vel raparum, spinachia, fabæ vel pisæ, &c. admitti possint in victum; quin etiam fructibus vesci, cum maturi sint, non interdico; pyra vel mala forno cocta inter edilia minimè contemnenda recenscantur; sed præ reliquis panem biscoctum cum lacte commendo; aliquando sed rarius de piscibus non salitis modicum comedere licebit. Acida & salsa vitanda sunt. Coena sit lac & panis. Hora 9. vespertina vel citius cubitum eundum est. Somno indulgeas; quanto enim plus somni capis eo melius tibi cessurum est. Frictio sicca artuum mane & vespere repetita plurimum valet: Humores enim dissipat & nodorum ac tophorum generationem prohibet: Exercitium inter primaria auxilia pono, equitatio licet potior sit quàm curru vehi, ambo tamen utilia sunt, & in eorum frequenti usu esse debes. Inter exercendum solummodo caveas, ne aeri

frigido ac humido teipsum nimium exporas. Si denique his non obstantibus arthritis insultum faciat, & cum vehementia defævierit, quod vix credibile est, interdum dosin laudari exhiberi, parca licet manu & non nisi premente necessitate, concedimus. Transitus a communi vivendi more ad hoc vitæ genus est tutissimus, neque est quod extimescas a subitanea mutatione: sed hoc semel instituto in eo usque ad vitæ terminum persistendum est; nam reditus ad luxum & liberam vivendi consuetudinem periculo haud vacaret. Arthritis hæreditaria perinde ac adventitia huic regimini cedit: labes etenim morbi in gremio sanguinis latitat, & in utroque genere huiusmodi Victu facillimè exterminabitur. Amplexibus venereis ne nimis obedientem te geras, concubitus illicitos omnino fugias, &c.

Remediū
celebre.

Art. 948. Perquam celebre fuit præscriptum sequens aliquando apud *Londinenses*. ℞. *Rad. turbithe hermodact. jalap. tartar. vitriolat. ana gr. xv. m. f. pulv. in haust. vin. alb. sumendus singulis mensibus*. In eundem etiam ulum *electuarium caryocostinum* a quibusdam valdè prædicatur. Alit omnium vomitus podagræ est prophylacticum præstantissimum, qui potest provocari emeticorum ope in insigni humorum colluvie, ubi juncturæ admodum laxæ, & morbus præ foribus est. Atqui *Podagricus* est vir sui arbitrii, præceptis medicis non auctulrat, sed genio in valetudinis incommodum plerumque indulget.

Ad nauseam
ventriculi.

Art. 949. Ad nauseam ventriculi in hoc morbo frequentem non datur præstantius remedium quàm *vinum Canariense radice zedoariæ medicatum*. *Tinctura corallis* specificum audit.

Art. 950. Singularis est ista clarissimi *Verulamii* methodus. ℞. *Mic. panis albißim. ℥iij.* coq. in lacte recent. Sub finem add. *flor. ros. rub. ℥ß. croc. ℥ß. ol. ros. ℥i. m. f. cataplasma parti affectæ applicand. sub tepidè; post horas tres amoveatur, & usurpetur fortus sequens per horæ quadrantem cum coecineo pan-*

no vel lana ejusdem coloris; ʒʒ. *Fol. salviae* mis. rad.
cicut. ʒvj. *brion.* ʒʒ. *sol. ros. rub. p.* j. coq. in aq. font.
 in qua chalybs candens saepius extinctus fuerit ʒʒiv. ad
 ʒʒij. colaturæ add. *sal. marin.* mis. statim post usum
 foras applicetur *emplast. diacalcit.* cum *ol. ros. mala-*
xat. *Baconis hist. nat.* " In podagra unicum com-
 mendamus *topicum* (inquit *Dolæus*); *repellentia*
 verò in hoc affectu non magni facimus, quia inde
 plus damni quàm commodi experti sumus. Se-
 quens verò pro arcano hîc in solatium podagrico-
 rum communicare volumus, quod nunquam te-
 frustrabit effectu, modò in tempore adhibeas;
 mille enim *experientiis est comprobatum*, quod ex-
 trahat dolores podagricos non repellendo eosdem,
 sed morbosicam materiam *extrahendo, resolvendo,*
& discutendo. Quandoquidem primordia sunt ut
 plurimum ab aciditate hostili, ad corporis ambi-
 tum delata, & artus molestante; unde podagræ
 character rigetionem afficit, ʒʒ. *Confect. hamech.*
 ʒj. *pu v. galap.* ʒʒ. *extract. trisol. fibrin.* ʒij. *li-*
tharg. aur. ʒj. *sapa. antimon.* ʒʒ. *sacchar. canth;*
 ʒvj. *ol. olivar. q. s. ceræ & picis parum s. s. a.* em-
 plastrum, quod imponatur artubus dolorificis
 quàmvis inflammatis, & relinquantur, donec dolo-
 res & humores evanuerint, quod mirè præstat.

Topicum
circulato
Dolæi.

Art. 951. Remedia sequentia interdum pro re na-
 ta in usum adduci possunt; *allium conditum, aq. o-*
mnium florum, aurum mosaicum, balsamum Rhame-
lii, cinnab. antimonii electuarium caryocostinum, empl.
pleuriticum, empl. smecticum, epithema sponaceum,
expressio millepedum. Flores salis armoniaci martia-
 ti, foras podagricus. gum. guaiac. mistura balsami-
 ca nephritica, rob. Sambuci ferè specificum.

Remedia
varia.

ISCHIAS.

Cæli Aureliani sententia.

Art. 952. Dolor Ischiadicus nunc ex manifestis,
 nunc ex occultis causis generatur, ut susceptione fri-
 goris, terrena cubatione, casu aut repentino per-
 cussu,

Accurata
morbi hi-
storia.

cullu, vel luxatione, venere immodica, vel morbo aliquo prægresso. Adest primo membri afflicti gravedo & difficilis motus cum levi torpore ac tormicatione, in quibusdam cum vehementi, pungenti, ac fervido dolore, & ad sensum patientis tanquam serpentis convoluti motu; interdum etiam adest febris, ut se in lecto continere non valeant ægrotantes; dolor in vertebro sentitur, dehinc in articulationes partium vicinarum penetrans, ad poplitem pertingens atque suram, dehinc etiam ad talum, & pedis summitatem: progressu temporis fit cruris totius extenuatio cum debilitate, & ejusdem abbreviatio, & miserrima claudicatio; quidam ambulant, capitibus digitorum gradientes, alii antrorsum, alii extrorsum, &c. Loci principaliter afflicti sunt periosteum & musculorum capita sive insertiones; aliquando in abscessum tendit. Si quis velit, consulat authorem de curatione.

Art. 953. " Methodus medendi hunc morbum
 „ satis contumacem D. Cheynei ex suggestione
 „ præclari *Pitcairni* sic se habet: Sumat æger pro
 „ virium sufficientia & ventriculi tolerantia *spiritus ather. terebinth. a ʒi. ad ʒij. vel ʒʒ. cum*
 „ *triplici quantitate mellis purissimi quotidie mane*
 „ *jejuno ventriculo ad 4. 6. vel ad summum*
 „ *8. vices superbibendo haust. ij. vel iij. ser. lact.*
 „ *cum vin. Canarien. alterati.* Intermitti potest
 „ ad diem unam aut alteram, si nauseam pariat;
 „ diebus, quibus spiritum assumpserit, hora decubitus capiat dosin *Pil. Matthai*. Spiritus
 „ *Æthereus* est iste, qui in distillatione inter spiritum & oleum prodit. Hæc methodus doloris
 „ vehementiam [inquit author] *infallibiliter* auferit manente solummodo artus quadam debilitate. Et ut reliquæ penitus eliminentur exhibenda est dosis *florum sulphuris* in lacte ad tempus bis in die.

Farra-

Farrago sententiarum.

Art. 954. Si alia non proficiant, ad *causticum* de-^{Cautica.}
 veniendum est; ipse uti soleo *foliis ranunculi* vel
mixtura calcis vivæ & saponis liquid. hæc summo-
 pere confert. *Baglivius*. Folia ranunculi [inquit
Ettmullerus] contusa & regioni lumbari applicata
 per 6. horas, donec vesicas excitent, quæ discul-
 sæ pro more suo emittunt serum acre, *Ischiadicum*
 dolorem penitus tollunt & morbum subigunt, p.
 630. Applicatio *foliorum ranunculi flammæ mino-*
ris facta fuit paulo infra genu a *circumforaneo* quo-
 dam ut ipse observavi plusquam triginta abhinc an-
 nis cum successu mirabili: Ego quoque plus semel
 idem experimentum compertum habui.

Art. 955. Radix Brion. alb. recens tusa & cum
 ol. sem. lini mixta & loco dolenti tepidè applicata
 mirum in modum dolorem pacat; & renovandus
 est labor, donec tota materia morbifica transude-
 tur. *Tachenius de morborum principiis*. Laudatur
empl. Poterii (931.) "Emplastrum sequens in præ-
 ,, xi expertus sum. *24. Pic. burgund. q. s. malaxetur*
 ,, cum *q. s. ol. sem. sinap.* per expressionem. *Empla-*
 ,, *strum Ischiat.* quoque applicari potest.

Art. 960. *Colocynthis clysteribus* indita privatim ^{Colocym-}
 coxendicium doloribus prodest. *Lister*. Interna ea-^{this.}
 dem ac in podagra.

L U E S V E N E R E A.

Ettmulleri sententia.

Art. 961. Innotuit hic morbus *Europæis* non ni-
 si circa annum 1493. Controvertitur, an veteribus
 cognitus fuerit, necne. Primò post impurum coi-
 tum plerumque exoriuntur, inflammatio præputii ^{Lues Ve-}
 & tumor, urinæ ardor, gonorrhœa, bubones in ^{nerca.}
 inguinibus, pustulæ variz in pene & aliis partibus, ^{Sympto-}
 atque hinc ulcera fœdida & maligna, cancrofa & ^{mata va-}
 callosa, progressu temporis etiam ossa corrodentia, ^{ria.}

dolores atrocissimi noctu exacerbantes, nodi, tophi, calor in volis manuum & plantis pedum, atque hinc fissuræ & excoiationes, verrucæ, condylomata, &c. circa anum pilorum defluvium, maculæ rubefcentes, flavescentes, aut livescentes. Inflammatio testium, raucedo, uvulæ relaxatio & erosio, palati ulcus, ozæna, tinnitus aurium, surditas, cæcitas, scabies, tabes, &c. Sed hæc symptomata omnia non cuivis contingunt; non raro sub larva *storbuti* & *arthritis* latitat. Ægri ut plurimum rem eum infectis se habuisse constanter negant.

Morbis
vario in-
cipit.

Art. 962. Paulò post congressum impurum circa penem aut vulvam æstus exoritur, aut ardor urinæ, hinc inter biduum aut triduum gonorrhœa; interdum nulla succedit gonorrhœa, sed virus per cutem potius ad inguina fertur, & bubones excitat; contingunt etiam quandoque ulcera callosa in scroto ac perinæ; interdum ulcus cancerosum ac callosum inter præputium & glandem; in quibusdam intumescunt testes. Sanguis missus in lue inveterata serè maculis lividis aut colore quasi cærulescente in superficie conspici solet. "In lue confirmata (ut rectè observavit *Lommius*) erumpunt maculæ frequentes, eæque more lentiginis exiguæ, aliàs rubræ, aliàs flavæ; in fronte quoque & temporibus & pone aures, maximè circa radices capillorum, dein in capite, vel etiam universo corpore, malignæ pustulæ, tumoresque non unius coloris efflorescunt, quæ sponte sanantur, iterumque passim expullulant: pustulæ modò flavæ, modò rubræ sunt, rotundæ omnes, siccæ, puris expertes, & aridam crustam habent; ex his deinde in ambitum serpentibus pustulis, cutemque cavantibus, ulcus oritur virulentum & sordidum.

Macula
ac pustula

Curatio
generalis.

Art. 963. Galli facilius salivant & citius curantur quàm Germani. Inter *sudorifera* eminent *guaiacum* & *sarsaparilla*, & regula semper observanda est in *frigidis* *guaiacum*, *calidis* *sarsaparilla*; decoctis *sudoriferis*

riferis non incommodè addatur *antimon. crud.* In inunctione mercuriali tutius procedunt qui artuum flexuras, inguina & alas sufficienter fricant; abdomen, pectus, & caput non inungenda, aut rarissimè.

Gonorrhœa.

Art. 964. In gonorrhœa effluit humor cum acerbissimo dolore a locis circa penis radicem, ubi sunt prostaticæ, primò seminalis aquosus liquor, qui hinc successivè flavescit, tum magis acrescit, tandem viridescit, aut cœrulescit, non raro graviter foetet; urina cum acerbissimo dolore mittitur; supervenit tumor præputii & glandis, & ulcuscula, interdum carunculæ in urethra. Præter cathartica mercurialia convenit privatim *emulsio ex sem. cannabis viridis* parata, *os sepia*, *terebinthina*, *saccharum Saturni*, &c. multum laudatur *mercurius præcipitatus viridis*, & *mercur. dulc. balsam. Saturni terebinthinatum*, ex *sacchar. Saturni* & *ol. terebinth.* blando igne paratum, egregiè conducit, ubi ardor nimius circa renes & genitalia, ut & *camphora*; item infusum *cantharidum* in vino, quod expertum est remedium medici cujusdam *Belgicæ*. *℞. Pulv. cantharid. ℥j. infund. in vin. Rhenan. ℥iij. vel iv. infusum stet per aliquot dies in loco tepido, & postea filtretur liquor, usus tempore misceantur coch. vi. vij. vel viij. cum bantharo vini, &c.* Resina ligni *guaiaci*, *balsam. de Capaibe*, specificum habetur, *antimonium diaphoretic. bezoardic. minerale*, aqua simplex in qua *argentum vivum* incoctum fuerit. Injunctio. *℞. Aq. calc. viv. ℥iv. mercur. dulc. ℥ss. sacchar. Saturn. ℥j. m. pro injectione.* Usurpetur liquor per resistentiam depuratus. (980. 126.)

Curatio.

Digressio de Gonorrhœis non virulentis.

Art. 965. Gonorrhœa vera est, in qua semen verum effluit. *Succus citri*, *granator. limon.* &c. sunt remedia optima, venerem extinguunt, præcipuè si *camph.* & *terebin.* in usum adhibeantur, ut & *emulsio cum sem. cannabin.* *sacch. Saturn.* *os sepia* (specificum) cum *ceruss. antimonii*, *balsam. capai.* extract.

Gonorrhœa vera non virulenta.

tract. rad. tormentil. vel ejus decoct. Lenis purgatio cum bolo mercuriali, & die sequent. rhabarb. externè foris astringentes, &c.

Gonorr.
rhœa.

Art. 966. Gonorrhœa notha, benigna dicta, non virulenta, est quando materia, non semen verum, continuè effluit ex pene citrà tentiginem aut pruritum venereum, diu durans sine multa virium prostratione, fluiori albo mulierum respondens; gonorrhœa catarrhalis vocari solet. Partes affectæ sunt glandulæ prostaticæ, nimis laxæ vel exulceratæ.

Curatig.

Art. 967. Cura debet institui generalis, digestio rectificanda, stomachus roborandus, cruditas corrigenda, pars affecta astringentibus firmanda. Est affectus catarrhalis; rosmarinus decoct. e lignis acidulæ profunt; interdum a scorbuto pendet. Non nimis citò suppressenda est hæc gonorrhœa. Ad majorem cautelam aperiendus est fonticulus in crure.

Ulcera
glandis,
&c.

Art. 968. Ulcuseula glandis & præputii curantur cum unguento diapomphol. & mercurio dulci; si fuerint cancrofa & callosa in usum venit solutio mercuri sublim. corrosiv. in aq. plantag. Si præputium insigniter tumet, & inflammatur, applicetur solutio sacchar. Saturn. in aq. calcis, item camphora in ol. amygd. dulc. soluta. [984.]

Ulcera
vaginæ.

Art. 969. In mulieribus exulcerantur partes internæ vaginæ, & saniem plorant plus minùs purulentam ac lividam, cum insigni dolore ac molestia; nec multo diversam a virorum postulant medelam.

Pustulæ.

Art. 970. Pro pustulis & tuberculis lac virginale.

Ulcera.

Art. 971. Ad ulcera sananda unguent. basil. cum mercur. dulc. (968. 982.)

Oris & palati
ulcera.
Oris.

Art. 972. Ulcera oris & palati curantur cum gargaris. ex decoct. lign. cum melle ros. & pauco alumine. Oris & palati decoct. emol. hord. alth. &c. primò tractanda est ad removendam crustam, & postea decoct. e lignis, &c. tanquam palati ulcera. Omnia hæc ulcera sub litu mercuriali sponte evanescent, nec metuenda sunt ulcera oris; nam per salivationem citiùs sanantur.

Art. 973.

Art. 973. Bubonum suppurationi & apertioni pro Bubones
 elicienda virulentia, maturè opera danda est, inter-
 nè *sudorifera* exhibenda sunt, externè *suppurantia*,
 quin & *cucurbita*. & si secundùm votum haud succe-
 dant, aperiantur, *lanceola* profundius intrusa. [991.]

Art. 974. Lues venerea contagiosa est, generatio- Quomodo
dis conta-
gium præ-
pagatur.
 ne, lactatione, contrectatione, saliva, sudore,
 liquido genitali, exhalatione; & qua parte contra-
 hitur, primò se manifestare solet. *Boerhaave*.

Sydenhami sententia.

Art. 975. Lues confirmata non nisi per *salivatio-* Methodus
salivandi.
nem ab *hydrargyro* excitatam extirpari potest; ad
 hanc autem recta licet procedere, sine ulla præce-
 dente evacuatione aut corporis præparatione. Un-
 guentum præscribere soleo ex *axung. porcin.* ℥ij. *ar-*
genti vivi ℥j. cum hujusce parte tertia brachia, cru-
 ra, tibias ad tres noctes continuas manibus suis æ-
 grum perungerè permitto; ita tamen ut ne axillas,
 neque inguina neque abdomen attingat uspiam. Post
 tertiam inunctionem gingivæ ut plurimum intume-
 scunt, & *ptyalismus* suboritur; si verò intra id
 tempus haud procedat, tum *turbith. mineral. gr.*
viii. in *conserv. ros. rub.* exhibeantur ægro, quod
 remedium vomitum ciet, & *ptyalismum* suscitabit;
 & postea si salivatio jam incepta prius elanguescat,
 quàm symptomata penitus disparuerint extimulanda
 est subindè cum dosi *mercur. dulc.* Dietam quod
 spectat & reliquum ægri regimen, eadem prorsus,
 ac in catharsi, imperanda sunt.

Art. 976. In quibusdam reperitur *idiosyncrasia* pe- Quid ag-
dum sit,
quando
ptyalis-
mus exci-
tari non
possit.
 culiaris tam salivationis respectu, quàm purgationis,
 ita ut methodus laudata vix gingivarum exulcera-
 tionem queat efficere, multò minùs *ptyalismum* mo-
 vere; in hujusmodi agris cavendum est medico, ne
 importuniùs urgeat, recalcitrante natura, & hor-
 renda symptomata accersat; lentè itaque festinet &
 moras trahat *mercur. dulc.* ℥j. semel in septimana ex-
 hibent.

hibendo, & quantumvis salivatio ad plenum nunquam assurgat, æger tamen copiosius quàm pro more solito expuet, & fœtor justæ salivationis comes adfuerit: atque hac methodo morbus expugnabitur concessio debito temporis spatio: His rûe peractis (etiamsi morbus penitus profligari videatur) quo minus recidivam postliminio patiatur æger, (utcumque benè se habeat) capiat *mercur. dulc.* ℞j. semel in septimana ad 4. vel 6. vices. “ Unguenta mercurialia minore quantitate, quàm ad *excitandum pygalismum* sufficiat, inuncta, & diut us continuata, „ universa Luis venereæ symptomata tollere & morbum penitus eradicare a quibusdam perhibetur.

Listeri sententia.

Origo
luis venereæ.

Art. 977. Lues venerea est morbus contagiosus ab humore aliquo venenato, ferè in coitu contractus ulceribus doloribusque se manifestans. Ab *insulis Americanis*, in quibus, ante *Hispanorum* adventum, hic affectus populariter grassatus est, illum per *Hispanos* in *Europam* allatum esse, nullus jam dubitat: Credibile est a serpentino genere vel morfu vel cibo assumpto illum ortum esse. A serpente aut scorpione percussos coitu levati produnt; verùm tœminas venereæ ledi auctore *Plinio*, magnum argumentum originis Luis Venereæ ab aliquo infecto venenato. Ictus serpentum omnium malorum pessimum, idèd lui venereæ comparandum. Quis adèd dubitet istam luem ex animalibus ortam esse: nam penis ab istis moribus venenatis vehementer intenditur; & *satyriasis*, id est, furore & libidine perciti nihil præter coitum anhelant. Ita quod vulneratis remedium fœminis calamitas est; & a fœminis sic infectis invicem mares consistantur in potterorum diram perniciem. (*de humoribus*, p. 417.)

Curatio)

Art. 978. Fœmina gravissimo urinæ ardore & punctiõibus ibidem, item condylomatis cancrõsis in pudendi labiis, non sine vehementi capitis dolore af-

re afflicta est; illam *purgavi* 4^{to} quoque die *pilulis de duob.* quibus *guaiaco*, &c. fuit pro potu ordinario, citra sudorem. Simpliciter enim bis quotidie cochlear. tinct. seq. in decoct. *guajaci* ℥iv. ʒi. *Cochinel.* ℥iij. *canthar.* ℥j. *vin. Rhenan.* ℥i. digere in B. M. & t. tinctur. Horum usu gonorrhœ. admodum virulenta, fœtidum & sanguineo-vitide pus effundens, integrè sublata est, & duobus plus minus mensibus sine ulla ope chirurgica etiam ulcera siccata sunt, dolorq; capit is ex toto desit.

Art. 979. In doloribus nocturnis, præmissis universalibus pulvis sequens est maximè proficiuus; ʒi. *Cochin.* ʒi. off. *sepiæ subtilissimè levigat.* ʒß. m. dof. ʒiij. 6ca. quæque hora cum decoct. valid. *Guaiac Guaiacum hydrargyri*, ut *hydrargyri veneni*, in lue antidotum est.

Dolores
nocturni.

Pitcairni sententia.

Art. 980. In principio gonorrhœæ virulentæ purgandum est cum ptisana laxante ex *sen. sal. tart. O. flor. melilot* & bibat æger *serum lactis*; post tres quatuorve dies purgationi insumptos, si ardor urinæ & fluxus sint minores, & color & consistentia meliores, bolum assumat ex *terebinth. & rheo* per 6. aut 7. dies, si alvum laxat, id fieri solet cum euphoria. Vitanda omninò sunt astringentia; gonorrhœa enim nunquam evadet in Luem Vener. nisi nimis intempestivè sistatur. *Pitcairn.* in MS. (964. 987.)

Gonorr-
hœæ du-
ratio.

Art. 981. Methodus therapeutica *Pitcairni* radicalis sic se habet; post vomitum bis aut ter iteratum exhibeatur *mercurius* per aliquot dies, bis in die; cum os inceperit dolere, abstineat se a *mercurio* per tres aut quatuor dies, tum *purgetur* alternis diebus; oris dolore cessante, iteretur usus *mercurii*; & iteretur hæc methodus, donec symptomata cessarint.

Methodus
therapeu-
tica.

Art. 982. Ad ulcera & eruptiones leprosas decoctum pro lotionem, unguentum, aqua cosmetica, & cerevisia *guaiacana*, tanquam remedia maximè efficacia, ab autore laudantur. (968. 971.)

Harri-

Harrisii sententia.

Infantes
quemodo
curantur.

Art. 983. Infantes a nutricibus lactantibus infecti, quanquam maculis, pustulis, ulceribusque scarent; quandoque & nocturnis illis doloribus erunt excruciiati, facillimè omnium restituuntur. *Farinà sarsaparilla* serè insipida; saltem nullo gustu ingrato, panatellis aut puliculis suis, ut par est, commista, addito etiam, ventriculi gratia, *santali citrini* polline, *catharticis* debitis intercalatis, tenerimæ ætati, ut lætè nonnunquam observavi, salutem perfectam redidit.

Blegnei sententia.

Ulcera
penis &
præputii.

Art. 984. Pro ulceribus penis & præputii curandis apprimè valet sequens lotio; *℥. Vitriol. alb. ℥ij. auripigment. alumin. nitr. ana ℥j.* comburantur in crucibulo, ut in lapidem coeant; *℥. Pul. prædict. ℥j. aq. calc. vin. alb. ana ℔j. f. solutio, &c.* Egregiè etiam conducit lotio sequens *Lanfranci*, maximè in ulceribus glandis & præputii; *℥. Vin. alb. ℔j. aq. ros. plantag. ana ℥ij. auripigment. ℥ij. æris virid. ℥i. myrrh. aloë. ana ℥i. misce.* Ulceribus satis deterfis medicamentum affusa aqua lenius fieri debet pro futuro; & postremò cura eum *lact. virgin. vel aqua divina Fernelii* (1147.) (*℥. Alumin. rupei ℥iv. co q. in aq. font. ℔ij. ad tertias;* tum. *℥. Lithar. aur. ℔ss. vin. alb. ℔jss. decoquantur ad ℔j.* colentur, ambaque aquæ commisceantur, & agitentur, donec albescant) perficienda est. Si verò ulcera fuerint diuturniora, aded ut callosa & canerosa evaserint, vulgè *Shankers* appellata, applicanda sunt remedia valde penetrantia, qualia *mercur. præcip. rub. lapis infernalis, aq. phagedænica*. Notandum tamen eum primùm ex usu horum crustæ inducantur, statim amovenda esse *escharotica, & suppurantia ac digestiva* adhibenda; quibus crusta sublata, ulcera tan-

Ulcera
callosa.

dem

dem cum *unguent. Devignonis* sananda esse (vid. etiam, p. 102.) internis remediis interim non neglectis.

Art. 985. Accidunt interdum tumores genitalium *Tumores oedematosi & genitilium.* oedematosi sive crystallini: remedia externa hoc in casu debent esse *exsiccantia, discutientia, & aliquatenus astringentia*; talia sunt *spirit. vin. camphor. aq. calc. cum sal. armoniac. sp. vin. cum sapone nigro, paucopipere, zinzib. & alum. ust.* si adsint simul ulcera canerosa & tumores duri, præcavenda est *gangræna*.

Art. 986. De phimosi, paraphimosi, & amputatione penis consulatur author, p. 112. &c. *Phimosis, &c.*

Art. 987. Cura rationalis gonorrhœæ inchoanda est cum *leni cathartico*, alternis diebus ex *cassia decoct. senn. & crystal. mineral. in sero lact. decoct. tamarind. & alth. & rhabarb.* (gonorrhœa propè occlusa) interim exhibenda sunt quoque *diuretica maxime terebinthinata, & postremo leviter astringentia, aq. minerales, croc. marr. astring. in aq. simplici coct. tinct. rosar. tinct. coral. in coch. syr. ejusdem vel cydon.* Ptyalismus nunquam tollit gonorrhœam. (*Pil. de creta Palmarii. Tinctura cantharid.*) *Gonorrhœa.*

Art. 988. Ardor urinæ emulsionibus & ptisana seq. *Ardor urinæ.*
℞. Rad. alth. ℥vj. malv. ℥ij. sol. acetos. p. β. hord. mundat. sem. papav. alb. ana ℥ij. coq. in aq. font. ℞x. ad tertias, sub finem addendo glycyrrhiz. ras. ℥i. f. ptisana mihi in frequenti usu, mitigari & tolli potest: interdum in graviore casu venæsectio est necessaria; ut in urinæ suppressione, semicupium; ℞. Rad. & sol. alth. rad. & sol. malv. rad. fœnicul. apii, petroselin. eryng. marin. ana ℥ij. (rad. raparum ℞ij) herb. parietar. violar. veronic. flor. cham. melilot. genist. sambuc. ana ℞ij. sem. fœnugr. lin. ana ℥j. petroselin. anis. fœnis. genist. ana ℥ij. coq. in q. s. aq. font. pro semicupio.

Art. 989. In tumoribus inflammatoriis testiculorum & scroti convenit *venæsectio; topica discutientia, & dolorem mitigantia* sunt usurpanda.

Art. 990. Carunculae in urethra sunt curatu difficillimæ: remedium sequens optimum perhibetur;
℞. Pulv. *Tumores testiculorum Caruncula in urethra.*

24. Pulv. alumin. ust. ʒj. precipit. rub. auripigment. eris virid. ana ʒß. unguent. desiccet. rub. ʒj. coq. ad consistentiam mediam inter unguent. & empl. hujus portiuncula cereoli summitati apponatur, & in urethram intrudatur, &c. de consumendis earunculis vide locum p. 177. &c. & consulantur alii scriptores Chirurgici.

Bubones.

Art. 991. Bubones quoquo pacto sunt suppurandi, internè conducunt *cardiaca*, *alexipharmaca*, *victus* & *potus generosus*; externè *suppurantia potentiora*, *emplastra*, vel potius *cataplasmata*; eum *cucurbita* semel vel bis in die attrahendi sunt, & cum sint satis maturi cum caustico aperiri debent, potius quàm *lanceola*, & aperti diutius sunt servandi. (973.) Ex erudito & eleganti tractatu Chirurgi Gallici D. Blegny.

P. S. In hoc morbo tractando D. Turneri Syphilidis epitomen exhibere in animo habui; sed defuit mihi otium; ideoque ad ipsum tractatum præstantissimum remittendus est lector, & simul admonendus commentationes præclarissimi Boerhaavii de hoc morbo ut consulat. Ibi habemus novam morbi ideam, novam theoriam a medicæ artis antistite, ne oraculo dicam, traditam, & novam medendi methodum, saltem aliquid in hunc finem candidè & modestè propositum, *pace nostratis* D. Turneri, qui etiam de facultate benè meruit. O Fortunati ter & amplius juvenes nobis senescentibus propemodum invidendi, qui sub tanto *Gamaliel*e vel in ipso pavimento super matta sedentes felicitatem habetis vos ipsos pulverizare pulvere pedum illius summi scientiæ promicondi!

Finis Partis Primæ.